

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 1243 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 ธค 66 จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.88 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 107 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.16 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.06 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.38 %) 10-14 ปี (19.31 %) 25-34 ปี (14.88 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.3 พม่าร้อยละ 2.9 กัมพูชาร้อยละ 0.8 อื่นๆร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 46.0 รับจ้างร้อยละ 26.8 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 11.8


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง มุกดาหาร อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (150 ราย), 10-14 ปี (99 ราย), 25-34 ปี (94 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (73 ราย), 15-24 ปี (46 ราย), 7-9 ปี (16 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (34 ราย), 25-34 ปี (28 ราย), 55-64 ปี (20 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (73 ราย), 25-34 ปี (50 ราย), 10-14 ปี (49 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

