

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 1753 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 27 กพ 66 จาก 68 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.65 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.93 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.87 %) 25-34 ปี (17.80 %) 10-14 ปี (16.37 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.1 อื่น ๆ ร้อยละ 3.3 พม่าร้อยละ 1.9 ลาวร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.3 จีนฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 39.1 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 23.3 รับจ้างร้อยละ 21.1


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย นครพนม บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี อำนาจเจริญ บึงกาฬ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (266 ราย), 25-34 ปี (219 ราย), 10-14 ปี (154 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (20 ราย), 10-14 ปี (15 ราย), 25-34 ปี (11 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (29 ราย), 35-44 ปี (26 ราย), 15-24 ปี (24 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (126 ราย), 10-14 ปี (101 ราย), 25-34 ปี (53 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F. cases by week of onset and region.
2566

