

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.

d50666


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 1968 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 6 มีค 66 จาก 69 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.97 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.92 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.75 %) 25-34 ปี (17.89 %) 10-14 ปี (16.21 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.1 อื่น ๆ ร้อยละ 3.2 พม่าร้อยละ 1.9 กัมพูชาร้อยละ 0.3 ลาวร้อยละ 0.3 จีนฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 38.6 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 22.8 รับจ้างร้อยละ 21.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ สุโขทัย นครพนม บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี อำนาจเจริญ บึงกาฬ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (295 ราย), 25-34 ปี (246 ราย), 10-14 ปี (173 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (21 ราย), 10-14 ปี (16 ราย), 25-34 ปี (13 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (33 ราย), 35-44 ปี (27 ราย), 15-24 ปี (25 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (146 ราย), 10-14 ปี (111 ราย), 25-34 ปี (60 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F. cases by week of onset and region.
2566

