

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 856 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 1 ตค 66 จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.29 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 64 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.10 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.07 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.95 %) 10-14 ปี (20.09 %) 25-34 ปี (15.42 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.8 พม่าร้อยละ 2.6 กัมพูชาร้อยละ 0.8 อื่นๆร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 46.7 รับจ้างร้อยละ 28.3 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 10.3


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม
อ่างทอง มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (105 ราย), 25-34 ปี (72 ราย), 10-14 ปี (69 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (56 ราย), 15-24 ปี (32 ราย), 35-44 ปี (11 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (23 ราย), 25-34 ปี (19 ราย), 55-64 ปี (18 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (45 ราย), 25-34 ปี (33 ราย), 10-14 ปี (33 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

