

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 1079 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 5 พย 66 จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.63 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 89 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.13 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.04 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.93 %) 10-14 ปี (20.20 %) 25-34 ปี (15.94 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.5 พม่าร้อยละ 2.9 กัมพูชาร้อยละ 0.8 ลาวร้อยละ 0.5 อื่นๆร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ พนักงานร้อยละ 47.4 รับจ้างร้อยละ 27.6 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 9.9


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง มุกดาหาร อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (136 ราย), 25-34 ปี (89 ราย), 10-14 ปี (88 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (68 ราย), 15-24 ปี (41 ราย), 35-44 ปี (15 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (31 ราย), 25-34 ปี (25 ราย), 55-64 ปี (20 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (61 ราย), 25-34 ปี (48 ราย), 10-14 ปี (45 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

