



d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 5023 ราย จาก 61 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.59 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.56 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.09 %) 25-34 ปี (16.78 %) 35-44 ปี (13.78 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 73.2 พม่าร้อยละ 21.4 อื่นๆร้อยละ 5.2 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 27.7 รับจ้างร้อยละ 25.2 เกษตรร้อยละ 21.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (316 ราย), 25-34 ปี (264 ราย), 35-44 ปี (252 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (13 ราย), 15-24 ปี (6 ราย), 55-64 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (749 ราย), 25-34 ปี (473 ราย), 10-14 ปี (344 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (101 ราย), 45-54 ปี (97 ราย), 25-34 ปี (93 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร		
<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0.01-10	<input type="checkbox"/> >10-50
<input type="checkbox"/> >50-100	<input type="checkbox"/> >100-500	<input type="checkbox"/> >500
ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อยละ
PF : Plasmodium falciparum	79	1.6
PV : Plasmodium vivax	2963	59.0
PM : Plasmodium malariae	51	1.0
Mixed type	8	0.2
Unknown	1922	38.3