

## D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 287 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 19 มิย 66 จาก 51 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.43 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 11 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.97 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (26.48 %) 10-14 ปี (19.16 %) 25-34 ปี (18.47 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.6 พม่าร้อยละ 1.0 กัมพูชาร้อยละ 1.0 ลาวร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 49.8 รับจ้างร้อยละ 23.3 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 11.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (30 ราย), 25-34 ปี (29 ราย), 10-14 ปี (27 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (11 ราย), 10-14 ปี (6 ราย), 35-44 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (8 ราย), 45-54 ปี (3 ราย), 25-34 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (27 ราย), 10-14 ปี (21 ราย), 25-34 ปี (20 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2566

