

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 1151 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 25 พย 66 จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.74 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 95 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.14 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.06 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (25.02 %) 10-14 ปี (20.50 %) 25-34 ปี (15.90 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.4 พม่าร้อยละ 2.8 กัมพูชาร้อยละ 0.9 อื่นๆร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 47.4 รับจ้างร้อยละ 27.5 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 9.9


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง มุกดาหาร อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (144 ราย), 10-14 ปี (96 ราย), 25-34 ปี (96 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (72 ราย), 15-24 ปี (46 ราย), 7-9 ปี (16 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (33 ราย), 25-34 ปี (27 ราย), 55-64 ปี (20 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (65 ราย), 10-14 ปี (49 ราย), 25-34 ปี (49 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

