

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 49 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 14 กพ 66 จาก 23 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.07 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.63 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 10-14 ปี (22.45 %) 15-24 ปี (22.45 %) 25-34 ปี (18.37 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.0 ลาวร้อยละ 2.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 36.7 รับจ้างร้อยละ 26.5 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 18.4


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (9 ราย), 15-24 ปี (7 ราย), 55-64 ปี (7 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (1 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2 ราย), 45-54 ปี (1 ราย), 9-11 เดือน (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (4 ราย), 2 ปี (3 ราย), 7-9 ปี (2 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region
2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health