

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 615 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 20 สค 66 จาก 67 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.93 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 43 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.06 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.04 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.25 %) 10-14 ปี (20.98 %) 25-34 ปี (15.61 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.1 พม่าร้อยละ 2.3 อื่นๆร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 47.6 รับจ้างร้อยละ 27.3 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 10.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (68 ราย), 10-14 ปี (52 ราย), 25-34 ปี (51 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (40 ราย), 15-24 ปี (25 ราย), 35-44 ปี (9 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (16 ราย), 15-24 ปี (16 ราย), 55-64 ปี (14 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (34 ราย), 10-14 ปี (27 ราย), 25-34 ปี (23 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2566

