

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 737 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 10 กย 66 จาก 70 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.11 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 54 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.08 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.04 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.29 %) 10-14 ปี (20.49 %) 25-34 ปี (15.06 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.2 พม่าร้อยละ 2.6 อื่นๆร้อยละ 0.5 กัมพูชาร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 47.5 รับจ้างร้อยละ 27.7 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 10.2


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง อุตรดิตถ์ ยโสธร มุกดาหาร ยะลา อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (89 ราย), 25-34 ปี (60 ราย), 10-14 ปี (60 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (50 ราย), 15-24 ปี (32 ราย), 35-44 ปี (10 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (20 ราย), 25-34 ปี (17 ราย), 55-64 ปี (15 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (38 ราย), 10-14 ปี (29 ราย), 25-34 ปี (28 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2566

