

D.H.F.shock syndrome

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 17 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 20 มค 66 จาก 10 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.03 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.89 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 10-14 ปี (29.41 %) 55-64 ปี (23.53 %) 15-24 ปี (23.53 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.1 ลาวร้อยละ 5.9 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 41.2 รับจ้างร้อยละ 29.4 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 17.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (4 ราย), 10-14 ปี (4 ราย), 15-24 ปี (3 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (1 ราย), 35-44 ปี (1 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health