

## D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 1015 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 ตค 66 จาก 72 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.53 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 76 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.11 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.05 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.65 %) 10-14 ปี (20.39 %) 25-34 ปี (14.78 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.0 พม่าร้อยละ 2.8 กัมพูชาร้อยละ 0.8 ลาวร้อยละ 0.4 อื่นๆร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 47.4 รับจ้างร้อยละ 27.4 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 10.5


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง อุดรดิตถ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (120 ราย), 10-14 ปี (82 ราย), 25-34 ปี (74 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (67 ราย), 15-24 ปี (40 ราย), 7-9 ปี (15 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (28 ราย), 25-34 ปี (22 ราย), 55-64 ปี (19 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (52 ราย), 25-34 ปี (44 ราย), 10-14 ปี (43 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio  
2566

