

D.H.F.shock syndrome

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 259 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 8 มิย 67 จาก 57 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.39 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 19 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.09 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (27.41 %) 10-14 ปี (14.67 %) 25-34 ปี (14.29 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.8 อื่นๆร้อยละ 1.9 พม่าร้อยละ 1.5 ลาวร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 36.3 นักเรียนร้อยละ 32.0 รับจ้างร้อยละ 17.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (17 ราย), 25-34 ปี (16 ราย), 15-24 ปี (15 ราย),
- ภาคตะวันออก/เฉิงเหื้อ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (16 ราย), 10-14 ปี (7 ราย), 45-54 ปี (7 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (13 ราย), 25-34 ปี (9 ราย), 35-44 ปี (5 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (27 ราย), 10-14 ปี (10 ราย), 35-44 ปี (9 ราย),

ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□0

umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2567

