

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 201 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 1 พค 66 จาก 42 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.30 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.12 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.88 %) 10-14 ปี (19.90 %) 25-34 ปี (19.40 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.0 กัมพูชาร้อยละ 1.5 พม่าร้อยละ 1.0 ลาวร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 52.7 รับจ้างร้อยละ 19.4 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 11.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (21 ราย), 25-34 ปี (20 ราย), 15-24 ปี (20 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (10 ราย), 10-14 ปี (3 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 10-14 ปี (2 ราย), 25-34 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (16 ราย), 10-14 ปี (14 ราย), 15-24 ปี (12 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region 2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health