

D.H.F.shock syndrome

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 216 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 5 พค 67 จาก 53 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.33 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 16 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.18 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (27.31 %) 10-14 ปี (14.81 %) 25-34 ปี (14.81 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.8 พม่าร้อยละ 1.4 อื่นๆร้อยละ 0.9 กัมพูชาร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 36.1 นักเรียนร้อยละ 32.4 รับจ้างร้อยละ 16.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (16 ราย), 25-34 ปี (15 ราย), 10-14 ปี (15 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (14 ราย), 10-14 ปี (7 ราย), 45-54 ปี (5 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 25-34 ปี (6 ราย), 10-14 ปี (3 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (23 ราย), 25-34 ปี (8 ราย), 10-14 ปี (7 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

□0

umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2567

