

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 107 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 19 มีค 66 จาก 34 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.16 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.91 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.36 %) 10-14 ปี (22.43 %) 25-34 ปี (20.56 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.2 ลาวร้อยละ 0.9 พม่าร้อยละ 0.9 กัมพูชาร้อยละ 0.9 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 50.5 รับจ้างร้อยละ 21.5 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 14.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (17 ราย), 15-24 ปี (14 ราย), 25-34 ปี (11 ราย),
- ภาคตะวันออก/เฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (4 ราย), 55-64 ปี (1 ราย), 10-14 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 7-9 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (9 ราย), 10-14 ปี (5 ราย), 15-24 ปี (4 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region
2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health