

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 647 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 26 สค 66 จาก 69 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.98 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 46 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.07 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.02 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.42 %) 10-14 ปี (20.40 %) 25-34 ปี (14.68 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.1 พม่าร้อยละ 2.2 อื่นๆร้อยละ 0.8 กัมพูชาร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 47.6 รับจ้างร้อยละ 27.0 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 10.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ่างทอง อุตรดิตถ์ ยโสธร มุกดาหาร ยะลา อำนาจเจริญ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (75 ราย), 10-14 ปี (52 ราย), 25-34 ปี (51 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (43 ราย), 15-24 ปี (28 ราย), 7-9 ปี (10 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (18 ราย), 25-34 ปี (16 ราย), 55-64 ปี (15 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (37 ราย), 10-14 ปี (27 ราย), 25-34 ปี (23 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

