

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

## D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 318 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 2 กค 66 จาก 58 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.48 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 18 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.95 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (26.42 %) 10-14 ปี (19.18 %) 25-34 ปี (17.30 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.5 พม่าร้อยละ 0.9 กัมพูชาร้อยละ 0.9 ลาวร้อยละ 0.3 อื่นๆร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 49.7 รับจ้างร้อยละ 25.8 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 10.7


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (36 ราย), 25-34 ปี (31 ราย), 10-14 ปี (28 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (15 ราย), 10-14 ปี (11 ราย), 25-34 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (10 ราย), 25-34 ปี (6 ราย), 45-54 ปี (3 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (23 ราย), 10-14 ปี (20 ราย), 25-34 ปี (14 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region  
2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health