

## D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 777 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 17 กย 66 จาก 71 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.17 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 57 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.09 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.05 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.45 %) 10-14 ปี (21.11 %) 25-34 ปี (14.54 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.9 พม่าร้อยละ 2.6 กัมพูชาร้อยละ 0.8 อื่นๆร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 48.0 รับจ้างร้อยละ 28.1 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 9.5


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง อุดรดิตถ์ มุกดาหาร ยะลา อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (97 ราย), 10-14 ปี (63 ราย), 25-34 ปี (60 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (57 ราย), 15-24 ปี (31 ราย), 35-44 ปี (11 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (22 ราย), 25-34 ปี (17 ราย), 55-64 ปี (16 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (40 ราย), 10-14 ปี (31 ราย), 25-34 ปี (29 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio  
2566

