



d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 4285 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 กย 66 จาก 58 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.48 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.56 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.82 %) 25-34 ปี (16.87 %) 35-44 ปี (13.79 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 74.0 พม่าร้อยละ 20.0 อื่นๆร้อยละ 5.9 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 27.7 รับจ้างร้อยละ 25.7 เกษตรร้อยละ 22.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ  
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (290 ราย), 25-34 ปี (242 ราย), 35-44 ปี (227 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (9 ราย), 15-24 ปี (5 ราย), 55-64 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (614 ราย), 25-34 ปี (397 ราย), 10-14 ปี (289 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (85 ราย), 45-54 ปี (78 ราย), 25-34 ปี (75 ราย),



| อัตราต่อแสนประชากร               |                                   |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0       | <input type="checkbox"/> 0.01-10  | <input type="checkbox"/> >10-50 |
| <input type="checkbox"/> >50-100 | <input type="checkbox"/> >100-500 | <input type="checkbox"/> >500   |
| ชนิดของเชื้อ/สาร                 | จำนวน                             | ร้อยละ                          |
| PF : Plasmodium falciparum       | 71                                | 1.7                             |
| PV : Plasmodium vivax            | 2547                              | 59.4                            |
| PM : Plasmodium malariae         | 41                                | 1.0                             |
| Mixed type                       | 6                                 | 0.1                             |
| Unknown                          | 1620                              | 37.8                            |