

## D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 1258 ราย จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.90 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 108 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.16 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.07 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.48 %) 10-14 ปี (19.40 %) 25-34 ปี (14.86 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.3 พม่าร้อยละ 2.8 กัมพูชาร้อยละ 0.8 อื่นๆร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.4 เวียดนามร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 46.3 รับจ้างร้อยละ 26.6 ไม่ทราบ อาชีพในปกครองร้อยละ 11.9


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ  
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม  
อ่างทอง มุกดาหาร อำนาจเจริญ  
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (152 ราย), 10-14 ปี (102 ราย), 25-34 ปี (95 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (74 ราย), 15-24 ปี (47 ราย), 7-9 ปี (17 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (35 ราย), 25-34 ปี (28 ราย), 55-64 ปี (20 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (74 ราย), 25-34 ปี (50 ราย), 10-14 ปี (49 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio  
2566

