


D.H.F.shock syndrome

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 42 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 10 กพ 66 จาก 20 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.06 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.68 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (26.19 %) 10-14 ปี (23.81 %) 55-64 ปี (19.05 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 92.9 พม่าร้อยละ 4.8 ลาวร้อยละ 2.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 40.5 รับจ้างร้อยละ 28.6 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 16.7


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (8 ราย), 55-64 ปี (7 ราย), 15-24 ปี (7 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2 ราย), 9-11 เดือน (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (2 ราย), 7-9 ปี (2 ราย), 10-14 ปี (2 ราย),



Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region
2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health