

## D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 684 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 2 กย 66 จาก 70 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.03 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 50 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.08 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.04 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.85 %) 10-14 ปี (20.61 %) 25-34 ปี (14.91 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.5 พม่าร้อยละ 2.0 อื่นๆร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 48.0 รับจ้างร้อยละ 26.6 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 10.5


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง อุตรดิตถ์ ยโสธร มุกดาหาร ยะลา อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (81 ราย), 25-34 ปี (56 ราย), 10-14 ปี (55 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (47 ราย), 15-24 ปี (31 ราย), 35-44 ปี (9 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (19 ราย), 25-34 ปี (16 ราย), 55-64 ปี (15 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (39 ราย), 10-14 ปี (28 ราย), 25-34 ปี (24 ราย),



This plugin is not supported

อัตราต่อแสนประชากร



## Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region

2566

