

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค **D.H.F.shock syndrome** พบผู้ป่วย **129** ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 1 เมย 66 จาก 37 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย **0.19** ต่อแสนประชากร เสียชีวิต **5** ราย คิดเป็นอัตราตาย **0.01** ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง **1: 1.08** กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (**24.03 %**) 25-34 ปี (**22.48 %**) 10-14 ปี (**20.93 %**) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.3 กัมพูชาร้อยละ 2.3 พม่าร้อยละ 1.6 ลาวร้อยละ 0.8 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 50.4 รับจ้างร้อยละ 20.9 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 13.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (18 ราย), 15-24 ปี (17 ราย), 25-34 ปี (14 ราย),
- ภาคตะวันออก/เชียงใหม่ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (5 ราย), 10-14 ปี (2 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (4 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 7-9 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (12 ราย), 10-14 ปี (6 ราย), 15-24 ปี (5 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region

2566

