

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค **D.H.F.shock syndrome** พบผู้ป่วย **166** ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ **1มค 2566** ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ **18 เมย 66** จาก **40** จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย **0.25** ต่อแสนประชากร เสียชีวิต **6** ราย คิดเป็นอัตราตาย **0.01** ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง **1: 1.10** กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ **15-24 ปี (21.69 %)** **10-14 ปี (21.08 %)** **25-34 ปี (20.48 %)** สัญชาติเป็นไทยร้อยละ **96.4** กัมพูชาร้อยละ **1.8** พม่าร้อยละ **1.2** ลาวร้อยละ **0.6** อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ **52.4** รับจ้างร้อยละ **19.9** ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ **12.0**


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ **10-14 ปี (21 ราย)**, **15-24 ปี (17 ราย)**, **25-34 ปี (17 ราย)**,
- ภาคตะวันออก/เฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ **15-24 ปี (6 ราย)**, **55-64 ปี (1 ราย)**, **25-34 ปี (1 ราย)**,
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ **15-24 ปี (6 ราย)**, **10-14 ปี (2 ราย)**, **45-54 ปี (2 ราย)**,
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ **25-34 ปี (14 ราย)**, **10-14 ปี (11 ราย)**, **15-24 ปี (7 ราย)**,



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region

2566

