

## D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 208 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 3 พค 66 จาก 44 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.31 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.14 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.52 %) 25-34 ปี (20.19 %) 10-14 ปี (19.23 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.6 พม่าร้อยละ 1.4 กัมพูชาร้อยละ 1.4 ลาวร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 51.0 รับจ้างร้อยละ 21.2 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 11.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (21 ราย), 25-34 ปี (21 ราย), 15-24 ปี (21 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (10 ราย), 25-34 ปี (3 ราย), 10-14 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 45-54 ปี (2 ราย), 10-14 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (16 ราย), 15-24 ปี (14 ราย), 10-14 ปี (14 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio  
2566

