

## D.H.F.shock syndrome

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 279 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 17 มิย 67 จาก 60 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.42 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 23 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.05 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (27.60 %) 25-34 ปี (15.41 %) 10-14 ปี (14.34 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.1 อื่นๆร้อยละ 1.8 พม่าร้อยละ 1.4 ลาวร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 36.2 นักเรียนร้อยละ 31.5 รับจ้างร้อยละ 17.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (18 ราย), 15-24 ปี (18 ราย), 25-34 ปี (18 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (17 ราย), 45-54 ปี (8 ราย), 10-14 ปี (7 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (14 ราย), 25-34 ปี (13 ราย), 35-44 ปี (7 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (28 ราย), 10-14 ปี (11 ราย), 35-44 ปี (9 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□0

umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio  
2567

