

■ Tabelas de DVA em mL/h por Peso

Referência rápida para UTI • pesos de 40 a 120 kg

Estas tabelas convertem doses usuais de drogas vasoativas e inotrópicos para **mL/h** em diluições padronizadas. O objetivo é agilizar o plantão e reduzir erro de conta na bomba. Use como material de apoio e sempre confira a diluição realmente preparada, a via de infusão e o protocolo do serviço.

Fórmula-base	$\text{mL/h} = (\text{dose} \times \text{peso} \times 60) \div \text{concentração}$
Concentração	$\text{mcg/mL} = (\text{mg totais} \times 1000) \div \text{volume total}$
Observação	As doses aqui são de referência rápida. Ajuste sempre ao contexto clínico, perfusão, lactato, PAM, ecocardiografia e efeitos adversos.

Vasopressina (dose fixa)	Diluição sugerida: 20 U em 50 mL • Concentração: 0,4 U/mL	0,03 U/min = 4,5 mL/h • 0,04 U/min = 6,0 mL/h
---------------------------------	---	---

Noradrenalina

Diluição padrão: 4 mg em 50 mL

Dose (mcg/kg/min)	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg
0,02	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8
0,05	1,5	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,8	4,1	4,5
0,1	3,0	3,8	4,5	5,2	6,0	6,8	7,5	8,2	9,0
0,2	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	16,5	18,0
0,3	9,0	11,2	13,5	15,8	18,0	20,2	22,5	24,8	27,0
0,5	15,0	18,8	22,5	26,2	30,0	33,8	37,5	41,2	45,0
1,0	30,0	37,5	45,0	52,5	60,0	67,5	75,0	82,5	90,0

Uso clássico em choque séptico. Concentração: 80 mcg/mL.

Noradrenalina

Diluição concentrada: 8 mg em 50 mL

Dose (mcg/kg/min)	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg
0,02	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9
0,05	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,2
0,1	1,5	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,8	4,1	4,5
0,2	3,0	3,8	4,5	5,2	6,0	6,8	7,5	8,2	9,0
0,3	4,5	5,6	6,8	7,9	9,0	10,1	11,2	12,4	13,5
0,5	7,5	9,4	11,2	13,1	15,0	16,9	18,8	20,6	22,5
1,0	15,0	18,8	22,5	26,2	30,0	33,8	37,5	41,2	45,0

Boa para altas doses em menor mL/h. Concentração: 160 mcg/mL.

Adrenalina

Diluição padrão: 4 mg em 250 mL

Dose (mcg/kg/min)	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg
0,02	3,0	3,8	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	8,2	9,0
0,05	7,5	9,4	11,2	13,1	15,0	16,9	18,8	20,6	22,5
0,1	15,0	18,8	22,5	26,2	30,0	33,8	37,5	41,2	45,0
0,2	30,0	37,5	45,0	52,5	60,0	67,5	75,0	82,5	90,0
0,3	45,0	56,2	67,5	78,8	90,0	101,2	112,5	123,8	135,0
0,5	75,0	93,8	112,5	131,2	150,0	168,8	187,5	206,2	225,0
1,0	150,0	187,5	225,0	262,5	300,0	337,5	375,0	412,5	450,0

Concentração: 16 mcg/mL.

Dobutamina

Diluição padrão: 250 mg em 250 mL

Dose (mcg/kg/min)	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg
2	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4
3	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	19,8	21,6
5	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0
7,5	18,0	22,5	27,0	31,5	36,0	40,5	45,0	49,5	54,0
10	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	66,0	72,0
15	36,0	45,0	54,0	63,0	72,0	81,0	90,0	99,0	108,0
20	48,0	60,0	72,0	84,0	96,0	108,0	120,0	132,0	144,0

Inotrópico. Concentração: 1000 mcg/mL.

Dopamina

Diluição padrão: 200 mg em 250 mL

Dose (mcg/kg/min)	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg
2	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	16,5	18,0
5	15,0	18,8	22,5	26,2	30,0	33,8	37,5	41,2	45,0
7,5	22,5	28,1	33,8	39,4	45,0	50,6	56,2	61,9	67,5
10	30,0	37,5	45,0	52,5	60,0	67,5	75,0	82,5	90,0
15	45,0	56,2	67,5	78,8	90,0	101,2	112,5	123,8	135,0
20	60,0	75,0	90,0	105,0	120,0	135,0	150,0	165,0	180,0

Uso cada vez menos frequente em choque séptico. Concentração: 800 mcg/mL.