

Available online at : <http://ejurnal.stikesprimanusantara.ac.id/>

Jurnal Kesehatan

| ISSN (Print) 2085-7098 | ISSN (Online) 2657-1366 |



Pengaruh Promosi Kesehatan Berbasis Health Belief Model (HBM) Terhadap Sikap Mahasiswa Tentang Rokok Universitas X di Bukittinggi

Anggi Dwi Iestari,

¹Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi

ARTICLE INFORMATION

Received: xx Month 20xx
 Revised: xx Month
 20xx Accepted: xx
 Month 20xx
 Available online:

KEYWORDS

Health Belief Model
 Promosi Kesehatan
 Sikap
 Rokok

CORRESPONDING AUTHOR

Anggidwil94@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2022, persentase perokok di usia 15-24 tahun di Bukittinggi tercatat sebesar 10,47%, sedangkan pada tahun 2023 angka tersebut sedikit meningkat menjadi 10,52%. Perubahan ini memang sangat tipis, namun tetap menunjukkan bahwa perilaku merokok di kalangan remaja di usia 15-24 tahun belum mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan berbasis *Health Belief Model* (HBM) terhadap sikap mahasiswa tentang rokok Universitas X di Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus – September 2025. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain pra-eksperimen rancangan *one group pretest-postt*. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di Universitas X Bukittinggi sebanyak 302 responden, dengan sampel 20 responden melalui teknik *purposive sampling*. Penelitian ini diukur dengan kuesioner *pretest* dan *posttest*, lalu dianalisis menggunakan uji *paired t-test* karena data berdistribusi normal pada sikap berdasarkan hasil uji normalitas dengan nilai *p-value* ($p > 0,05$). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan signifikan pada rata-rata skor sikap dari 41.30 menjadi 59.05 setelah intervensi promosi kesehatan berbasis *Health Belief Model* (HBM). Berdasarkan hasil uji *paired t-test* pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh promosi kesehatan berbasis *Health Belief Model* (HBM) terhadap sikap dengan nilai *p-value* 0,000 ($p < 0,05$). Kesimpulan penelitian ini adalah promosi kesehatan berbasis *Health Belief Model* (HBM) terbukti efektif dalam meningkatkan sikap positif mahasiswa terhadap bahaya merokok. Disarankan kepada institusi pendidikan untuk menerapkan edukasi berbasis *Health belief model* (HBM) secara berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya kampus sehat dan bebas rokok.

PENDAHULUAN

Kebiasaan merokok telah berkembang menjadi masalah kesehatan publik yang signifikan di banyak negara. Jumlah orang yang merokok di seluruh dunia mencapai 1,3 milyar, dengan 942 juta pria 175 juta wanita yang berusia lebih dari 15 tahun. Menurut *The Tobacco Control Atlas ASEAN Region 4th Edition* menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dengan persentase perokok usia antara 25-64 tahun (36,3%) dimana sebanyak 66% perokok laki-laki 6,7% perokok perempuan (Salsabila, N. N., Indraswari, N., & Sujatmiko, B. (2022).

Dari segi jumlah perokok persentase perokok tertinggi di dunia adalah Balkan, Oseania, Asia Tenggara, menurut data WHO mengenai tingkat penggunaan rokok oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas pada 2022. Indonesia menduduki urutan kedelapan dengan proporsi perokok sebesar 38,2%, diikuti oleh Kroasia Pulau Solomon masing-masing dengan proporsi sebesar 37% 36,9%, masing-masing. Namun, menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023,

ada 70 juta orang di Indonesia yang masih merupakan perokok aktif, dengan 7,4% di antara mereka berusia 10 hingga 18 tahun. Perokok Indonesia juga didominasi oleh laki-laki (56,36%) dengan selisih yang signifikan dibanding perempuan (Mochamad, R. (2024).

Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi dengan prevalensi perokok yang tinggi di Indonesia. Pada tahun 2023, persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang merokok di Sumatera Barat mencapai sekitar 30,42% sedangkan tahun 2024 mengalami lonjakan sebesar 31,45%. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena merokok berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan berdampak pada berbagai masalah kesehatan kronis. Peningkatan angka perokok di Sumatera Barat terjadi meskipun telah adanya aturan yang lebih ketat terkait iklan dan peringatan bahaya rokok. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan kebijakan yang lebih efektif untuk menurunkan prevalensi merokok pada usia 15-24 di provinsi sumatra barat supaya meningkatkan kesehatan masyarakat

Badan Pusat Statistik menyebutkan

bahwa prevalensi merokok pada kelompok usia 15–24 masih cukup tinggi dengan rata-rata provinsi mencapai 12,97%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir 13 dari 100 anak muda di Sumatera Barat masih memiliki kebiasaan merokok. Jika diperhatikan per kabupaten/kota, terdapat beberapa daerah dengan persentase yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi, seperti Kabupaten Pasaman (15,15%), Padang Pariaman (14,88%), Pasaman Barat (14,61%), serta Kota Solok (14,24%). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merokok di kalangan usia muda di daerah tersebut cukup memprihatinkan.⁽⁵⁾ Selain itu, daerah dengan angka yang relatif rendah antara lain Kabupaten Tanah Datar (9,18%), Kota Padang Panjang (9,72%), dan Kota Bukittinggi (10,47%). Meskipun lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa masih ada sekitar 1 dari 10 remaja dan mahasiswa yang merokok di daerah tersebut. (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2023).

Rokok merupakan salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit kronis dan mematikan. Kandungan zat kimia berbahaya dalam rokok, seperti nikotin, tar, dan karbon

monoksida, telah terbukti merusak berbagai organ tubuh dan mempercepat munculnya gangguan kesehatan serius. Penduduk Sumatera Barat memiliki prevalensi penyakit kanker sebesar 2,47%, di atas rata-rata nasional sebesar 1,79, penyakit jantung sebesar 1,65%, lebih tinggi 0,15% dari rata-rata nasional, hipertensi sebesar 25,16%. Tingginya prevalensi penyakit yang terkait dengan kebiasaan perilaku merokok ini belum mampu menurunkan jumlah kematian yang disebabkan oleh penyakit ini (Anindhita, F., & Hasbi, M. (2022).

Mahasiswa merupakan aset bangsa yang suatu saat nanti akan menjadi generasi penerus dalam membangun bangsa ini. Bangsa akan maju apabila generasi muda tersebut memiliki perilaku yang sehat sebab kesehatan seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut sehingga dapat merugikan masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, maka mahasiswa harus menerapkan pola hidup yang sehat, salah satunya yaitu tidak mengonsumsi rokok, sebab rokok berdampak negatif bagi kesehatan individu masyarakat sekitar. Akan tetapi jumlah

perokok dikalangan mahasiswa cukup tinggi. (Lubis, A. S., & Siregar, P. A. (2023).

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak kemahasiswaan menunjukkan bahwa Universitas X belum memiliki penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang baik. Meskipun terdapat larangan merokok di ruang kelas dan ruang rapat, pengawasan di area publik kampus seperti kantin, parkir, dan taman belum berjalan optimal. Hal ini membuat perilaku merokok masih sering terlihat di lingkungan kampus, termasuk di area yang dekat dengan fasilitas kesehatan mahasiswa.

Ketiadaan implementasi KTR yang efektif menjadi salah satu faktor lingkungan yang mendukung keberlangsungan perilaku merokok di kalangan mahasiswa. Kondisi ini memperkuat urgensi pelaksanaan intervensi promosi kesehatan berbasis *Health Belief Model* (HBM), yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mengubah persepsi dan motivasi mahasiswa untuk berhenti merokok, sehingga sejalan dengan upaya mewujudkan lingkungan kampus sehat dan bebas rokok.

Beberapa intervensi yang bisa dilakukan untuk mengurangi perilaku

merokok, seperti mengembangkan program edukasi yang memaparkan dampak kesehatan jangka pendek dan panjang dari perilaku merokok, menggunakan testimoni dari beberapa penderita yang mengalami dampak negatif dari perilaku merokok untuk menjadi sarana memperkuat persepsi kerentanan keseriusan, mendorong kampanye anti rokok di kampus dengan menekankan risiko kesehatan, menyediakan mempromosikan layanan konseling atau dukungan psikologis untuk membantu mahasiswa dalam perjalanannya berhenti merokok, menyediakan informasi tentang program berhenti merokok membuat komunitas mahasiswa alumni perokok, menerapkan pesan pemberdayaan diri serta pengingat rutin melalui teknologi untuk mempertahankan motivasi (Satya, M. C. N., Setyowati, L., Suandana, I. A., & Sari, D. K. (2024).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada 25 Februari 2025 melalui *Google form* yang dibagikan melalui *Whatsapp* pada mahasiswa Universitas X di Bukittinggi, dari hasil keseluruhan responden dari masing responden intensitas rokoknya mencapai: Hukum

33.33%, Informed 23.81%, Keperawatan 19.05%, Teknologi Pangan 9.52%, Promkes 4.76%. ditemukan bahwa rata-rata konsumsi rokok di kalangan mahasiswa mencapai 9-10 batang per hari.

Hasil observasi awal peneliti (Februari 2025) pada mahasiswa perokok di Universitas X menunjukkan rata-rata konsumsi rokok sebesar 9–10 batang/hari, dengan sebagian responden mencapai 12 batang/hari setara 1 bungkus penuh. Dengan harga rata-rata rokok di Bukittinggi sebesar Rp25.000/bungkus, pengeluaran bulanan untuk rokok berkisaran Rp750.000–Rp1.000.000 per mahasiswa.

Dari penjelasan mengenai Model Keyakinan Kesehatan (Health Belief Model/HBM) diatas, peneliti memilih teori Model Keyakinan Kesehatan (Health Belief Model/HBM) sebagai dasar penelitian ini karena menyadari bahwa model ini memiliki potensi besar dalam upaya promosi kesehatan untuk mengurangi perilaku merokok. Alasan pemilihan teori ini adalah kemampuannya dalam membantu individu memahami risiko konsekuensi dari perilaku merokok. Dengan memanfaatkan komponen-komponen HBM, seperti persepsi kerentanan, keparahan, manfaat,

hambatan, peneliti percaya bahwa program-program promosi kesehatan dapat dirancang untuk meningkatkan kesadaran motivasi individu dalam berhenti merokok, sehingga memberikan harapan bagi mereka untuk mengubah perilaku yang merugikan kesehatan.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Promosi Kesehatan Berbasis Health Belief Model (HBM) Terhadap Sikap Mahasiswa Tentang Rokok Universitas X di Bukitinggi”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pre-experimental design dengan rancangan one group pre-test-post-test untuk memahami hubungan promosi kesehatan berbasis Health Belief Model (HBM) terhadap sikap mahasiswa tentang rokok. (Sugiyono). Desain ini dari awal sudah dilakukan observasi melalui pre-test terlebih dahulu, kemudian diberikan perlakuan atau intervensi, selanjutnya dilakukan post-test untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau intervensi. Namun dalam

desain ini tidak ada control sebagai pembanding antar kelompok. Rancangan penelitian ini untuk menguji pengaruh intervensi promosi kesehatan berbasis Health Belief Model (HBM) dalam mengubah sikap merokok mahasiswa Universitas X di Bukittinggi.

Dalam penelitian ini, jumlah mahasiswa aktif Universitas ini adalah 1696 populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa laki-laki di mulai dari semester 1-5 Universitas x di bukittinggi pada tahun 2025 yang berjumlah 302 orang. Penentuan responden yaitu sebagian mahasiswa semester 1-5 universitas x di bikittinggi yang bersedia menjadi responden dilakukan pendekatan, penjelasan tentang penelitian dan persetujuan menjadi responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probality sampling yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan *sampling* didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Univariat

1. Analisis rata-rata sikap sebelum intervensi

Tabel 1. 1 Rata-rata sikap responden sebelum edukasi dengan media ppt tentang pengaruh promosi kesehatan berbasis health belief model terhadap sikap mahasiswa tentang rokok di universitas x bukittinggi

N	Mean	SD	Min-max
20	41,30	2.557	37 - 46

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa rata-rata sikap responden sebelum intervensi (pre-test) adalah 41,30 dengan standar deviasi 2,557. Dengan nilai rerata sikap terendah sebelum intervensi adalah 37 dan tertinggi 46

2. Analisis rata-rata perubahan sikap sesudah intervensi

Tabel 1. 2 rata-rata sikap responden sebelum edukasi dengan media ppt tentang pengaruh promosi kesehatan berbasis health belief model terhadap sikap mahasiswa tentang rokok di universitas x bukittinggi

N	Mean	SD	Min-max
20	59.05	5.871	46 - 68

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa rata-rata sikap responden setelah intervensi (*post-test*) adalah 59.05 dengan standar deviasi 5.871. Dengan nilai rerata sikap terendah sebelum intervensi adalah 46 dan tertinggi 68.

Uji normalitas

Tabel 1. 3 Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian Sebelum Dan Setelah Intervensi

Variabel	Shapiro wilk	
	signifikasi	keterangan
Sikap sebelum	0.147	normal
Sikap setelah	0.385	normal

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa uji normalitas menggunakan Shapiro wilk dikarenakan jumlah responden 20 mahasiswa. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikasi sikap $\geq 0,05$ maka data di anggap berdistribusi normal, sehingga uji statistik yang digunakan selanjutnya adalah yaitu uji paired t-test.

Analisis Bivariat

1. Pengaruh edukasi ppt tentang rokok berbasis Health Belief Model (HBM) terhadap sikap mahasisiwa

Tabel 1. 4 Pengaruh Promosi Kesehatan Berbasis Health Belief Model (Hbm) Terhadap Sikap Mahasiswa Tentang Rokok Universitas X Di Bukittinggi

Variabel	Negative rank	Positive rank	Ties	Sig(2-tailed)
sikap	0	20	0	0,001

Berdasarkan tabel 5.4 uji pared t-test diketahui bahwa terdapat negative rank pada sikap sebanyak 0 artinya tidak ada penurunan peringkat sikap post-test yang lebih rendah dari pre-test. Pada positive rank terdapat 20 artinya, nilai post-test lebih tinggi dari pre-test dan nilai ties sikap sebanyak 0 artinya nilai post-test tidak ada

yang sama dengan pre-test.

Sedangkan dalam melihat pengaruh promosi kesehatan melalui power point terhadap sikap pada nilai p-value dilihat di kolom Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu $0,001 \leq 0,05$ maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pada edukasi power point terhadap sikap mahasiswa tentang rokok berbasis Health Belief Model (HBM), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima

Pembahasan

Analisis Univrat

1. Rata-Rata Sikap Responden Sebelum Edukasi Dengan Media Ppt Tentang Pengaruh Promosi Kesehatan Berbasis Health Belief Model Terhadap Sikap Mahasiswa Tentang Rokok Di Universitas X Bukittinggi

Hasil pre-test dari 20 responden menunjukkan skor rata-rata sikap terhadap merokok sebesar 41,30 (SD = 2,557), dengan skor terendah 37 dan tertinggi 46. Lima pernyataan dalam kuesioner memperlihatkan skor terendah, mengindikasikan rendahnya persepsi mahasiswa terhadap keparahan (perceived severity), kerentanan (perceived susceptibility), dan pemicu tindakan (cues to action) terkait bahaya merokok. Banyak

responden belum meyakini bahwa merokok benar-benar meningkatkan risiko penyakit serius atau berdampak langsung pada kehidupan mereka, serta tidak merasa lebih rentan dibanding orang lain. Selain itu, kampanye kesehatan dianggap belum efektif memengaruhi sikap mereka.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Andi Asrina (2019) yang menunjukkan dominasi sikap negatif terhadap merokok sebelum intervensi, yang kemudian membaik signifikan setelah edukasi. Peneliti berasumsi bahwa edukasi berbasis Health Belief Model (HBM) melalui PowerPoint yang mencakup informasi tentang zat berbahaya dalam rokok dan dampak kesehatannya dapat meningkatkan pengetahuan, mengubah keyakinan, dan membentuk sikap lebih negatif terhadap merokok. Asumsi tambahan mencakup normalitas data, kejujuran responden, dan konsistensi penyampaian intervensi, sehingga uji paired t-test dianggap tepat untuk mengukur perubahan sikap. Secara keseluruhan, hasil pre-test menunjukkan perlunya intervensi edukatif yang terstruktur berbasis HBM untuk meningkatkan kesadaran dan sikap mahasiswa terhadap bahaya merokok.

2. Rata-Rata Perubahan Sikap Sesudah Edukasi Dengan Media Ppt Tentang Pengaruh Promosi Kesehatan Berbasis Health Belief Model Terhadap Sikap Mahasiswa Tentang Rokok Di Universitas X Bukittinggi

Setelah intervensi berupa penayangan PowerPoint berbasis Health Belief Model (HBM), skor rata-rata sikap 20 responden terhadap merokok meningkat signifikan dari 41,30 (pretest) menjadi 59,05 (posttest), dengan standar deviasi 5,871 dan kisaran skor 46–68. Kuesioner post-test menunjukkan peningkatan persepsi pada aspek penting HBM, seperti kerentanan terhadap dampak merokok, motivasi dari edukasi kesehatan, dukungan sosial, serta kesadaran akan informasi bahaya rokok—meskipun sebagian kecil responden masih memandang berhenti merokok sebagai sumber stres.

Temuan ini didukung oleh penelitian terdahulu, seperti oleh Diana Elysabeth Sinaga (2024), yang membuktikan efektivitas intervensi berbasis HBM dalam meningkatkan kesadaran dan sikap positif terhadap kesehatan. Peningkatan sikap dalam penelitian ini disebabkan oleh penyampaian materi yang visual,

informatif, dan mudah dipahami, mencakup informasi tentang kandungan berbahaya rokok dan dampak kesehatannya.

Hasil ini sejalan dengan teori HBM yang menekankan peran persepsi kerentanan (perceived susceptibility), keseriusan (perceived severity), manfaat (perceived benefits), hambatan (perceived barriers), dan efikasi diri dalam membentuk perilaku sehat. Meski sebagian kecil responden belum sepenuhnya berubah—kemungkinan karena pengaruh lingkungan atau kebiasaan sosial—secara keseluruhan intervensi terbukti signifikan dan efektif dalam membentuk sikap negatif terhadap merokok dan mendorong keinginan untuk berhenti.

Analisis Bivariat

1. Pengaruh intervensi edukasi *power point* tentang rokok berbasis *health belief model* (HBM) terhadap sikap mahasiswa tentang rokok di universitas x bukittinggi

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa promosi kesehatan berbasis Health Belief Model (HBM) memberikan pengaruh signifikan terhadap sikap mahasiswa terhadap rokok di Universitas X Bukittinggi. Nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,001

(lebih kecil dari $\alpha = 0,005$) menyebabkan hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang berarti terdapat pengaruh nyata dari intervensi HBM terhadap perubahan sikap.

Skor rata-rata sikap meningkat signifikan dari 41,30 (pretest) menjadi 59,05 (posttest), menunjukkan peningkatan persepsi terhadap kerentanan, keseriusan bahaya merokok, manfaat berhenti merokok, serta dukungan sosial. Meskipun beberapa responden masih memandang berhenti merokok sebagai sumber stres, mayoritas mulai menyadari risiko kesehatan dan menyatakan keinginan untuk berhenti—terutama setelah memahami dampak jangka panjang terhadap diri sendiri dan keluarga.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Setyarini dkk. (2023) yang juga membuktikan efektivitas HBM dalam meningkatkan kesadaran kesehatan pada remaja, serta didukung oleh teori HBM (Rosenstock, 1966; Becker, 1974) yang menekankan peran persepsi risiko, manfaat, hambatan, dan efikasi diri dalam membentuk perilaku sehat.

Faktor sosial seperti pengaruh teman sebaya dan lingkungan kampus

sebelumnya menjadi penghambat, karena banyak mahasiswa meremehkan risiko merokok. Namun, setelah intervensi, muncul kesadaran baru, rasa takut, dan kecemasan terhadap dampak kesehatan, yang memperkuat motivasi untuk berubah. Peneliti menyimpulkan bahwa HBM efektif dalam membentuk sikap positif mahasiswa terhadap pencegahan perilaku merokok, meskipun komitmen penuh untuk berhenti sering kali dikaitkan dengan harapan memiliki keluarga di masa depan.

Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa intervensi berbasis HBM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran, motivasi, serta pembentukan sikap positif mahasiswa untuk menghentikan kebiasaan merokok, meskipun sebagian besar responden menyatakan bahwa keinginan tersebut akan lebih kuat ketika mereka telah berkeluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh promosi kesehatan berbasis Health Belief Model (HBM) terhadap sikap mahasiswa tentang rokok di Universitas X Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata skor sikap mahasiswa sebelum diberikan intervensi adalah

41,30 yang menunjukkan masih adanya pandangan positif terhadap rokok.

2. Setelah diberikan intervensi promosi kesehatan berbasis HBM, skor sikap meningkat menjadi 59,05 menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.
3. Hasil uji paired t-test menunjukkan $p\text{-value} = 0,000$ ($p < 0,05$) artinya ada pengaruh yang signifikan antara promosi kesehatan berbasis HBM terhadap sikap mahasiswa tentang rokok. sehingga promosi kesehatan berbasis Health Belief Model (HBM) terbukti efektif dalam meningkatkan sikap positif mahasiswa terhadap bahaya merokok.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada universitas x di bukittinggi yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis selama proses pengumpulan data. Seluruh responden yang meluangkan waktu nya, khusus mahasiswa kampus universitas x Bukittinggi.

REFERENSI

- Anindhita, F., & Hasbi, M. (2022). Identifikasi karakteristik perokok aktif di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan model logistik biner. *Jurnal Statistika dan Aplikasinya*, 6(2), 192.
- Asrina, A. (2018). Pengaruh media promosi kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang perilaku merokok di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Bantaeng Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Mitrasedhat*, 8(2).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2023). *Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok dalam sebulan terakhir menurut kabupaten/kota dan kelompok umur di Provinsi Sumatera Barat, 2023* (Tabel Statistik).
- Lubis, A. S., & Siregar, P. A. (2023). Faktor pendorong perilaku merokok pada mahasiswa di lingkungan kampus: Pendekatan kualitatif. *Jurnal Kesehatan*, 1(1), 215–229.
- Mochamad, R. (2024). *10 negara dengan persentase perokok tertinggi di dunia*. GoodStats Data. Diakses pada 21 Februari 2025, dari <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-persentase-perokok-tertinggi-di-dunia-F54X9>
- Pranata, A. P. (2023). The Effectiveness of the Health Belief Model-Based Education Module in Increasing Awareness and Behavior of Hypertension Prevention in Adolescents. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI)*, 9(3), 215–221.
- Salsabila, N. N., Indraswari, N., & Sujatmiko, B. (2022). Gambaran kebiasaan merokok di Indonesia berdasarkan Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5). *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 7(1), 2.
- Satya, M. C. N., Setyowati, L., Suandana, I. A., & Sari, D. K. (2024). Penerapan Health Belief Model perilaku merokok pada mahasiswa. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 7(3), 657–663.
- Sinaga, D. E., & Savira, S. I. (2024). Hubungan Health Belief Model dan perilaku merokok pada mahasiswa. *INCARE, International Journal of Educational Resources*, 5(1), 89–102.