

Efectividad considerada para diversos tratamientos del SII-D

	muy efectiva	algo efectiva	no efectiva	no se
Rifaximina en diarrea	39.5% (120)	56.6% (172)	3.3% (10)	0.7% (2)
Dieta en diarrea	36.8% (112)	50.3% (153)	11.5% (35)	1.3% (4)
Loperamida en diarrea	34.2% (104)	49.3% (150)	10.9% (33)	5.6% (17)
Colestiramina en diarrea	31.6% (96)	40.1% (122)	16.8% (51)	11.5% (35)
Antiespasmódicos en diarrea	29.6% (90)	45.4% (138)	14.8% (45)	10.2% (31)
Trimebutina en diarrea	26.0% (79)	65.1% (198)	7.6% (23)	1.3% (4)
Trimebutina/simeticona en diarrea	26.0% (79)	56.2% (171)	14.8% (45)	3.0% (9)
Amitriptilina en diarrea	25.3% (77)	43.1% (131)	12.8% (39)	18.8% (57)
Probióticos en diarrea	18.1% (55)	54.3% (165)	18.4% (56)	9.2% (28)
Alverina/simeticona en diarrea	15.5% (47)	54.6% (166)	20.7% (63)	9.2% (28)
Otilonio en diarrea	14.8% (45)	58.2% (177)	18.1% (55)	8.9% (27)
Pinaverio en diarrea	8.6% (26)	49.0% (149)	26.6% (81)	15.8% (48)
Bismuto en diarrea	7.2% (22)	43.4% (132)	35.5% (108)	13.8% (42)
Otros antibióticos en diarrea	6.9% (21)	32.2% (98)	35.5% (108)	25.3% (77)
Carbón en diarrea	1.0% (3)	17.4% (53)	55.3% (168)	26.3% (80)