Contributeurs

MAS-I: Modern Actuarial Statistics I (ACT-2000, ACT-2003, ACT-2005)

aut., cre. Alec James van Rassel

Référence (manuels, YouTube, notes de cours) En ordre alphabétique :

- src. Coaching Actuaries, Coaching Actuaries MAS-I Manual.
- src. Cossette, H., ACT-1002 : Analyse probabiliste des risques actuariels, Université Laval, Québec (QC).
- src. Côté, M.-P., ACT-2000 : Analyse statistique des risques actuariels, Université Laval, Québec (QC).
- src. Hogg, R.V.; McKean, J.W.; and Craig, A.T., Introduction to Mathematical Statistics, 7th Edition, Prentice Hall, 2013.
- src. Luong, A., ACT-2000 : Analyse statistique des risques actuariels, Université Laval, Québec (QC).
- src. Luong, A., ACT-2005 : Mathématiques actuarielles IARD I, Université Laval, Québec (QC).
- src. Marceau, É., ACT-2001 : Introduction à l'actuariat II, Université Laval, Québec (QC).
- src. Starmer, J. (2015). StatQuest. Retrieved from https://statquest.org/.
- src. Tse, Y., Nonlife Actuarial Models, Theory Methods and Evaluation, Cambridge University Press, 2009.
- src. Weishaus, A., CAS Exam MAS-I, Study Manual, 1st Edition, Actuarial Study Materials, 2018.

Contributeurs

- pfr. Sharon van Rassel
- pfr. Louis-Philippe Vignault
- **pfr.** Philippe Morin

Cours re<u>liés</u>

ACT-2000 Analyse statistique des risques actuariels

ACT-2003 Modèles linéaires en actuariat

ACT-2005 Mathématiques actuarielles IARD I

ACT-2009 Processus stochastiques

En partie : mathématiques actuarielles vie I ($\mathbf{ACT-2004}$), séries chronologiques ($\mathbf{ACT-2010}$), introduction à l'actuariat II ($\mathbf{ACT-2001}$) et méthodes numériques ($\mathbf{ACT-2002}$).

Motivation

Inspiré par la chaîne de vidéos YouTube StatQuest et mon étude pour l'examen MAS-I, je crée ce document dans le but de simplifier tous les obstacles que j'ai encourus dans mon apprentissage des statistiques, et ainsi simplifier la vie des actuaires.

L'objectif est d'expliquer les concepts d'une façon claire, concise et visuelle! Je vous prie de me faire part de tous commentaires et de me signaler toute erreur que vous trouvez!

Première partie

Analyse statistique des risques actuariels

Échantillonnage et statistiques

Notatior

- X Variable aléatoire d'intérêt X avec fonction de densité $f(x;\theta)$;
- Θ Ensemble des valeurs possible pour le paramètre θ tel que $\theta \in \Theta$;
- > Par exemple, pour une loi normale $\Theta = \{(\mu, \sigma^2) : \sigma^2 > 0, -\infty < \mu < \infty\}.$ $\{X_1, \ldots, X_n\}$ Échantillon de taille n.
- \gt On pose que les observations ont la même distribution que X;
- > On pose habituellement l'indépendance entre les observations;
- > L'indépendance et la distribution identique rend l'échantillon un **échantillon aléatoire**;
- \rightarrow Lorsque nous avons des observations, ont dénote l'échantillon par $\{x_1, \ldots, x_n\}$ pour représenter des *réalisations* de l'échantillon.

Vraisemblance

Notation

 $\mathcal{L}(\theta;x)$ Fonction de vraisemblance de θ en fonction des observations x;

$$\mathcal{L}(\theta; \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n} f_X(x_i; \theta)$$

où
$$\mathbf{x}^{\top} = (x_1, \dots, x_n).$$

 $\{X_1,\ldots,X_n\}$ Échantillon de *n* observations.

- \rightarrow Si les n observations sont indépendantes entres-elles et proviennent de la même distribution paramétrique (identiquement distribué) c'est un échantillon aléatoire (iid);
- > On peut le dénoter comme $\{X_n\}$.

Pour bien saisir ce que représente la fonction de vraisemblance $\mathcal{L}(\theta; \mathbf{x})$, il faut songer à ce que représente $f(x; \theta)$.

La fonction de vraisemblance $\mathcal{L}(\theta; \mathbf{x})$ se résume à une différente façon de voir la fonction de densité $f(x; \theta)$.

 \rightarrow Au lieu de faire varier x pour un (ou des) paramètre θ fixe, on fait varier θ pour un échantillon d'observations x fixé;

Qualité de l'estimateur

La première section traite de **«estimateurs ponctuels »**. C'est-à-dire, on produit une seule valeur comme notre meilleur essai pour déterminer la valeur de la population inconnue. Intrinsèquement, on ne s'attend pas à ce que cette valeur (même si c'en est une bonne) soit la vraie valeur exacte.

Une hypothèse plus utile à des fins d'interprétation est plutôt un **estimateur par intervalle**; au lieu d'une seule valeur, il retourne un intervalle de valeurs plausibles qui peuvent toutes être la vraie valeur. Le type principal d'*estimateur par intervalle* est *l'intervalle de confiance* traité dans la deuxième sous-section.

En bref:

Estimateur ponctuel L'estimateur $\hat{\theta}_n$ assigne une valeur précise à θ selon l'échantillon.

Estimateur par intervalle Un intervalle aléatoire, construit avec l'échantillon aléatoire, ayant une certaine probabilité de contenir la vraie valeur θ .

Estimation ponctuelle

Biais

Notation

 θ Paramètre inconnu à estimer :

 Θ Ensemble des valeurs possibles pour $\theta\,;$

 \succ Dans le cas multivarié, on a un vecteur $\pmb{\theta}$ et on définit un ensemble des valeurs possibles $\pmb{\Theta}$;

> Par exemple, une loi Gamma a $\theta = \{\alpha, \beta\}$ et, puisque ces paramètres sont strictement positif, $\Theta = \{\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^+\}$.

 $\hat{\theta}_n$ Estimateur de θ basé sur n observations;

> Souvent, on écrit $\hat{\theta}$ pour simplifier la notation.

 $B(\hat{\theta}_n)$ Biais de l'estimateur $\hat{\theta}_n$.

Lorsque nous avons un estimateur $\hat{\theta}_n$ pour un paramètre inconnu θ on espère que, **en moyenne**, ses erreurs de prévision seront nulles. Le **biais** $B(\hat{\theta}_n)$ d'un estimateur quantifie les erreurs de l'estimateur dans ses prévisions de la vraie valeur du paramètre θ .

Biais d'un estimateur

$$B(\hat{\theta}_n) = E[\hat{\theta}_n | \theta] - \theta$$

οù

 $\mathrm{E}[\hat{\theta}_n|\theta]$ l'espérance de l'estimateur $\hat{\theta}_n$ sachant que la vraie valeur du paramètre est θ .

Estimateur sans biais lorsque le biais d'un estimateur est nul :

$$B(\hat{\theta}_n) = 0$$

Estimateur asymptotiquement sans biais lorsque le biais d'un estimateur tend vers 0 alors que le nombre d'observations sur lequel il est basé tend vers l'infini :

$$\lim_{n\to\infty} \mathbf{B}(\hat{\theta}_n) = 0$$

Bien que le biais quantifie les erreurs de prévisions de l'estimateur $\hat{\theta}_n$, il n'indique pas la variabilité de ses prévisions. Imagine une personne ayant ses pieds dans de l'eau bouillante et sa tête dans un congélateur. **En moyenne**, sa température corporelle est tiède. *En réalité*, sa température corporelle est à la fois extrêmement élevée et faible.

Les prévisions des estimateurs non biaisés seront toujours proches de la vraie valeur θ . Cependant, être bon *en moyenne* n'est pas suffisant et on souhaite évaluer la variabilité des prévisions d'un estimateur $\hat{\theta}_n$ avec sa variance $\text{Var}(\hat{\theta}_n)$.

Borne Cramér-Rao

Notation

 $S(\theta)$ Fonction de Score, $S(\theta) = \frac{\partial \ln f(\theta;x)}{\partial \theta}$;

 $I_n(\theta)$ Matrice d'information de Fisher d'un échantillon aléatoire $\{X_n\}$;

- > La matrice d'information Fisher pour une seule observation sera donc dénotée $I(\theta)$;
- > On obtient une "matrice" lorsque nous estimons plusieurs paramètres et donc θ n'est pas juste un scalaire θ .

 $\hat{\theta}^{EMV}$ Estimateur du maximum de vraisemblance de $\theta.$

Lorsque l'on analyse la variance d'un estimateur <u>sans biais</u>, on débute par définir la **borne inférieure de Cramér-Rao** de sa variance $Var(\hat{\theta}_n)$. Cette borne utilise la matrice d'information de Fisher $I_n(\theta)$:

Borne inférieure Cramér-Rao

Sous certaines conditions de régularité,

$$\operatorname{Var}(\hat{\theta}_n) \geq \frac{1}{I_n(\theta)}$$

οù

$$I(\theta) = \mathrm{E}\left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(\theta; x)\right)^{2}\right] \stackrel{\mathrm{iid}}{=} \mathrm{E}\left[-\frac{\partial^{2} \ln f(\theta; x)}{\partial \theta^{2}}\right]$$

$$I_n(heta) = \mathrm{E}\left[\left(rac{\partial}{\partial heta} \ln \mathcal{L}(heta; oldsymbol{x})
ight)^2
ight] \stackrel{\mathrm{iid}}{=} \mathrm{E}\left[-rac{\partial^2 \ln \mathcal{L}(heta; oldsymbol{x})}{\partial heta^2}
ight]$$

Note Dans le cas d'un échantillon aléatoire (alias, les données sont iid) on obtient la deuxième équation et $I_n(\theta) = nI(\theta)$.

Détails sur la borne Cramér-Rao

La borne de Cramér-Rao est un concept qui échappe souvent aux étudiants. Sur la base de ce vidéo et de ce vidéo, je vais tenter d'expliquer l'intuition sous-jacente au concept. Ce concept va réapparaître plus tard dans le bac et donc, s'il n'est pas clair d'ici la fin de la section, je vous conseille d'aller visionner les vidéos.

Premièrement, on définit l'utilité des deux premières dérivées :

 $\frac{\partial}{\partial \theta} \mathcal{L}(\theta)$: Représente le « rate of change » de la fonction;


 $\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \mathcal{L}(\theta)$: Représente la concavité de la fonction; on peut y penser comme sa forme.

L'estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) $\hat{\theta}^{\text{EMV}}$ du paramètre θ d'une distribution maximise la fonction de vraisemblance en fonction d'un échantillon aléatoire. En posant la première dérivée de la fonction de vraisemblance comme étant égale à 0, on trouve le "point" auquel l'EMV est égale à θ — $\theta^{\text{EMV}} = \theta$.

Note : L'EMV devient un "point" lorsqu'on le calcule pour un échantillon aléatoire d'observations.

La fonction de vraisemblance **est concave** et, puisque sa première dérivée est nulle à $\hat{\theta}_n^{\rm EMV}$, elle va augmenter avant puis diminuer après. La première dérivée permet donc de trouver une fonction qui est maximisée à $\hat{\theta}_n^{\rm EMV}$ Cependant, ceci ne permet pas d'identifier une fonction unique—plusieurs fonctions peuvent être maximisées au même **point** tout en ayant des formes différentes.

Par exemple, on trace ci-dessous la fonction de vraisemblance et une autre fonction maximisée à $\hat{\theta}_n^{\rm EMV}$:



On peut donc voir que la forme de la fonction de vraisemblance est plus comprimée, alias que la concavité est plus forte, que l'autre fonction qui se maximise au même point. C'est-à-dire, la fonction de vraisemblance correspond à la fonction avec la plus forte concavité dont le maximum est à $\hat{\theta}_n^{\rm EMV}$.

On peut observer que plus la concavité augmente, plus la variabilité de la fonction de vraisemblance se rapetisse. En effet, une faible concavité implique que la fonction de vraisemblance a un grand étendue de valeurs possibles et moins de points près de $\hat{\theta}^{\rm EMV}$. En bref, la deuxième dérivée assure que parmi les fonctions se maximisant à $\hat{\theta}_n^{\rm EMV}$, la fonction de vraisemblance est celle dont la variabilité des prévisions est minimisée

L'information de Fisher permet de quantifier cette fonction de la deuxième dérivée. Puis, la borne de Cramér-Rao se définit comme son réciproque $1/I(\theta)$. L'intuition est que plus la concavité est faible, plus l'étendue est grand. Prendre le réciproque de l'information de Fisher permet donc de quantifier l'agrandissement de l'étendu.

Lorsque l'information de Fisher tend vers l'infini (alias la force de la concavité croît infiniment), on dit que la distribution de l'estimateur est "asymptotiquement normale" tel que $\hat{\theta}^{\rm EMV} \stackrel{a.s.}{\longrightarrow} \mathcal{N}\left(\mu = \theta, \sigma^2 = \frac{1}{I(\theta)}\right)$ où a.s. veut dire asymptotiquement.

Efficacité

Notation

eff $(\hat{\theta}_n)$ Efficacité d'un estimateur $\hat{\theta}_n$; eff $(\hat{\theta}_n, \tilde{\theta}_n)$ Efficacité de l'estimateur $\hat{\theta}_n$ relatif à l'estimateur $\tilde{\theta}_n$.

Avec le concept de l'information de Fisher, on définit **l'efficacité d'un estimateur** comme le ratio de la borne Cramér-Rao sur la variance de l'estimateur :

Efficacité d'un estimateur

$$\operatorname{eff}(\hat{\theta}_n) = \frac{\operatorname{Var}(\hat{\theta}_n)^{\operatorname{Rao}}}{\operatorname{Var}(\hat{\theta})} = \frac{1}{I(\theta)\operatorname{Var}(\hat{\theta})}$$

Estimateur « efficient » Lorsque la variance de l'estimateur $\text{Var}(\hat{\theta}_n)$ est égale à la borne de Cramér-Rao.

$$\operatorname{eff}(\hat{\theta}_n) = 1$$

> Étant égal à la borne, il *doit* être l'estimateur avec la plus petite de tous les estimateurs sans biais.

On dit qu'il est le « Minimum Variance Unbiased Estimator (MVUE) ».

De plus, on peut généraliser cette formulation pour obtenir l'efficacité relative d'un estimateur à un autre :

Efficacité relative

$$\operatorname{eff}(\hat{\theta}_n, \tilde{\theta}_n) = \frac{\operatorname{Var}(\hat{\theta}_n)}{\operatorname{Var}(\tilde{\theta}_n)}$$

où les estimateurs $\hat{\theta}_n$ et $\tilde{\theta}_n$ sont sans biais.

Lorsque:

 $\operatorname{eff}(\hat{\theta}_n, \tilde{\theta}_n) < 1$: L'estimateur $\hat{\theta}_n$ est plus efficace que l'estimateur $\tilde{\theta}_n$, et vice-versa si $\operatorname{eff}(\hat{\theta}_n, \tilde{\theta}_n) > 1$.

Convergence

Nous pouvons également évaluer si un estimateur converge avec des très grands échantillons; ceci évalue si un estimateur est cohérent. Un estimateur $\hat{\theta}_n$ est dit d'être « consistent » si la probabilité que sa prévision $\hat{\theta}$ du paramètre θ diffère de la vraie valeur par une erreur, près de 0, ϵ tend vers 0 alors que la taille de l'échantillon n tend vers l'infini :

Convergence (consistency) d'un estimateur

$$\lim_{n\to\infty}\Pr(\left|\hat{\theta}_n-\theta\right|>\epsilon)=0,\quad \epsilon>0$$

Ce critère pour qu'un estimateur $\hat{\theta}_n$ soit « consistent » peut être satisfait lorsque :

1. l'estimateur est asymptotiquement sans biais;

$$\lim_{n\to\infty} \mathbf{B}(\hat{\theta}_n) = 0$$

2. la variance de l'estimateur tend vers 0.

$$\lim_{n\to\infty} \operatorname{Var}(\hat{\theta}_n) = 0$$

D'ailleurs, nous avons déjà raisonné ceci avec la borne inférieure Cramér-Rao. Cependant, l'inverse n'est pas vrai—qu'un estimateur soit « consistent » n'implique pas que sa variance ni que son biais tendent vers 0.

Malgré la nature plaisante de la convergence d'un estimateur, beaucoup d'estimateurs ont cette propriété. Nous voulons alors une mesure qui n'indique pas seulement qu'un estimateur arrive près de la bonne valeur souvent (alias, une très petite variance), mais qu'il est mieux que d'autres estimateurs. De plus, dût à la sélection arbitraire de l'erreur ϵ pour la consistency d'un estimateur, il est possible de la choisir malicieusement afin de faire parler les données comme on le souhaite.

Détails sur la convergence

On reprend les résultats de la section précédente en expliquant plus en détail la mathématique sous-jacente.

≡ Convergence en probabilité


Notation


 $\{Y_n\}$ Séquence de variables aléatoires;


Y Variable aléatoire comprise dans $\{Y_n\}.$

On dit que Y_n converge en probabilité à Y si $\forall \varepsilon > 0$, $\lim_{n \to \infty} \Pr[|Y_n - Y| \ge \varepsilon] = 0$ ou de façon équivalente, $\lim_{n \to \infty} \Pr[|Y_n - Y| < \varepsilon] = 1$ On dénote la convergence en probabilité par : $Y_n \stackrel{P}{\to} Y$.

Note : La convergence en probabilité est d'ailleurs le théorème sous-jacent à la loi faible des grands nombres vue en prob.







Erreur quadratique moyenne

Notation

 $\mathbf{MSE}_{\hat{\theta}_n}(\theta)$ Erreur quadratique moyenne d'un estimateur $\hat{\theta}_n$

On défini alors l'Erreur Quadratique Moyenne (EQM), ou Mean Squared Error (MSE), permettant de comparer les différents estimateurs ayant tous une bonne *consistency* en assurant une cohérence d'interprétation. Cette mesure permet de quantifier l'écart entre un estimateur $\hat{\theta}_n$ et le vrai paramètre θ .

Erreur Quadratique Moyenne (Mean Squared Error)

$$MSE_{\hat{\theta}}(\theta) = E[(\hat{\theta}_n - \theta)^2] \Leftrightarrow Var(\hat{\theta}_n) + [B(\hat{\theta}_n)]^2$$

En combinant tous ces critères, le meilleur estimateur est alors l'estimateur sans biais ayant la plus petite variance possible parmi tous les estimateurs sans biais. C'est-à-dire, le Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator (UM-VUE).

Estimation par intervalles

Notation

 $\hat{\theta}_L$ et $\hat{\theta}_U$ Fonctions de l'échantillon aléatoire $\{X_1, \dots, X_n\}$ où $\boxed{\hat{\theta}_L < \hat{\theta}_U}$; $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ Intervalle de confiance de $100(1-\alpha)\%$ de θ si $\Pr(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U) = 1-\alpha$; \Rightarrow Avec les réalisations, on a un intervalle de nombres réels $(\hat{\theta}_l, \hat{\theta}_u)$. $(1-\alpha)$ Niveau de confiance de l'intervalle où $\alpha \in (0,1)$.

Le type principal d'estimateur par intervalle est l'intervalle de confiance :

Intervalle de confiance

Nous sommes confiants à un niveau de $100(1-\alpha)\%$ que le paramètre inconnu θ est entre $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$.

De façon équivalente, nous sommes confiants à un seuil de $\alpha\%$ que θ est entre $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$.

Donc, $\theta \in (\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ et nous pouvons dire que $\Pr(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U) \geq (1 - \alpha)$ pour tout θ .

Ce qu'il faut bien saisir avec les intervalles de confiance, c'est que soit θ est contenu dans l'intervalle $(\hat{\theta}_l, \hat{\theta}_u)$ ou il ne l'est pas.

On peut conceptualiser les intervalles comme une distribution binomiale avec probabilité de succès de $(1-\alpha)$. Si l'on effectue M essais indépendants, on s'attend à ce que $(1-\alpha)M$ intervalles de confiance contiennent θ . Donc on se sent confiant à $(1-\alpha)$ % que la vraie valeur de θ est contenue dans l'intervalle observé $(\hat{\theta}_l, \hat{\theta}_u)$.

Efficacité des intervalles de confiance Typiquement, la largeur de l'intervalle $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ augmente si on augmente le niveau de confiance $(1 - \alpha)$. Par exemple, pour être certain à 100% que l'intervalle va contenir la valeur, on a qu'à faire un intervalle $(-\infty, \infty)$.

Donc, un intervalle plus petit nous donne plus d'information si le niveau est adéquat. On dit que pour un même niveau $(1-\alpha)$, l'intervalle avec la plus petite largeur est plus efficace que l'autre.

Statistiques

Rappel : Loi du khi-carré

Soit un échantillon aléatoire (X_1, X_2, \dots, X_n) de variables aléatoires normales de moyenne μ et variance σ^2 .

Soit
$$Q = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2$$
.

Alors,
$$Q/\sigma^2 \sim \chi^2_{(n)}$$
.

Rappel: Loi de Student

Soit les variables aléatoires indépendantes :

- $\rightarrow Z \sim \mathcal{N}(0,1).$
- > $W \sim \chi^2_{(n)}$.

Alors,
$$T = \frac{Z}{\sqrt{W/n}} \sim t_{(n)}$$
.

La loi de Student tend vers la normale lorsque n est très grand.

Rappel: Loi de Fisher-Snedecor (F)

Soit les variables aléatoires indépendantes :

- > $W_1 \sim \chi^2_{(\nu_1)}$.
- > $W_2 \sim \chi^2_{(\nu_2)}$.

Alors,
$$F = \frac{W_1/\nu_1}{W_2/\nu_2} \sim \mathcal{F}_{(\nu_1,\nu_2)}$$

On peut relier la loi de Student et la loi F : $T^2 = \frac{Z^2}{W/n} \sim \mathcal{F}_{(1,n)}$ puisque

$$Z^2 \sim \chi^2_{(1)}$$
 où $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

\square Statistique de test T_n

 T_n est une statistique de test basée sur un échantillon aléatoire de n observations.

- > C'est donc une fonction d'un échantillon aléatoire;
- > Sa distribution est la **distribution d'échantillonnage** qui dépend de :

- 1. La statistique.
- 2. La taille de l'échantillon.
- 3. La distribution sous-jacente des données.

\vee Moyenne échantillonnale \bar{X}

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

- \rightarrow Estime sans biais la moyenne μ ;
- > Si on pose que l'échantillon aléatoire est normalement distribué, $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$;
- > On centre et réduit pour trouver que $T_n = \frac{\bar{X} \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$;
- > Si σ^2 est inconnue, on l'estime avec s_n^2 pour obtenir une distribution student— $T_n = \frac{\bar{X} \mu}{S_n / \sqrt{n}} = \frac{Z}{\sqrt{W/(n-1)}} \sim t_{(n-1)}$ où $W \sim \chi^2_{(n-1)}$.

\vee Variance échantillonnale S_n^2

$$S_n^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

- > Estime sans biais la vraie variance σ^2 ;
- > S_n^2 n'est pas normalement distribuée, cependant la statistique $T_n = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{(n-1)}^2 \,.$

\checkmark Variance empirique $\hat{\sigma}^2$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

> Estime avec biais la vraie variance σ^2 .

igstyle igytyle igstyle igytyle igytyle

$$F = \frac{S_n^2/\sigma_1^2}{S_m^2/\sigma_2^2}$$

 \rightarrow Si on pose que les deux échantillons aléatoires indépendants (X_1,\ldots,X_n)

et (Y_1, \ldots, Y_m) sont normalement distribués, $F \sim \mathcal{F}_{(n-1,m-1)}$.


Note sur majuscule vs minuscule On écrit les statistiques avec des majuscules lorsqu'elles sont aléatoires et avec des minuscules lorsque ce sont des réalisations. Par exemple, dans une probabilité on utilise une majuscule puisque la statistique est aléatoire. Pour un seuil α <u>fixé</u> d'un intervalle de confiance, le quantile n'est pas aléatoire et jusqu'à ce que l'on calcule l'intervalle avec l'échantillon observé, les statistiques sont également aléatoires.

Intervalles de confiance

■ Intervalle de confiance sur la variance

Pour l'échantillon aléatoire $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ issu d'une distribution normale avec σ^2 inconnue, $\Pr\left(\chi^2_{1-\alpha/2} \leq \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{\alpha/2}\right) = (1-\alpha)$.

Graphiquement:




Nous sommes donc confiants à un niveau de $100(1-\alpha)\%$ que :

$$\sigma^2 \in \left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right]$$

\blacksquare Intervalle de confiance sur la moyenne (σ^2 connue)

Pour l'échantillon aléatoire $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ issu d'une distribution normale avec μ inconnu et σ^2 connue, $\Pr\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right) = (1 - \alpha)$.

Graphiquement:



Nous sommes donc confiants à un niveau de $100(1-\alpha)\%$ que :

$$\mu \in \left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

\blacksquare Intervalle de confiance sur la moyenne (σ^2 inconnue)

Pour l'échantillon aléatoire $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ issu d'une distribution normale avec σ^2 inconnue, $\Pr\left(-t_{\alpha/2, n-1} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S_n/\sqrt{n}} \leq t_{\alpha/2, n-1}\right) = (1 - \alpha)$.

Graphiquement:



Nous sommes donc confiants à un niveau de $100(1-\alpha)\%$ que :

$$\mu \in \left[\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{S_n}{\sqrt{n}}\right].$$

■ Intervalle de confiance approximatif sur la moyenne

Pour l'échantillon aléatoire $\{X_1,X_2,\ldots,X_n\}$ issu d'une distribution avec moyenne μ et une variance inconnue.

Pour n très grand, nous sommes approximativement confiants à un niveau de $100(1-\alpha)\%$ que :

$$\mu \in \left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}\right].$$

■ Intervalle de confiance approximatif sur la proportion

Pour l'échantillon aléatoire $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ issu d'une distribution Bernoulli de paramètre p.

Pour n très grand, nous sommes approximativement confiants à un niveau de $100(1-\alpha)\%$ que :

$$p \in \left[\hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right].$$

On définit le « pooled estimator » comme la moyenne pondérée des deux variances échantillonnales $S_p^2 = \frac{(n-1)S_n^2 + (m-1)S_m^2}{n+m-2}$.

■ Intervalle de confiance pour une différence de moyennes

Pour les échantillons aléatoires $\{X_1, X_2, \ldots, X_n\}$ et $\{Y_1, Y_2, \ldots, Y_m\}$ issus de distributions normales de moyennes μ_1 et μ_2 et variance $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ inconnues.

Nous sommes confiants à un niveau de $100(1-\alpha)\%$ que :

$$(\mu_1-\mu_2)\in\left[\bar{x}_n-\bar{y}_m\pm t_{\alpha/2,n+m-2}S_p\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}\right].$$

■ Intervalle de confiance approximatif pour une différence de moyennes

Pour les échantillons aléatoires $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ et $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_m\}$ issus de distributions normales de moyennes μ_1 et μ_2 et variances σ_1^2 et σ_2^2 inconnues.

Pour n très grand, nous sommes approximativement confiants à un niveau de $100(1-\alpha)\%$ que :

$$(\mu_1-\mu_2)\in\left[ar{X}_n-ar{Y}_m\pm z_{\alpha/2}\sqrt{rac{S_n^2}{n}+rac{S_m^2}{m}}
ight].$$

≡ Intervalle de confiance *approximatif* pour une différence de proportions

Pour les échantillons aléatoires $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ et $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_m\}$ issus de distributions Bernoulli de paramètres p_1 et p_2 .

Pour n très grand, nous sommes approximativement confiants à un niveau de $100(1-\alpha)\%$ que :

$$(p_1-p_2) \in \left[\hat{p}_1-\hat{p}_2\pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n}+\frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{m}}\right].$$

Tests d'hypothèses

Introduction

Contexte

Les statistiques classiques posent que tout phénomène observable est régi par un "processus" sous-jacent.

On ne peut jamais savoir exactement ce qu'est ce "processus"; le mieux que l'on peut faire est d'émettre des $hypoth\`eses$ vraisemblables sur ce qu'il pourrait être.

Par la suite, on analyse les observations en présumant qu'elles sont régies par le processus hypothétique et détermine la *vraisemblance des observations*. On accepte le processus hypothétique si la vraisemblance est suffisamment élevée.

Notation

 Θ_0 et Θ_1 Sous-ensembles disjoints de Θ tel que $\Theta_0 \cup \Theta_1 = \Theta$;

 \mathbf{H}_0 Hypothèse nulle;

> Représente généralement le statu quo jusqu'à preuve contraire.

 \mathbf{H}_1 Hypothèse alternative.

> Représente généralement un changement du statu quo.

Test d'hypothèse

On spécifie une hypothèse nulle et par conséquent une hypothèse alternative : $H_0: \theta \in \Theta_0$ vs $H_1: \theta \in \Theta_1$

Puis, on spécifie une expérience et un test pour décider si l'on accepte ou rejette l'hypothèse nulle.

Terminologie

Hypothèse simple Spécifie entièrement une distribution de probabilité.

> Par exemple, $\mathcal{H}_0: q=0.50$ —on connaît la valeur exacte du paramètre q pour une distribution Bernoulli.

Hypothèse composite Spécifie partiellement une distribution de probabilité.

> Par exemple, $\mathcal{H}_1: q \neq 0.50$.—on ne connaît pas la valeur exacte du paramètre q, il pourrait être n'importe quel chiffre sauf 0.50.

Exemple du laissez-passer universitaire (LPU)

Par exemple, on veut savoir si les étudiants utilisent l'autobus (oui ou non) avant et après l'implantation du LPU.

On pose que la proportion des gens qui utilisent l'autobus est q = 0.44. Il y a deux types de tests qu'on peut faire,

 \rightarrow Tester si l'utilisation est différente est un test "bilatéral", car on teste si elle a augmenté ou diminuée;

$$H_0: q = 0.44$$
 $H_1: q \neq 0.44$

> Tester si l'utilisation a augmenté est un test "unilatéral", car on teste uniquement si elle a augmenté.

$$H_0: q = 0.44$$
 $H_1: q > 0.44$

Un test unilatéral requiert que l'on sache déjà que la proportion de gens "doit" être supérieure. Un test bilatéral est plus conservatif et test les deux possibilités, il devrait donc être celui qu'on applique par défaut.

L'hypothèse:

nulle dans les deux cas est que, en moyenne, l'utilisation de l'autobus n'a pas *changée*.

alternative dans le cas d'un test :

 ${\bf unilat\'eral}\,$ est que, en moyenne, l'utilisation a ${\it augment\'ee}.$

bilatéral est que, en moyenne, l'utilisation a changée.

= Région critique

Notation

 ${\mathcal S}$ "Ensemble" de tous les résultats possible pour l'échantillon aléatoire ;

 \mathcal{C} Région critique du test qui est un sous-ensemble de \mathcal{S} .

On rejette H_0 si $\{X_1, \ldots, X_n\} \in \mathcal{C}$. On conserve H_0 si $\{X_1, \ldots, X_n\} \in \mathcal{C}^c$.

 \gt On peut aussi dire « **région de rejet** ».

Exemple du laissez-passer universitaire (LPU)

On reprend l'exemple du LPU.

L'ensemble des résultats possibles est S = [0, 1].

- > Un test "bilatéral" a comme région critique $C = [0,0.44) \cup (0.44,1]$;
- > Un test "unilatéral" testant l'augmentation a comme région critique $\mathcal{C}=(0.44,1].$

On peut donc faire 2 types d'erreurs :

	Vrai état	
Décision	H_{0}	H_1
Rejeter	Erreur	Bonne
H ₀	de type I	décision
Accepter	Bonne	Erreur
H ₀	décision	de type II

Certitude du test

Lorsque nous voulons quantifier le degré auquel nous sommes confiants du test, nous utilisons la valeur p.

La valeur p a trois composantes :

- 1. La probabilité que l'événement se produise aléatoirement.
- 2. La probabilité qu'un événement tout aussi rare se produise.
- 3. La probabilité qu'un événement encore plus rare se produise.

Exemple de pile ou face

On souhaite tester si, en obtenant deux piles sur deux lancers, nous avons une pièce de monnaie truquée :

Hypothèse nulle Ma pièce de monnaie n'est pas truquée même si j'ai obtenu deux piles.

Étapes du calcul de la valeur p:

- 1. On calcule la probabilité d'obtenir 2 piles : $0.5 \times 0.5 = 0.25$.
- 2. Puis, on calcule la probabilité d'obtenir 2 faces (un événement tout aussi rare) : $0.5 \times 0.5 = 0.25$.
- 3. Finalement, il n'y a pas d'autres séquences plus rares.

Donc, la valeur p du test est de 0.50.

- > Ceci est plutôt élevé;
- \succ Souvent, on pose que la valeur p du test doit être d'au plus $0.05\,;$
- > Ce qui veut dire que des événements tout aussi (ou plus) rares doivent arriver moins que 5% du temps pour que l'on considère la pièce de monnaie comme étant truquée;
- > Donc, dans notre cas, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle que notre pièce de monnaie n'est pas spéciale.

Dans le cas continu, on somme les probabilités d'être plus rare ou d'être moins rare. C'est la même idée que les intervalles de confiance avec la valeur p, ou seuil de signifiance α , représenté en rouge.

- \gt Si la valeur p est petite, ceci indique que d'autres distributions pourraient potentiellement mieux s'ajuster aux données puisque l'événement est très rare;
- \gt Si la valeur p est grande, ceci indique que l'événement est très courant et que la distribution semble être bien ajustée.

Il y a plusieurs termes semblables qui peuvent devenir mélangeants.

Terminologie

- p La **valeur** p du test.
- > On peut la définir comme la probabilité d'un événement tout aussi (ou plus) rare sous l'hypothèse nulle;
- \rightarrow On peut la définir comme la taille de la région critique \mathcal{C} ; c'est-à-dire, l'aire de la région de rejet de l'hypothèse nulle H₀ alors qu'elle est vraie;
- > On peut la définir comme le seuil de signifiance : c'est-à-dire, la probabilité de rejeter H₀ alors qu'elle est vraie;
- > Elle correspond donc également à la probabilité d'une erreur de type
- α Dénote habituellement le seuil de signifiance ou la taille du test.
- > Même idée qu'avec les intervalles de confiance;
- > On peut parfois aussi utiliser α pour dénoter la valeur de p qui détermine si on rejette ou pas un test;
- > En anglais, « threshold for significance ».

Formellement, on définit $\alpha = \max_{\theta \in \Theta_0} \Pr\{(X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{C}; \theta\}$

C'est-à-dire:

- > on maximise la probabilité que l'échantillon aléatoire soit contenu dans la région critique (alias rejeter H_0),
- \rightarrow où la distribution est tracée en fonction du paramètre θ de l'hypothèse nulle.

Puissance d'un test

La puissance d'un test

La probabilité de *correctement* rejeter l'hypothèse nulle.


Une analyse de la puissance détermine le nombre d'observations qu'il faut afin d'avoir une probabilité élevée de correctement rejeter l'hypothèse nulle.

Plusieurs facteurs influencent la puissance d'un test. Lorsqu'on teste si deux échantillons d'observations proviennent de la même distribution,


≡ La forme de la distribution

Si les deux distributions sont :

> Très distinctes, la puissance sera très élevée :



- La probabilité de **correctement** rejeter l'hypothèse nulle (que les deux échantillons proviennent d'une même distribution) est élevée :
- On peut aussi dire qu'il y a une forte probabilité de **correctement** obtenir une faible valeur p.
- > Se chevauchent, la puissance sera faible :




- La probabilité **d'incorrectement** rejeter l'hypothèse nulle (que les deux échantillons proviennent d'une même distribution) est élevée :
- On peut aussi dire qu'il y a une forte probabilité d'incorrectement obtenir une faible valeur p;
- Cependant, la puissance peut être augmentée avec plus d'observations.


■ La variabilité des données

Si la variabilité de la distribution est

> Faible, alors la variabilité de l'échantillon sera probablement faible aussi menant à une puissance très élevée :



> Élevée, alors la variabilité de l'échantillon sera probablement élevée aussi menant à une puissance faible :



Il existe plusieurs mesures qui permettent de considérer la variabilité des données ainsi que la forme de la distribution. Entres autre, il y a le « effect size (d) » où

$$d = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_p^2} \ .$$

■ La taille de l'échantillon de données

Un grand échantillon de données peut compenser pour des distributions qui se chevauchent ou une variabilité élevée. Ça permet d'augmenter notre confiance qu'il y a bel et bien une différence entre les échantillons.

En contraste, nous n'avons pas besoin d'un grand échantillon de données pour des distributions très distinctes ou avec une faible variabilité; nous sommes déjà confiants que les distributions sont différentes.

≡ Le test statistique

Certains tests ont une puissance plus élevée que les autres. Cela dit, le test t habituel est très puissant.

La fonction de puissance

La fonction de puissance est $\gamma(\theta) = \Pr\{(X_1, ..., X_n) \in \mathcal{C}; \theta\}$; c'est-à-dire, la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle H_0 si la **vraie** valeur du paramètre est $\theta \in \Theta$.

- \rightarrow C'est une fonction de θ ;
- > Idéalement, si l'hypothèse nulle est :

acceptée on souhaite que $\gamma(\theta) = 0$ puisque $\theta \in \Theta_0$.

– On dénote $\gamma(\theta_0) = \Pr\{(X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{C}; \theta \in \Theta_0\} = 0.$

rejetée on souhaite que $\gamma(\theta) = 1$ puisque $\theta \in \Theta_1$.

– On dénote $\gamma(\theta_1) = \Pr\{(X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{C}; \theta \in \Theta_1\} = 1.$

Si, par exemple, on rejette l'hypothèse nulle, on pourrait tracer la fonction de puissance pour toutes les valeurs possibles de l'ensemble Θ_1 .

Tests optimaux

Notation

 δ (Procédure de) test;

 $\alpha(\delta)$ Probabilité d'une erreur de type I pour un test δ ;

$$> \alpha(\delta) = \Pr\{(X_1, \ldots, X_n) \in \mathcal{C}; \theta \in \Theta_0\} = \gamma(\theta_0).$$

 $\beta(\delta)$ Probabilité d'une erreur de type II pour un test δ ;

$$> \beta(\delta) = \Pr \left\{ (X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{C}^{\complement}; \theta \in \Theta_1 \right\} = 1 - \gamma(\theta_1).$$

Pour mettre en contexte cette notation, revoici le tableau des types d'erreurs pour un test δ :

	Vrai état	
Décision	$H_0 \Rightarrow \theta \in \Theta_0$	$H_1 \Rightarrow \theta \in \Theta_1$
Rejeter H_0 $(X_1,\ldots,X_n)\in\mathcal{C}$	$lpha(\delta)$	$1-eta(\delta)$
Accepter H_0 $(X_1,\ldots,X_n)\in\mathcal{C}^\complement$	$1-lpha(\delta)$	$eta(\delta)$

- > En théorie, on minimise la probabilité d'une erreur de type I et de II;
- > En réalité, il y a un compromis et on ne pourra pas avoir des très petites probabilités pour les deux;
- > Le contexte va déterminer ce qu'on souhaite minimiser le plus ;
 - Par exemple, soit l'hypothèse nulle que quelqu'un n'a pas le cancer;
 - Il est plus grave de dire à quelqu'un qu'il n'a pas le cancer alors qu'il l'a (erreur de type II) que de dire qu'il a le cancer alors qu'il ne l'a pas (erreur de type I);
 - Dans ce contexte, on souhaiterait minimiser l'erreur de type II $\beta(\delta)$ plus que celle de type I $\alpha(\delta)$.

Puisqu'il est impossible de trouver un test δ pour lequel les probabilités d'erreurs de type I et II sont très petites, on :

- 1. Fixe l'erreur de type I à un seuil, alias une taille de région critique, k.
- 2. Trouve parmi tous les sous-ensembles de taille k celui qui minimise l'erreur de type II.

▼ Tests optimaux

Soit un test δ^* avec les hypothèses simples :

$$H_0:\theta=\theta_0$$

$$H_1: \theta = \theta_1$$

> Par exemple, on pourrait avoir une distribution Bernoulli et poser $H_0: p = 0.4$ v.s. $H_1: p = 0.6$.

La procédure pour trouver la région critique $\mathcal C$ optimale de taille α du test δ^* est la suivante :

- 1. On trouve une région critique (alias, un sous-ensemble de \mathcal{S}) \mathcal{C} tel que la probabilité $\alpha(\delta^*)$ d'une erreur de type I est de α .
 - $ightharpoonup ext{C'est-\`a-dire}, \ lpha(\delta^*) = Pr\{(X_1,\ldots,X_n) \in \mathcal{C}; \theta = \theta_0\} = lpha$
 - > Cependant, ce critère n'identifie par un sous-ensemble unique;
 - \gt Il y a une multitude de sous-ensembles $\mathcal A$ de $\mathcal S$ dont la probabilité que l'échantillon aléatoire y soit contenu (sous l'hypothèse nulle) est aussi α :
 - \rightarrow C'est-à-dire, $Pr\{(X_1,\ldots,X_n)\in\mathcal{A};\theta=\theta_0\}=\alpha$.
- 2. On pose que la probabilité que l'échantillon aléatoire soit dans la région critique \mathcal{C} (sous l'hypothèse alternative) est supérieure à la probabilité que l'échantillon aléatoire soit contenu dans tout autre sous-ensemble \mathcal{A} .

$$Pr\{(X_1,\ldots,X_n)\in\mathcal{C};\theta=\theta_1\}\geq Pr\{(X_1,\ldots,X_n)\in\mathcal{A};$$

$$\theta = \theta_1$$
 .

Avec ces deux critères, on trouve la région critique C de taille α optimale pour tester les hypothèses simples.

En bref, on pose fixe à un seuil α la fonction de puissance posant que le vrai paramètre $\theta = \theta_0$ puis on trouve la région critique qui maximise la puissance posant que le vrai paramètre $\theta = \theta_1$.

Exemple avec une distribution binomiale

Soit:

- \rightarrow La variable aléatoire $X \sim Binom(n = 3, p = \theta)$.
 - Alors, $S = \{x : x = 0, 1, 2, 3\}.$
- > Les hypothèses :

$$H_0: \theta = 0.50$$

$$H_1: \theta = 0.75$$

- \rightarrow Le seuil de signifiance $\alpha = 0.125$.
- \rightarrow Les sous-ensembles $A_1 = \{x : x = 0\}$ et $A_2 = \{x : x = 3\}$ de S.

Alors, $\Pr(X \in \mathcal{A}_1; \theta = 0.50) = \Pr(X \in \mathcal{A}_2; \theta = 0.50) = 0.125$ et il n'y a pas d'autres sous-ensembles de \mathcal{S} avec la même taille de 0.125.

Il s'ensuit que soit \mathcal{A}_1 ou \mathcal{A}_2 est la région critique \mathcal{C} optimale de taille α pour tester H_0 contre H_1 .

On trouve que $\Pr(X \in \mathcal{A}_1; \theta = 0.75) = 0.015625$ alors que $\Pr(X \in \mathcal{A}_2; \theta = 0.75) = 0.421875$.

> Dans le premier cas :

$$\begin{array}{ll} \Pr(X \in \mathcal{A}_1; \theta = 0.75) = 0.015625 & < & \Pr(X \in \mathcal{A}_1; \theta = 0.50) = 0.125 \\ \text{rejeter } H_0 \text{ alors que } H_0 & \text{rejeter } H_0 \text{ alors que } H_0 \\ \text{est faux } (\theta = 0.75) & \text{est vraie } (\theta = 0.50) \end{array}$$

> Dans le deuxième cas :

$$\begin{array}{ll} \Pr(X \in \mathcal{A}_2; \theta = 0.75) = 0.421875 & > & \Pr(X \in \mathcal{A}_2; \theta = 0.50) = 0.125 \\ \text{rejeter } H_0 \text{ alors que } H_0 & \text{rejeter } H_0 \text{ alors que } H_0 \\ \text{est faux } (\theta = 0.75) & \text{est vraie } (\theta = 0.50) \end{array}$$

- \rightarrow Le premier sous-ensemble \mathcal{A}_1 n'est pas désirable, car on serait plus probable de incorrectement rejeter H_0 lorsqu'elle est vraie (erreur de type I) que de correctement la rejeter lorsqu'elle est fausse!
- \rightarrow Alors, on choisit $C = A_2 = \{x : x = 3\}.$

D'ailleurs, la région est choisie en incluant dans \mathcal{C} les points x pour lesquels $f(x; \theta = 0.50)$ est petite par rapport à $f(x; \theta = 0.75)$.

> On peut d'ailleurs observer que le ratio $\frac{f(x;\theta=0.50)}{f(x;\theta=0.75)}$ évalué à x=5 est un minimum.

On peut utiliser ce ratio comme outil pour identifier la région critique $\mathcal C$ optimale pour un seuil fixe de α .

Cas d'hypothèses simples

Théorème de Neymann-Pearson

Soit un test δ^* avec les hypothèses simple :

$$H_0: \theta = \theta_0$$

$$H_1: \theta = \theta_1$$

Soit une constante k > 0 et le sous-ensemble $\mathcal{C} \in \mathcal{S}$ tel que :

1.
$$\left| \frac{\mathcal{L}(\theta_0; x)}{\mathcal{L}(\theta_1; x)} \le k \right|$$
 pour tout $x \in \mathcal{C}$.

2.
$$\frac{\mathcal{L}(\theta_0;x)}{\mathcal{L}(\theta_1;x)} \ge k$$
 pour tout $x \in \mathcal{C}^{\complement}$.

> En récrivant les équations comme $\mathcal{L}(\theta_1; x) \leq (\geq) k\mathcal{L}(\theta_0; x)$ on peut l'interpréter comme qu'il doit être plus vraisemblable que $\theta = \theta_0(\theta_1)$ que $\theta_1(\theta_0)$ lorsque $x \in \mathcal{C}^{\complement}$ et que l'on rejette (accepte) H_0 .

3.
$$\alpha = \Pr \{(X_1, \ldots, X_n) \in \mathcal{C}; \theta_1\} = \alpha(\delta^*)$$

Alors C est la région critique optimale de taille α .

Test non biaisé

Soit les mêmes hypothèses que dans la définition du théorème de Neymann-Pearson.

Un test δ est non biaisé si sa puissance est toujours d'au moins α ; c'est-à-dire, $\Pr\{(X_1,\ldots,X_n)\in\mathcal{C};\theta\}\geq\alpha$.

Le meilleur test obtenu par le théorème de Neymann-Pearson est non biaisé.

Exemple avec une distribution normale

Soit:

- > L'échantillon aléatoire $X = (X_1, ..., X_n)$ d'une distribution normale $\mathcal{N}(\mu = \theta, \sigma^2 = 0)$.
 - Alors, $S = \{x : x \in \mathbb{R}\}.$
- > Les hypothèses :

$$H_0: \theta = 0$$

$$H_1:\theta=1$$

On a:

$$\frac{\mathcal{L}(\theta_0; \mathbf{x})}{\mathcal{L}(\theta_1; \mathbf{x})} = \frac{\exp\left\{-\sum_{i=1}^n x_i^2 / 2\right\} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n}}{\exp\left\{-\sum_{i=1}^n (x_i - 1)^2 / 2\right\} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n}} = \exp\left\{-\sum_{i=1}^n x_i + \frac{n}{2}\right\}$$

Alors, la région critique $\mathcal C$ optimale est composée des points (x_1,x_2,\ldots,x_n) tel que :

$$e^{-\sum_{i=1}^{n} x_i + \frac{n}{2}} \le k \quad \Rightarrow \quad -\sum_{i=1}^{n} x_i + \frac{n}{2} \le \ln(k) \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} x_i \ge \frac{n}{2} - \ln(k)$$
$$\therefore \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \ge \underbrace{\frac{1}{2} - \frac{\ln(k)}{n}}_{n}$$

Alors, la région critique optimale $C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \ge c \right\}$ où c est une constante choisie telle que la taille de C est α .

Par exemple, puisque $\bar{X} \stackrel{H_0}{\sim} \mathcal{N}(0,1/n)$ on peut trouver c avec $\Pr\{\bar{X} \geq c; \theta = \theta_0\} = \alpha$.

Puis, on peut trouver la puissance du test quand H_1 est vraie avec $\Pr\{\bar{X} \geq c; \theta = \theta_1\}.$

Note sur les hypothèses Les hypothèses doivent entièrement spécifier la distribution. Si les hypothèses sont sur les paramètres, elles doivent être des hypothèses simples, mais elles peuvent être sur autre chose.

Par exemple, si on teste $H_0: f_X(x) = g(x)$ v.s. $H_1: f_X(x) = h(x)$ alors la vraisemblance sera un ratio de deux distributions différentes.

Cas d'hypothèses composées

Cette section n'est pas suffisamment bien expliquée pour que je la considère complète.

Exemple avec une distribution normale

Soit:

- > Un échantillon aléatoire $X = (X_1, X_2, ..., X_n)$ tiré d'une distribution normale $\mathcal{N}(0, \theta)$;
- > Les hypothèses :

 $H_0: \theta = 1$

 $H_1: \theta > 1$

Alors, on trouve le ratio:

$$\frac{\mathcal{L}(\theta_0 = 1; \mathbf{x})}{\mathcal{L}(\theta_1; \mathbf{x})} = \frac{\frac{1}{(1)^n (\sqrt{2\pi})^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{2(1)^2}}}{\frac{1}{\theta_1^n (\sqrt{2\pi})^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{2\theta_1^2}}} = \theta_1^n e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{2} \left(1 - \frac{1}{\theta_1^2}\right)}$$

On voit que le ratio décroît alors que $\sum x_i^2$ augmente. Par conséquent, un test uniformément le plus puissance aura une région critique définie par $\sum x_i^2 > k$ avec un k choisi selon le seuil de signifiance.

L'idée est donc de poser un θ_1 fixe pour évaluer la forme du ratio de la vraisemblance. Selon la croissance ou décroissance de la fonction, ainsi que l'hypothèse, on peut établir une région pour laquelle une augmentation du θ_1 maintient la relation.

La région uniformément la plus puissante n'existe pas toujours, mais dans le cas qu'elle existe le théorème de Neymann-Pearson permet de la trouver.

Test du khi carré

Test d'adéquation (« goodness-of-fit test »)

Soit n répétitions (indépendantes) d'une expérience aléatoire.

On pose:

- \rightarrow L'espace d'échantillon des expériences \mathcal{A} qui représente l'union de k différents ensembles (disjoints) $\mathcal{A} = \{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k\}$;
- \rightarrow On pose que pour $i=1,2,\ldots,k, \Pr(A_i)=p_i$ où $p_k=1-p_1-\ldots-p_{k-1}$ et $O_k = n - O_1 - \ldots - O_{k-1}$:
 - $-p_i$ représente donc la probabilité que le résultat de l'expérience aléatoire fasse partie de l'ensemble A_i ;
 - O_i représente le nombre d'observations (la fréquence) pour lesquelles le résultat de l'expérience aléatoire fait partie de l'ensemble A_i .
- \rightarrow On pose que la distribution conjointe de O_1, O_2, \dots, O_{k-1} $MultiNom(n, p_1, ..., p_{k-1}).$

Soit le test d'hypothèse avec les nombres spécifiés $p_{1,0}, p_{2,0}, p_{k-1,0}$:

$$H_0: p_1 = p_{1,0}, p_2 = p_{2,0}, \dots, p_{k-1} = p_{k-1,0}$$

où $p_k = p_{k,0} = 1 - p_{1,0} - \dots - p_{k-1,0}$.

Alors, sous l'hypothèse nulle : $Q = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - np_{i,0})^2}{np_{i,0}} \approx \chi^2_{(k-1)}$

- \rightarrow Il y a seulement k-1 degrés de liberté, car on estime seulement k-1 paramètres.
- Le nombre n total d'observations est fixe et on déduit n_k par la somme;
- Si on avait à

Tableau de contingence

Dans le cas de données à deux dimensions, alias un tableau de contingence, on définit:

 E_{ii} L'espérance du nombre d'observations dans la cellule i, j;

 O_{ii} Le nombre observé d'observations dans la cellule i, j.

- > On pose qu'il y a c colonnes au tableau pour r rangées (les rangées sont les différents ensembles):
- \rightarrow On peut donc tester si la distribution de la fréquence est identique pour les ccolonnes avec $Q = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{c} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \approx \chi^2_{(r-1)\cdot(c-1)} \; ;$
- > Cette formule est beaucoup plus intuitive visuellement que par formule; pour la comprendre, faites un exemple.

Test du rapport de vraisemblance

Cette section n'est pas suffisamment bien expliquée pour que je la considère complète.

En fonction des observations, calculer:

- 1. Le maximum de vraisemblance sous l'hypothèse nulle;
- 2. Le maximum de vraisemblance sous l'hypothèse alternative

La région critique correspond à la région pour laquelle le ratio des vraisemblances est en dessous d'une constante k.

> Si les deux hypothèses sont simples, ceci équivaut à utiliser le théorème de Neymann-Pearson.

Cependant, il peut s'avérer difficile d'isoler une distribution dans le ratio. Pour des grands échantillons, on peut plutôt utiliser la distribution asymptotique.

Soit une hypothèse nulle qui spécifie k paramètre et une hypothèse alternative qui en spécifie seulement l (l < k). Alors, la statistique du rapport de vraisemblance

$$Q = -2\left(\ln(\theta_0) - \ln(\theta_1)\right) \sim \chi_{k-1}^2.$$

Cette statistique est vue dans les modèles linéaires généralisés aussi.

Statistiques exhaustives

Cette section n'est pas suffisamment bien expliquée pour que je la considère complète.

Statistique exhaustive

Soit l'échantillon aléatoire (X_1, \ldots, X_n) d'une distribution avec paramètre θ inconnu.

Alors, la statistique T_n est "exhaustive pour θ " si la distribution conditionnelle $(X_1, \ldots, X_n | T_n)$ ne dépend pas de θ .

Exemple Bernoulli

Soit l'échantillon aléatoire d'une distribution Bernouilli de paramètre p.

Alors $T_n = \sum_{i=1}^n X_i$ est exhaustive pour p, car :

$$Pr(X_1 = x_1, ..., X_n = x_n | T_n = x_1 + ... + x_n)$$

$$= p^{x_1 + ... + x_n} (1 - p)^{n - (x_1 + ... + x_n)}$$

$$= p^t (1 - p)^{n - t}$$

Dépends seulement de l'échantillon par la valeur t de la statistique T_n .

▼ Théorème de factorisation de Fisher-Neymann

Soit l'échantillon aléatoire (X_1, \ldots, X_n) d'une distribution avec paramètre θ inconnu.

Alors, la statistique T_n est "**exhaustive pour** θ " si pour tout $x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, ..., n$,

$$f(x_1;\theta) \times \ldots \times f(x_n;\theta) = g(t;\theta) \times h(x_1,\ldots,x_n)$$
où:

 $> g(t;\theta)$ dépend de (x_1,\ldots,x_n) seulement par T_n ;

 $\rightarrow h(x_1,\ldots,x_n)$ ne **dépend pas** de θ .

Pour **plusieurs paramètres**, on généralise avec le vecteur de paramètres inconnus $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$.

Alors, les statistiques T_n^1, \ldots, T_n^k sont **conjointement exhaustives pour** θ si pour tout $x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \ldots, n$,

$$f(x_1;\theta) \times \ldots \times f(x_n;\theta) = g(t_1,\ldots,t_k;\theta) \times h(x_1,\ldots,x_n)$$

où:

 $\succ g(t^1,\dots,t^k;\theta)$ dépend de (x_1,\dots,x_n) seulement par $T^1_n,\dots,T^k_n\,;$

 $\rightarrow h(x_1,\ldots,x_n)$ ne **dépend pas** de θ .

Le théorème de factorisation permet d'identifier des statistiques exhaustives. Cependant, il peut y avoir plusieurs statistiques exhaustives! Certaines offrent une plus grande réduction des données; par exemple, \bar{X}_n réduit les données plus que $(X_{(1)}, \ldots, X_{(n)})$.

On cherche donc la statistique exhaustive qui offre la **réduction maximale** tout en retenant toute l'information sur le paramètre visé.

Statistique exhaustive minimale

Une statistique exhaustive $T_n = T(X_1, ..., X_n)$ est "**minimale**" si pour toute autre statistique exhaustive $U_n = U(X_1, ..., X_n)$, il existe une fonction g telle que $T = g\{U(X_1, ..., X_n)\}$.

✓ Critère de Lehmann-Scheffé

Soit l'échantillon aléatoire (X_1, \ldots, X_n) d'une distribution avec paramètre θ inconnu.

Alors, la statistique T_n est "exhaustive *minimale* pour θ " si pour tout $x_i, y_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, ..., n$,

$$\frac{f(x_1;\theta) \times \ldots \times f(x_n;\theta)}{f(y_1;\theta) \times \ldots \times f(y_n;\theta)}$$

ne **dépend pas** de θ ssi $T(x_1, \ldots, x_n) = T(y_1, \ldots, y_n)$

Exemple Bernoulli

Soit l'échantillon aléatoire d'une distribution Bernouilli de paramètre p.

$$\frac{f(x_1;\theta) \times \ldots \times f(x_n;\theta)}{f(y_1;\theta) \times \ldots \times f(y_n;\theta)} = \left(\frac{p}{1-p}\right)^{(x_1+\cdots+x_n)-(y_1+\cdots+y_n)}$$

Le ratio est seulement indépendant de p si $\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} y_i$ et donc $T_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ est **exhaustive minimale** pour p.

Théorème de Rao-Blackwell

Soit l'estimateur $\hat{\theta}_n$ sans biais pour θ avec $\operatorname{Var}(\hat{\theta}_n) < \infty$. Si la statistique T_n est exhaustive pour θ , la statistique $\theta_n^* = \mathbb{E}[\hat{\theta}_n | T_n]$ est un estimateur sans biais de θ avec $\operatorname{Var}(\hat{\theta}_n) \leq \operatorname{Var}(\hat{\theta}_n)$

Famille exponentielle

Une loi de probabilité fait partie de la famille exponentielle linéaire si :

1. Sa fonction de densité (ou de masse) de probabilité peut être exprimée comme :

Densité de la famille exponentielle

$$f(y; \theta, \phi) = \exp\left(\frac{y\theta - b(\theta)}{a(\phi)} + c(y; \phi)\right)$$

οù

- θ paramètre canonique
- ϕ paramètre de dispersion
- 2. La fonction c ne dépend pas du paramètre θ .
- 3. Le support de Y ne dépend pas de θ puisqu'il ne peut pas varier.

Statistiques d'ordre

Soit un échantillon aléatoire de taille n. Nous définissons la $k^{\mathbf{e}}$ statistique d'ordre $X_{(k)}$ comme étant la k^{e} plus petite valeur d'un échantillon.

- \rightarrow Les crochets sont utilisés pour distinguer la $k^{\rm e}$ statistique d'ordre $X_{(k)}$ de la $k^{\rm e}$ observation X_k .
- \rightarrow La k^{e} statistique d'ordre correspond au $\frac{k^{e}}{n+1}$ quantile.

Nous sommes habituellement intéressés au minimum $X_{(1)}$ et le maximum $X_{(n)}$:

Minimum

$$X_{(1)} = \min(X_1, \dots, X_n)$$

$$f_{X_{(1)}}(x) = n f_X(x) (S_X(x))^{n-1}$$

$$S_{X_{(1)}}(x) = \prod_{i=1}^n \Pr(X_i > x)$$

$$S_{X_{(1)}}(x) = \prod_{i=1}^{n} \Pr(X_i > x)$$

Maximum

$$X_{(n)} = \max(X_1, ..., X_n)$$

$$f_{X_{(n)}}(x) = n f_X(x) (F_X(x))^{n-1}$$

$$F_{X_{(n)}}(x) = \prod_{i=1}^n \Pr(X_i \le x)$$

$$F_{X_{(n)}}(x) = \prod_{i=1}^{n} \Pr(X_i \le x)$$

De façon plus générale, on défini:

k^{e} statistique d'ordre

$$f_{X_{(k)}}(x) = \frac{n!}{(k-1)!1!(n-k)!} \underbrace{\left[F_X(x)\right]^{k-1}}_{\text{observations} < k} \underbrace{\left[S_X(x)\right]^{n-k}}_{\text{observations} > }$$

$$F_{X_{(k)}}(x) = \sum_{i=r}^{n} \binom{n}{i} \left[F_X(x)\right]^{j} [1 - F_X(x)]^{n-j}$$

Probabilité qu'au moins k des n

 \rightarrow On peut observer que $X_{(k)} \sim Beta(\alpha = k, \beta = n - k + 1)$

Nous pouvons également définir quelques autres statistiques d'intérêt :

\blacksquare L'étendue (« range »)

L'étendue (range) est la différence entre le minimum et le maximum d'un échantillon : $R = X_{(n)} - X_{(1)}$

> L'utilité de l'étendue est limitée puisqu'elle est très sensible aux données

extrêmes.

- > Par exemple, supposons que l'on a des données historiques sur la température pour le 1er septembre.
 - En moyenne, la température est de $16^{\circ}C$.
 - Il y a un cas extrême de $-60^{\circ}C$ en 1745.
 - L'étendue sera de $86^{\circ}C$ ce qui n'est pas très représentatif des données.
 - Donc, dans ce contexte, l'étendue n'est pas une mesure très utile.

≡ La mi-étendue (« *midrange* »)

La moyenne entre du minimum et du maximum d'un échantillon : $M = \frac{X_{(n)} + X_{(1)}}{2} \; .$

Pour comprendre ce que représente la mi-étendue, on la compare à la moyenne arithmétique.

- > La moyenne arithmétique considère les données observées et calcule leur moyenne.
- Il s'ensuit qu'elle ne considère pas les chiffres qui ne sont pas observés.
- > La mi-étendue considère **tous** les chiffres—observés ou non—entre la plus grande et la plus petite valeur d'un échantillon, puis en prend la moyenne.

\blacksquare L'écart interquartile (« interquartile range (IQR) »)

Écart entre le troisième quartile et le premier quartile : $IQR = Q_3 - Q_1$

- > L'IQR mesure la distribution du 50% des données qui sont situées au milieu de l'ensemble de données.
- \succ L'IQR est connu comme le « midspread ».

Exemple sur les statistiques d'ordre

Soit un échantillon de données météorologiques $\{-30^\circ, -24^\circ, -7^\circ, -23^\circ, +5^\circ\}$ (Celsius).

Je suppose que ce sont des températures du 4 février observées lors des dernières années.

 \rightarrow La moyenne arithmétique ($-22.25^{\circ}C$) m'intéresse, car je peux savoir, en moyenne, ce qu'est la température le 4 février.

> La mi-étendue $(-12.5^{\circ}C)$, tout comme l'étendue $(-35^{\circ}C)$, ne m'intéresse pas puisqu'elle ne prend pas en considération la vraisemblance des différentes températures.

Maintenant, je suppose que ces données sont des températures observées tout au long de l'hiver passé.

- > La moyenne arithmétique ne m'intéresse pas puisqu'elle est beaucoup trop biaisée par les températures de cette même journée.
- > Cependant, la mi-étendue et l'étendue me donnent maintenant une meilleure idée de la température de l'hiver.

L'important à retenir est que l'utilité des mesures dépend de la situation. Également, ceci est un exemple **très** simpliste et dans tous les cas on ne peut pas tirer de conclusions sur les températures de l'hiver à partir d'une seule journée.

Nous pouvons définir la médiane en termes de statistiques d'ordre :

= Médiane

$$Med = \begin{cases} X_{((n+1)/2)}, & \text{si n est impair} \\ \frac{X_{(n/2)} + X_{(n/2+1)}}{2}, & \text{si n est pair} \end{cases}$$

- > La moitié des données sont supérieures et inférieures à la médiane.
- > L'utilité de la médiane est qu'elle n'est pas aussi sensible aux données aberrantes que la moyenne.

Finalement, on définit la distribution conjointe du minimum et du maximum $\forall x < y$:

Distribution conjointe du maximum et du minimum

$$f_{X_{(1)},X_{(n)}}(x,y) = n(n-1)[F_X(y) - F_X(x)]^{n-2}f_X(x)f_X(y)$$

Graphiques

Le diagramme en boîte (« boxplot »)


Le diagramme du « sommaire à cinq chiffres ».

Sommaire à cinq chiffres

Les cinq statistiques suivantes :

- 1. Le minimum.
- 2. Le premier quartile Q_1 .
- 3. La médiane (deuxième quartile) Q_2 .
- 4. Le troisième quartile Q_3 .
- 5. Le maximum.

Visuellement:




- > La médiane est la ligne contenue dans la boîte.
 - La moitié des données sont au-dessus, et l'autre moitié en dessous, de la ligne.
- > La boîte est délimitée par le premier et le troisième quartile.
 - Il s'ensuit que la boîte contient la moitié des données.
 - De plus, 25% des données sont contenues entre la borne supérieure de la boîte et la médiane avec l'autre 25% qui est contenu entre la borne inférieure et la médiane.
- > Les « moustaches » de la boîte sont tracées à un pas h des quartiles où $h=1.5\cdot (Q_3-Q_1)$.


- Les points qui sont à l'extérieur de ces bornes sont les données potentiellement aberrantes.
- $-Q_3-Q_1$ correspond à l'écart interquartile.
- Plus l'écart est élevé, plus la boîte sera large et, par conséquent, plus les moustaches seront situées loin de la médiane.
- Le 1.5 est basé sur la règle du 68-95-99.7 avec moins de 1% des données à l'extérieur de la borne supérieure.

∨ Règle du 68-95-99.7

Pour une distribution normale, environ 68% des données sont en dedans d'un écart-type de la moyenne, 95% en dedans de 2 et 99.7% en dedans de 3.



En bref, le diagramme en boîte permet d'évaluer comment les données sont distri- Diagramme quantile-quantile (« Q-Q plot ») buées. Cette image de wikipedia résume bien :




En pratique, on pose souvent que les données suivent une distribution. Un diagramme quantile-quantile permet de comparer les quantiles théoriques de la distribution aux quantiles empiriques des données.


Dans un tel cas, on connaît la distribution, mais pas les paramètres.

- > Si les données sont normalement distribuées, on peut centrer et réduire pour obtenir la loi normale standard Z;
 - Ceci correspond à un diagramme quantile-quantile **normale**;
- > Autrement, le diagramme quantile-quantile est tracé en estimant les paramètres de la distribution avec l'échantillon de données.

Par exemple:



Le diagramme quantile-quantile évalue si la distribution empirique est semblable à la distribution théorique. On peut, entre autres, évaluer la queue de la distribution. Selon la distribution, les quantiles « normaux » varient. Ci-dessous est une image de ce site qui montre quantiles selon la distribution avec une droite pour la normale :



Construction d'estimateurs

Précédemment, nous avons décrit les méthodes utilisées pour évaluer la **qualité** de l'estimateur. Cependant, comment obtenons-nous des estimateurs à évaluer?

Plusieurs méthodes existent pour établir des estimateurs, de plus plusieurs méthodes existent pour estimer des paramètres. La méthode vue dans le cadre du cours de statistique est la **méthode fréquentiste**, le cours de mathématiques IARD 1 (ACT-2005) présente l'estimation bayésienne.

Avant de le faire, nous présentons quelques concepts :

```
Terminologie \mu'_k(\hat{\theta}) \ k^{\text{e}} \text{ moment centr\'e à 0, } \ \mu'_k = \mathrm{E}[X^k] \ ; \pi_g(\theta) \ 100g^{\text{e}} \text{ centile, } \ \pi_g(\theta) = F_{\theta}^{-1}(g) \ , \ g \in [0,1] \ ; F_e(x) \text{ Fonction de r\'epartition empirique;} \cong \text{Notation pour poser une \'egalit\'e.}
```

Les deux premiers estimateurs ci-dessous sont les plus faciles à obtenir, mais sont aussi les moins performants puisqu'ils n'utilisent que quelques traits des données au lieu de l'entièreté des données comme la troisième méthode.

Cette distinction devient particulièrement importante dans le cas d'une distribution avec une queue lourde à la droite (Pareto, Weibull, etc.) où il devient plus essentiel de connaître les valeurs extrêmes pour bien estimer le paramètre de forme (α pour une Pareto).

Un autre désavantage est que les deux premières méthodes nécessitent que les données proviennent toutes de la même distribution. Sinon, les moments et quantiles ne seraient pas clairs.

Finalement, sous les deux premières méthodes la décision de quels moments et centiles à utiliser est arbitraire.

Méthode des moments (MoM)

Estimation de θ par la méthode des moments

Pour ajuster une distribution de p paramètres, on pose égale les p premiers moments empiriques $\hat{\mu}'_k$ au p premiers moments de la distribution μ'_k . L'estimation de θ est alors toute solution des p équations :

$$\hat{\mu}'_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k \stackrel{\triangle}{=} E[X^k] = \mu'_k(\theta), \quad k = 1, 2, \dots, p$$

La raison pour cet estimateur est que la distribution empirique aura les mêmes p premiers moments centrés à 0 que la distribution paramétrique.

Méthode du «Percentile Matching »

Estimation de θ par la méthode du « Percentile Matching »

Pour ajuster une distribution de p paramètres, on pose égale p centiles $\hat{\pi}_g(\hat{\theta})$ de l'échantillon à ceux de la distribution $\pi_g(\theta)$.

L'estimation de θ est alors toute solution des p équations :

$$F_e(\hat{\pi}_{g_k}|\theta)=g_k, \quad k=1,2,\ldots,p$$

La raison pour cet estimateur est que le modèle produit aura p centiles qui vont « matcher » les données.

Il peut arriver que les centiles de distributions ne soient pas uniques, par exemple dans le cas de données discrètes lorsque le quantile recherché peut tomber entre 2 marches de la fonction empirique, ou mal-définis. Il est alors utile de définir une méthode d'interpolation des quantiles (bien qu'il n'en existe pas une d'officielle). Soit le « smoothed empirical estimate » d'un centile :

Smoothed empirical estimate

On utilise les statistiques d'ordre de l'échantillon $x_{(1)} \le x_{(2)} \le \cdots \le x_{(n)}$ pour l'**interpolation** suivant :

$$\hat{\pi}_g = (1-h)x_{(j)} + hx_{(j+1)}, \quad \text{où}$$

$$j = \lfloor (n+1)g \rfloor \quad \text{et} \quad h = (n+1)g - j$$

Méthode du maximum de vraisemblance

Nous cherchons à maximiser la probabilité d'observer les données. Ceci est fait par la vraisemblance $\mathcal{L}(\theta; \mathbf{x})$ ou, puisque le logarithme ne change pas le maximum, la log-vraisemblance $\ell(\theta; \mathbf{x})$ où :

Maximum de vraisemblance

$$\mathcal{L}(\theta; \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta)$$
 et $\ell(\theta; \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} \ln f(x_i; \theta)$

et l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ est celui qui maximise la fonction de vraisemblance.

De façon formelle, on dit que $\hat{\theta}^{\mathrm{EMV}} = \max_{\theta} \{\mathcal{L}(\theta; x)\} = \max_{\theta} \{\ln \mathcal{L}(\theta; x)\}.$

Raccourcis

Si la fonction de vraisemblance est de la forme :

$$ightarrow \left| \mathcal{L}(\gamma) = \gamma^{-a} \mathrm{e}^{-b/\gamma} \right| \, \mathrm{alors} \, \left| \hat{\gamma}^{\mathrm{MLE}} = \frac{b}{a} \right|$$

$$\gt$$
 $\mathcal{L}(\lambda) = \lambda^a \mathrm{e}^{-\lambda b}$ alors $\hat{\lambda}^{\mathrm{MLE}} = \frac{a}{b}$.

$$ightarrow \left| \mathcal{L}(\theta) = heta^a (1- heta)^b \right| ext{then } \hat{ heta}^{ ext{MLE}} = rac{a}{a+b} \; .$$

Propriétés

Propriété d'invariance

Soit une fonction bijective $g(\cdot)$ et l'estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) $\hat{\theta}^{\rm EMV}$ de θ .

Alors, selon la propriété d'invariance $g(\hat{\theta}^{\text{EMV}})$ est l'EMV de $g(\theta)$.

L'EMV satisfait cette propriété.

☐ Convergence en distribution de l'EMV

Théorème : $\hat{ heta}^{ ext{EMV}} pprox \mathcal{N}\left(0, rac{1}{I_n(heta)}
ight)$.

Sous certaines conditions de régularité, la distribution de $\sqrt{n} (\hat{\theta} - \theta)$ converge en distribution vers une distribution normale avec une moyenne nulle et une

variance égale à la borne de Cramér-Rao.

$$\sqrt{n}\left(\hat{\theta}-\theta\right)\overset{D}{
ightarrow}\mathcal{N}\left(0,rac{1}{I_{n}(heta)}
ight)$$

Ce qui implique :

- 1. $\hat{\theta}$ est asymptotiquement sans biais.
- 2. $\hat{\theta}$ est « consistent ».
- 3. $\hat{\theta}$ est approximativement normalement distribué avec moyenne θ et variance $1/I_n(\theta)$ pour des grands échantillons.
- 4. $\hat{\theta}$ est asymptotiquement efficace puisque sa variance tend vers la borne Cramér-Rao.

Souvent les professeurs ne montrent pas ces conditions puisqu'elles sont compliquées. Alors, ne vous en faites pas si vous ne les comprenez pas complètement.

≡ Conditions de régularité

- **R0** Les variables X_i sont iid avec densité $f(x_i; \theta)$ pour i = 1, 2, ...
- **R1** Les fonctions de densité ont toutes le même support pour tout θ .
- \succ C'est-à-dire que le support de X_i ne dépend pas de $\theta\,;$
- > C'est une condition restrictive que certains modèles ne respectent pas.
- **R2** La "vraie valeur" de θ est contenue dans l'ensemble des valeurs possibles Θ .
- **R3** La fonction de densité $f(x;\theta)$ est différentiable deux fois comme fonction de θ .
- > Cette condition additionnelle assure que les deux premières dérivées existent pour la borne de Cramér-Rao.
- **R4** L'intégrale $\int f(x;\theta)dx$ est différentiable deux fois sous l'intégrale comme fonction de θ .
- > Cette condition additionnelle assure que l'on peut utiliser la deuxième dérivée pour la borne de Cramér-Rao.

Cas multivarié

On généralise du cas où θ est un scalaire (un seul paramètre) au cas multivarié avec k paramètres et le vecteur $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \cdots, \theta_k)^{\top}$.

Notation

En notation matricielle, on multiple le vecteur $\boldsymbol{\theta}$ par la transposée $\boldsymbol{\theta}^{\top}$ au lieu de mettre $\boldsymbol{\theta}$ au carré.

> La matrice d'information Fisher <u>d'une observation</u> est donc une matrice $k \times k$:

$$I(\theta) = \mathrm{E}\left[\frac{\partial \ln f(X; \theta)}{\partial \theta} \frac{\partial \ln f(X; \theta)}{\partial \theta^{\top}}\right] \stackrel{iid}{=} \mathrm{E}\left[\frac{\partial^2 \ln f(X; \theta)}{\partial \theta \theta^{\top}}\right]$$

 \rightarrow Pour la matrice d'information Fisher d'un échantillon aléatoire de n observation, on utilise la relation $I_n(\theta) = nI(\theta)$.

 $I_n^{-1}(\theta)$ Inverse de la matrice d'information Fisher $I_n(\theta)$.

Soit $\tilde{\theta}$ un estimateur sans bais de θ .

Notation

 $\mathbf{Var}(\tilde{\boldsymbol{\theta}})$ Matrice de variance de $\tilde{\boldsymbol{\theta}}$.

 \rightarrow Le $(i,j)^{e}$ élément est donc $Cov(\tilde{\theta}_{i},\tilde{\theta}_{j})$.

La version multivariée de l'inégalité Cramér-Rao stipule que $Var(\tilde{\theta}) - I_n^{-1}(\theta)$ est

une matrice « nonnegative definite ».

> Puisque les éléments de la diagonale doivent être positifs, la borne inférieure de $\operatorname{Var}(\tilde{\boldsymbol{\theta}}_i)$ est le i^{e} élément de la diagonale de $I_n^{-1}(\boldsymbol{\theta})$.

En bref, on trouve que sous certaines conditions de régularité, la distribution de $\sqrt{n} \left(\hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta} \right)$ converge en distribution vers une distribution normale multivariée (de k dimensions) avec une moyenne nulle et une variance égale à la borne de Cramér-Rao.

$$\sqrt{n} \left(\hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta} \right) \stackrel{D}{\to} \mathcal{N}_k \left(0, \boldsymbol{I}_n^{-1}(\boldsymbol{\theta}) \right)$$

Deuxième partie

Modèles linéaires en actuariat

Apprentissage statistique

Apprentissage statistique

L'apprentissage statistique est l'utilisation de statistiques pour estimer les relations entre des variables « explicatives » et un résultat (une variable « $r\acute{e}ponse$ »).

≡ Variable réponse

Variable pour laquelle nous voulons effectuer des prévisions.

■ Variables explicatives

Variables utilisées pour les prévisions de la variable réponse.

Les modèles d'apprentissage statistique ont deux utilités principales :

- 1 Faire des **prévisions** de la valeur de la variable réponse pour des valeurs spécifiques des variables réponse.
- 2 Faire de l'**inférence** afin de comprendre quelles variables explicatives sont liées à la variable réponse, et à quel degré.

Il y a une multitude de modèles d'apprentissage statistique différents. Entre autres, ces modèles varient en **flexibilité**; c'est-à-dire, certains modèles s'*ajustent* mieux aux données.

Par exemple, une régression linéaire correspond à une ligne droite (peu flexible). En réalité, il est peu probable que les données soient situées sur une droite. En contraste, une « *spline* » va passer à travers tous les points (très flexible).

✓ Flexibilité du modèle

Il y a un compromis à faire entre la flexibilité d'un modèle et sa facilité d'interprétation :

- \succ Les modèles moins flexibles sont plus facilement interprétables au coût de moins bonnes prévisions.
 - $-\,$ Ils sont généralement mieux pour l'inférence.

- > Les modèles *plus flexibles* sont plus difficilement interprétables, mais ont l'avantage d'offrir de meilleures prévisions.
- Ils sont généralement mieux pour faire des prévisions.

En revanche, si un modèle est sur ajust'e aux données alors il pourrait être biaisé envers les données avec lesquelles il est entraîné et offrir des mauvaises prévisions pour des **nouvelles** données.

De façon générale, on sépare l'apprentissage statistique en deux types : apprentissage supervisé comporte une variable réponse. apprentissage non supervisé ne comporte pas de variable réponse.

Types de variables explicatives

Les variables explicatives prennent plusieurs formes :

☐ Variable continue

Définie sur les nombres réels.

Par exemple:

- > Les montants de perte d'accidents d'automobile.
- > Le temps avant qu'une réclamation d'assurance soit réglée.

■ Variable catégorielle

Définie sur un petit nombre de valeurs catégorielles. On dit aussi variable qualitative.

Par exemple:

- > Une variable binaire (seulement deux niveaux).
 - P. ex., une variable "Maison a un système d'alarme" prenant comme valeur "oui" ou "non".
 - P. ex., le sexe d'un individu prenant comme valeur "homme" ou "femme".
- > Une variable avec plusieurs niveaux.
 - P. ex., la marque d'une voiture assurée prenant comme valeurs "Toyota", "Honda", etc.

Une variable catégorielle peut être :



Nominale

Il n'y a pas d'ordre aux catégories.

Par exemple :

> Le programme d'étude d'un étudiant prenant comme valeur "actuariat", "comptabilité", etc.



Ordinale

Il y a une d'ordre aux catégories.

 ${\bf Par\ exemple:}$

> La sévérité d'un incendie allant de 1 à 5.

Définie sur les entiers positifs.

Par exemple:

> Le nombre de réclamations.

Régression

Famille exponentielle

La famille exponentielle est de la forme : $f(y;\theta) = e^{a(y)b(\theta) + c(\theta) + d(y)}$

- \rightarrow Le GLM requiert que a(y) = y que l'on nomme la forme canonique.
- \rightarrow Sous cette paramétrisation, $b(\theta)$ est le paramètre canonique (« natural parame $ter \gg).$

Sous cette forme, on déduit que
$$E[a(Y)] = -\frac{c'(\theta)}{b'(\theta)}$$
 et $Var(a(Y)) = \frac{b''(\theta)c'(\theta)-c''(\theta)b'(\theta)}{(b'(\theta))^3}$

$$\operatorname{var}(a(Y)) = \frac{b''(\theta)c'(\theta) - c''(\theta)b'(\theta)}{(b'(\theta))^3}$$

Classification

On fait de la **classification** lorsque nous voulons prédire une variable *catégorielle*. Il y a 3 trois types de variables : nominal, ordinal et binomial. Les deux premières ont été définies plus haut, une variable réponse binomiale est simplement une variable ayant 2 catégories.

Binomial


Soit $\eta = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_j$. Soit la probabilité π que Y = 1.

- \Rightarrow Alors, on veut une fonction de lien $g(\pi) = \eta$ tel que $g(\pi) : [0,1] \mapsto (-\infty, \infty)$.
- \rightarrow Par exemple, la fonction quantile d'une distribution X.
 - On appelle cette distribution la « tolerance distribution ».
 - Ce nom provient de l'utilité du modèle pour évaluer si un médicament a un effet ou pas.
 - Une valeur élevée de η est plus probable de mener à une probabilité π élevée de oui (Y = 1).

Les 3 fonctions de lien les plus utilisées pour $\pi \in [0,1]$ sont les suivantes :

Nom	$\mu = \pi$	η
Logit	$\frac{\mathrm{e}^{\eta}}{1+\mathrm{e}^{\eta}}$	$\ln\left(\frac{\pi}{1-\pi}\right)$
Probit	$\Phi(\eta)$	$\Phi^{-1}(\mu)$
Log-log complémentaire	$1 - e^{-e^{\eta}}$	$\ln\left(-\ln(1-\pi)\right)$

Comme on peut observer ci-dessous, les fonctions de lien logit et probit sont symétriques à 0, mais pas la fonction de lien log-log complémentaire.



Note La cote, alias le « odds ratio », est $\frac{\pi}{1-\pi}$

Nominal

On suppose qu'il y a J catégories possibles pour la variable réponse. Pour modéliser avec la régression logistique, on :

- 1 Choisit une catégorie comme catégorie de base 1.
- 2 Pour chacune des autres catégories, on trouve les cotes relatives (« relative odds »).

Le logarithme de la cote de la catégorie j relatif à la catégorie de base 1 est :

$$\ln \frac{\pi_j}{\pi_1} = \sum_{i=1}^p \beta_{ij} X_i = \eta_j, \quad j = 2, 3, \dots, J$$

Alors, $\pi_i = \pi_1 e^{\eta_i}$ et puisque les probabilités doivent sommer jusqu'à 1 :

$$\pi_1 = rac{1}{1 + \sum_{k=2}^{J} \mathrm{e}^{\eta_k}} \ \pi_j = rac{\mathrm{e}^{\eta_j}}{1 + \sum_{k=2}^{J} \mathrm{e}^{\eta_k}}, \quad j = 2, 3, \dots, J$$

Ordinal

Modèle logit cumulatif

$$\frac{\Pr(Y \le j)}{1 - \Pr(Y \le j)} = \frac{\sum_{k=1}^{j} \pi_k}{1 - \sum_{k=1}^{j} \pi_k} = \frac{\pi_1 + \ldots + \pi_j}{\pi_{j+1} + \ldots + \pi_J}$$

Alors, avec les paramètres β qui varient par catégorie j, :

$$\ln\left(\frac{\pi_1+\ldots+\pi_j}{\pi_{j+1}+\ldots+\pi_J}\right)=\sum_{i=1}^p\beta_{ij}X_i$$

Modèle de cotes proportionnelles

Excepté l'intercepte, les paramètres β ne varient pas par catégorie j :

$$\ln\left(\frac{\pi_1+\ldots+\pi_j}{\pi_{j+1}+\ldots+\pi_J}\right)=\beta_{1j}+\sum_{i=2}^p\beta_iX_i$$

Modèle logit de catégories adjacentes

$$\ln\left(\frac{\pi_j}{\pi_{j+1}}\right) = \sum_{i=1}^p \beta_{ij} X_i$$

Modèle logit de ratio continu

$$\frac{\Pr(Y=j)}{\Pr(Y>j)} = \frac{\pi_j}{\pi_{j+1} + \ldots + \pi_J}$$

Autres

Régression	Type de variable réponse
Linéaire	Continue
Logistique	Binaire
Poisson	Données de comptage
Analyse de survie	Temps jusqu'à un événement

- > Logistique prédit la probabilité qu'un événement ait lieu.
- > Poisson prédit le « rate » auquel des événements aient lieu.
 - C'est-à-dire, le nombre de fois, ou la fréquence, d'un événement sur une période de temps.
 - Donc, le temps est fixé et on observe le nombre d'événements.
 - On ne peut pas simplement appliquer un modèle linéaire, car les données suivent une distribution de Poisson, pas une distribution normale!
 - -Également, nous pouvons modéliser un « offset » pour considérer le temps d'exposition.
- > Avec l'analyse de survie, on prédit le temps avant qu'un événement ait lieu.
 - Donc, le nombre d'événements est fixé à un et on veut savoir le temps avant qu'il ait lieu.

Poisson

Il y a plusieurs façons de modéliser un même modèle de Poisson :

- 1. Modéliser le taux comme une fonction log-linéaire des $x : \lambda = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p}$.
 - > Ceci puisque le taux λ a une forme exponentielle.
- 2. Modéliser le log du taux comme une fonction linéaire des x: $\ln(\lambda) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_p x_p$.
 - > Ceci permet de traiter le taux λ avec un modèle linéaire.
 - > L'avantage est la simplicité d'une ligne pour résumer le modèle.
 - \succ Mathématiquement, les deux premières équations sont équivalentes.
- 3. Modéliser le log de la fréquence espérée avec un « offset » : $\ln(E[Y]) = \ln(E[\lambda t]) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p + \ln(t)$.
 - > La deuxième équation représente ce que l'on fait en théorie alors que la troisième représente ce que l'on fait en pratique.

Hypothèses du modèle :

- 1. Les observations sont indépendantes.
 - > Si, par exemple, avoir une récidive augmente la probabilité d'une deuxième récidive, alors le modèle n'est pas adéquat.

- 2. Le taux auquel les événements se produisent est une fonction log-linéaire de x.
 - \gt C'est-à-dire, le log du taux est une fonction linéaire des x.
- 3. Les variations dans les x's ont des effets multiplicatifs sur le nombre d'événements.
 - > Par exemple, si on modélise la fréquence d'accidents auto alors on s'attend à ce que le nombre d'accidents sur deux ans soit le double du nombre d'accidents sur un an.
- 4. La moyenne = variance = λ .
- 5. Le taux est constant.
 - > Donc, on pose que le taux est fixe.
 - > Par exemple, la probabilité d'une récidive pourrait diminuer dans le temps.

Le modèle à deux gros problèmes, $\underline{\text{premièrement}}$ la $\underline{\text{sur-dispersion}}$ où la variance est supérieure à la moyenne.

- > C'est-à-dire que les données sont plus variables que ce qui est attendu.
- > Contrairement à la régression linéaire où l'estimation de la moyenne et du SSE est séparée, l'estimation est la même pour le modèle de Poisson.
- > Il y a des multiples raisons pour lesquelles ceci peut arriver :
 - 1. Nous n'avons pas inclus toutes les variables explicatives significatives dans le modèle.
 - 2. La forme fonctionnelle du modèle est inadéquate (p. ex., les données ne sont pas log linéaires).
 - 3. Une variable est supposée d'être homogène alors qu'elle ne l'est pas.
 - P. ex., modéliser un groupe de fumeurs alors qu'il y a des sous-groupes (ceux qui font de l'exercice vs ceux qui n'en font pas, etc.)
 - 4. etc.

On peut calculer la **dispersion** et on désire qu'elle soit environ de 1.

Pour résoudre la sur-dispersion, on peut :

- 1. On peut pondérer l'erreur type de tous les coefficients par la racine du paramètre de dispersion.
 - > Ceci ne change pas les prévisions, plutôt ça augmente l'erreur type pour tenir compte du fait que la variabilité des données observées est plus élevée que ce à quoi on s'attendait.
- 2. On peut ajuster un modèle avec une distribution binomiale négative.
 - \succ Ceci permet d'estimer la fréquence et la variance séparément.
 - \succ La variance sera plus grande, mais proportionnelle à la moyenne.

Deuxièmement, Données gonflées à zéro.

- > L'idée est de modéliser la probabilité que l'événement ait lieu ou pas séparément de la fréquence.
- > On peut modéliser la probabilité avec un modèle logistique est la fréquence avec un modèle de Poisson.

Matrice de confusion:



Erreur

Écart-type Mesure la variation entre les observations d'un ensemble de données.

> « standard deviation ».



Erreur type Mesure la variation <u>entre les moyennes</u> de **plusieurs** ensembles de données.

> « standard error ».



Troisième partie

Mathématiques actuarielles IARD I

Probabilité

Fonctions de variables aléatoires

Fonction de masse de probabilité (PMF)

Pour une variable aléatoire discrète X, on dénote sa fonction de masse de probabilité $p_X(x) = \Pr(X = x)$ tel que $0 \le p(x) \le 1$ et $\sum_x p(x) = 1$.

Fonction de densité (PDF)

Pour une variable aléatoire continue X, on dénote sa fonction de densité par $f_X(x)$ où $f_X(x) \neq \Pr(X = x)$.

> La fonction de densité est évaluée sur des **intervalles de valeurs** pour obtenir la probabilité d'y être contenu, mais ne **représente pas une probabilité explicitement**.

De façon semblable à la PMF, $f(x) \ge 0$ et $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

- > La différence entre les conditions pour la PMF et la PDF est que la fonction de densité peut être supérieure à 1.
- > Puisqu'elle ne représente pas une probabilité, elle ne doit pas être inférieure (ou égale) à 1.

Fonction de répartition (CDF)

La fonction de répartition $F_X(x) = \Pr(X \le x)$ tel que $F(-\infty) = 0$ et $F(\infty) = 1$.

 \succ En anglais, « cumulative distribution function ».

Fonction de survie

La fonction de survie $S_X(x) = \Pr(X > x)$ tel que $S(-\infty) = 1$ et $S(\infty) = 0$.

Fonction de hasard

La fonction de hasard $h_X(x) = \frac{f(x)}{S(x)}$ tel que $h(x) \ge 0$.

- > Par la définition, on déduit qu'elle est seulement applicable pour les v.a. continues.
- \gt La fonction de hasard mesure la **vraisemblance** que la v.a. soit égale à x en gonflant la PDF moins il devient vraisemblable qu'elle soit supérieure à x.
- > En anglais, « hazard function », « hazard rate », « failure rate function » ou même « force of mortality ».

Fonction de hasard cumulative

La fonction de hasard $H_X(x) = \int_{-\infty}^x h(t)dt$

> Également, $H(x) = -\ln S(x)$ ou $S(x) = e^{-H(x)}$.

Moments

Pour une v.a. X non-négative et une fonction g(x) tel que g(0) = 0 $\mathbb{E}[g(X)] = \int_0^\infty g'(x)S(x)dx$.

Fonction génératrice des moments (MGF)

La fonction génératrice des moments (MGF) d'une v.a. X est dénoté comme $M_X(t) = \mathrm{E}[\mathrm{e}^{tX}]$.

Entre autres, la MGF sert à générer les moments d'une distribution avec $\mathrm{E}[X^n] = \tfrac{\partial^n M_X(t)}{\partial t^n}\big|_{t=0} \,.$

Fonction génératrice des probabilités (PGF)

La fonction génératrice des moments (PGF) d'une v.a. X est dénoté comme $P_X(t) = \mathrm{E}[t^X]$.

Entre autres, la PGF sert à :

- 1. Générer les masses de probabilité d'une distribution discrète avec $p(n) = \frac{1}{n!} \frac{\partial^n P_X(t)}{\partial t^n} \Big|_{t=0} \,.$
- 2. Générer des espérances avec $\left|\frac{\partial^n P_X(t)}{\partial t^n}\right|_{t=1} = \mathbb{E}\left[X(X-1)\dots(X-(n-1))\right]$.

Centiles, mode et statistiques

Centile

Contexte

Les centiles aident à quantifier la vraisemblance de pertes extrêmes. Bien que les actuaires se servent des centiles pour évaluer la fréquence des pertes extrêmes, ils ne sont pas utiles pour évaluer la sévérité de ces pertes.

Le $100q^{\rm e}$ centile d'une v.a. X est la valeur π_q tel que $\Pr(X < \pi_q) \le q$ et $\Pr(X \le \pi_q) \ge q$.

> Dans le cas continu, $F_X(\pi_q) = q$ et $\pi_q = F_X^{-1}(q)$.

« Conditionnal Tail Expectation (CTE) »

Contexte

La CTE sert à évaluer la *sévérité* des pertes extrêmes.

Par exemple, si la $CTE_{0.95}(X) = 5000$ cela veut dire que la moyenne des pertes dans le top 5% est de 5 000\$.

$$\begin{aligned} CTE_q(X) &= \mathrm{E}[X|X > \pi_q] \\ &= \pi_q + \mathrm{E}[X - \pi_q|X > \pi_q] \\ &= \pi_q + \frac{\mathrm{E}[X] - \mathrm{E}[X \wedge \pi_q]}{1 - q} \end{aligned}$$

- \rightarrow On surnomme 1-q la « tolerance probability ».
- \succ La CTE est le cas continu de la « $\mathit{Tail-Value-at-Risk}$ (TVaR) ».

Mode

Contexte

Le mode est la réalisation qui a lieu le plus souvent.

Par exemple, en anglais la lettre E est la lettre la plus utilisée dans le dictionnaire. Elle représente donc le *mode* de la langue anglaise.

En termes mathématiques, le mode est le point qui maximise la PMF/PDF.

Dans le cas continu, si la distribution : on peut simplement dériver la PDF et trouver le point qui la rend égale à zéro.

- \Rightarrow est unimodal, c'est-à-dire qu'elle a une « bosse », alors mode = x tel que f'(x)=0 .
- > est strictement croissant ou décroissant, le mode sera une des deux extrémités.
 - Par exemple, la loi exponentielle est strictement décroissante et a toujours un mode à 0 peu importe les paramètres.


≡ Kurtosis

Kurtosis =
$$\frac{\mu_4}{\sigma^4} = \frac{\mu'_4 - 4\mu'_3\mu + 6\mu'_2\mu^2 - 3\mu^4}{\sigma^3}$$
.

Le kurtosis mesure l'aplatissement d'une distribution et peut aider à juger la vraisemblance qu'une distribution produise des valeurs extrêmes (ou



Le kurtosis de la distribution normale est de 3. On pose qu'il est plus vraisemblable pour une distribution dont le kurtosis supérieur à 3 de produire des valeurs extrêmes.



Distributions

✓ Loi Pareto

Contexte

La distribution Pareto est un mélange de deux distributions exponentielles originalement conçue pour étudier des distributions de revenus.

Notation	Paramètres	Domaine
$X \sim \text{Pareto}(\alpha, \theta)$	$\alpha, \theta > 0$	$x \ge 0$

$$f(x) = \frac{\alpha \theta^{\alpha}}{(x+\theta)^{\alpha+1}}$$

$$F(x) = 1 - \left(\frac{\theta}{x+\theta}\right)^{\alpha}$$

 \rightarrow Si $X \sim \text{Pareto}(\alpha, \theta)$ alors $Y = (X - d | X > d) \sim \text{Pareto}(\alpha, \theta + d)$

✓ Loi Beta

Notation	Paramètres	Domaine
$X \sim \text{Beta}(a, b, \theta)$	$a,b>0$ et $\theta\geq 0$	$x \in [0, \theta]$

$$f(x) = \frac{\theta}{B(a,b)} \left(\frac{x}{\theta}\right)^{a-1} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{b-1}$$

- $X \sim \text{Beta}(a = 1, b = 1, \theta) \sim \text{Unif}(0, \theta).$
- > Si $X \sim \text{Unif}(a,b)$ alors $(X|X>d) \sim \text{Unif}(d,b)$ et $(X-d|X>d) \sim \text{Unif}(0,b-d)$.

✓ Loi Gamma

Notation	Paramètres	Domaine
$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \theta)$	$\alpha, \theta > 0$	$x \ge 0$

$$f(x) = \frac{x^{\alpha - 1} e^{-x/\theta}}{\Gamma(\alpha)\theta^{\alpha}}$$

- \rightarrow On appelle θ la moyenne et $\lambda = \frac{1}{\theta}$ le paramètre de fréquence (« rate »).
- > Soit n v.a. indépendantes $X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \theta)$ alors $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Gamma}(\sum_{i=1}^n \alpha_i, \theta)$.
- > Soit n v.a. indépendantes $X_i \sim \operatorname{Exp}(\lambda_i)$ alors $Y = \min(X_1, \dots, X_n) \sim \operatorname{Exp}(\frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i)}$.
- \rightarrow Si $X \sim \text{Exp}(\theta)$ alors $(X d|X > d) \sim \text{Exp}(\theta)$

✓ Loi Erlang


Contexte

La loi Erlang est un cas spécial de la loi Gamma avec un paramètre de forme α entier. Elle est utile dans le contexte de **Processus de Poisson**, car nous pouvons trouver une forme explicite de la fonction de répartition (survie).

Notation	Paramètres	Domaine
$X \sim \text{Erlang}(n, \lambda)$	$\lambda > 0 \text{ et } n \in \mathbb{N}^+$	$x \ge 0$

$$f(x) = \frac{x^{n-1}\lambda^n e^{-\lambda x}}{\Gamma(n)}$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda x)^{k-1} e^{-\lambda x}}{k!}$$



Transformation

≡ Changement d'échelle pour des v.a. continues

Toutes les distributions continues (sauf pour la lognormale, l'inverse gaussienne et la log-t) ont θ comme paramètre d'échelle. Alors, multiplier la v.a. par une constante c change uniquement le paramètre $\theta^* = c\theta$.

Trouver la PDF d'une v.a. transformée

Soit n v.a. X_1, \ldots, X_n que l'on veut transformer en n autres variables aléatoires $W_1 = g_1(X_1, \ldots, X_n), \ldots, W_n = g_n(X_1, \ldots, X_n)$.

1 Trouver les inverses des équations de la transformation :

$$x_1 = g_1^{-1}(w_1, \dots, w_n)$$

$$\vdots$$

$$x_n = g_n^{-1}(w_1, \dots, w_n)$$

2 Calculer le déterminant de la matrice Jacobienne J :

$$J = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial w_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial w_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial w_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial w_n} \end{bmatrix}$$

3 Trouver la fonction de densité conjointe avec

$$f_{W_1,\ldots,W_n}(w_1,\ldots,w_n) = f_{X_1,\ldots,X_n}\left(g_1^{-1}(w_1,\ldots,w_n),\ldots,g_n^{-1}(w_1,\ldots,w_n)\right)|J|$$

Note Dans le cas univarié, $f_W(w) = f_X\left(g^{-1}(w)\right) \left| \frac{\partial g^{-1}(w)}{\partial w} \right|$.

Queues de distributions

Contexte

Si une distribution a une queue de droite qui est lourde, « thick » ou « fat », alors elle a des probabilités élevées de pertes extrêmes.

En situation d'examen nous ne pouvons pas visuellement évaluer la queue et donc nous utilisons un des 4 tests suivants :



Plus la queue est lourde, moins il y a de moments qui existent.

 \succ Il devient de moins en moins probable que l'intégrale de $x^kf(x)$ va converger.

2 Ratio des fonctions de survie (ou PDF)

Plus la queue est lourde, plus la fonction de survie va tendre vers 0 lentement.

- > Si $\lim_{x\to\infty} \frac{S_1(x)}{S_2(x)} = 0$ alors X_1 a une queue plus légère que X_2 , et vice-versa si la limite tend vers ∞.
- > Par la règle de l'hôpital, ceci est équivalent pour le ratio des PDF.

3 Fonctions de hasard

Si la fonction de hasard est $d\'{e}croissante$, il y a une probabilité plus élevée de pertes extrêmes et donc une queue lourde.

4 CTEs (ou quantiles)

 ${\it Plus}$ le CTE (ou les quantiles) est large, plus les montants de pertes extrêmes sont larges et donc ${\it plus}$ la queue est ${\it lourde}$.

Estimations et types de données

Distributions empiriques

Notation

- X Variable aléatoire de perte;
- θ Paramètre de la distribution de X;
- \rightarrow Le paramètre peut être un scalaire θ ou un vecteur θ ;
- > Par exemple, pour une loi Gamma $\theta = \{\alpha, \beta\}$;
- \succ Pour simplifier la notation, on le traite comme un scalaire $\theta.$

 $F_X(x;\theta)$ Fonction de répartition de X avec paramètre θ ;

> Pour simplifier la notation, on écrit $F(x;\theta)$ sauf s'il faut être plus spécifique.

 $f_X(x;\theta)$ Fonction de densité de X avec paramètre θ ;

 \rightarrow Pour simplifier la notation, on écrit $f(x;\theta)$ sauf s'il faut être plus spécifique.

 $\{X_1,\ldots,X_n\}$ Échantillon aléatoire de *n* observations de *X*;

 $\hat{\theta}$ Estimateur de θ établit avec l'échantillon aléatoire $\{X_1, \dots, X_n\}$;

 $F(x; \hat{\theta})$ Estimation paramétrique de la fonction de répartition de X;

 $f(x; \hat{\theta})$ Estimation paramétrique de la fonction de densité de X;

- \gt Si θ est connu, la distribution de X est complètement spécifiée; En pratique, θ est inconnu et doit être estimé avec les données observées.
- \rightarrow On peut estimer $F_X(x)$ et $f_X(x)$ directement pour toute valeur x sans présumer une forme paramétrique;

Par exemple, un histogramme est une estimation non paramétrique.

Données complètes

Notation

X Variable d'intérêt (p. ex., la durée de vie ou la perte);

 $\{X_1,\ldots,X_n\}$ Valeurs de X pour n individus;

 $\{x_1,\ldots,x_n\}$ n valeurs observées de l'échantillon;

> Il peut y avoir des valeurs dupliquées dans les valeurs observées.

 $0 < y_1 < \ldots < y_m \ m$ valeurs distinctes où $m \le n$;

 w_j Nombre de fois que la valeur y_j apparaît dans l'échantillon pour $\boxed{j=1,\ldots,m}$;

- \rightarrow Il s'ensuit que $\sum_{j=1}^{m} w_j = n$;
- \rightarrow Pour des données de mortalité, w_i individus décèdent à l'âge y_i ;
- \succ Si tous les individus sont observés de la naissance jusqu'à la mort c'est un « complete individual data set ».

 $r_i \ll risk \ set \gg au \ temps \ y_i;$

- \rightarrow Le nombre d'individus exposés à la possibilité de mourir au temps y_i ;
- \rightarrow Par exemple, $r_1=n$, car tous les individus sont exposés au risque de décéder juste avant le temps y_1 ;
- $r_j = \sum_{i=j}^m w_i$, alias le nombre d'individus qui survivent juste

avant le temps y_j .

Données incomplètes

Exemple

Soit une étude sur le nombre d'années nécessaire pour obtenir un diplôme universitaire. L'étude commence cette année et tient compte de tous les étudiants présentement inscrits, ainsi que ceux qui vont s'inscrire au courant de l'étude. Tous les étudiants sont observés jusqu'à la fin de l'étude et on note le nombre d'années nécessaire pour ceux qui complètent leurs diplômes.

Si un étudiant a commencé son cursus scolaire avant l'étude et suit présentement des cours, le chercheur a de l'information sur le nombre d'années qu'il a déjà investi. Cependant, d'autres étudiants qui se sont inscrits en même temps, mais ont cessé leurs études ne seront pas observés dans cet échantillon. Alors, l'individu est observé d'une population **tronquée à la gauche** puisque l'information sur les étudiants qui ont quitté l'université avant le début de l'étude n'est pas disponible.

Si un étudiant n'est pas encore diplômé lorsque l'étude prend fin, le chercheur ne peut pas savoir combien d'années supplémentaires seront nécessaires. Cet individu fait donc partie d'une population **censurée à la droite** puisque le chercheur a de l'information *partielle* (le nombre d'années minimal) sans savoir le nombre exact.

Notation

- d_i État de troncature de l'individu i de l'échantillon;
- $\rightarrow d_i = 0$ s'il n'y a pas de troncature;
- \gt Par exemple, un étudiant a commencé son programme universitaire d_i années avant le début de l'étude.
- x_i Temps de "survie" de l'individu i;
- $\boldsymbol{\succ}$ Par exemple, le nombre d'années avant d'obtenir son diplôme ;
- \succ Si l'étude prend fin avant que x_i soit observé, on dénote le temps de survie jusqu'à ce moment $\boxed{u_i}$;
- \succ Donc chaque individu a soit une valeur x_i ou $u_i,$ mais pas les deux.

Données groupées

Notation

 $(c_0, c_1], (c_1, c_2], \dots, (c_{k-1}, c_k]$ k intervalles regroupant les observations;

- $0 \le c_0 < c_1 < \ldots < c_k$ Extrémités des k intervalles;
- n Nombre d'observations de x_i dans l'échantillon;
- n_i Nombre d'observations de x_i dans l'intervalle $(c_{i-1}, c_i]$;
- \rightarrow Il s'ensuit que $\sum_{j=1}^k n_j = n$.

 $r_i \ll risk \ set \gg$ de l'intervalle $(c_{i-1}, c_i]$ lorsque les données sont complètes ;


 \rightarrow Il s'ensuit que $r_j = \sum_{i=j}^k n_i$

Applications en assurance

Notation

X Variable aléatoire du montant de perte.

Limite de police



■ Montant de perte limité

La variable aléatoire du **montant de perte limité** $X \wedge u$ correspond au montant du paiement de l'assureur pour une police d'assurance ayant une limite de u:

$$X \wedge u = \begin{cases} X, & X < u \\ u, & X \ge u \end{cases}$$

> Il s'ensuit que $X \wedge d = \min(X; d)$

Visuellement:



≡ L'espérance limitée du montant de perte

L'espérance limitée du montant de perte $E[X \wedge u]$ correspond à l'espérance du paiement de l'assureur pour une police d'assurance ayant une limite de u:

$$E[X \wedge u] = \int_0^u x f(x) dx + uS(u)$$

Déductibles

Déductible

Le **déductible d'une police** est le montant que l'assuré doit payer de sa poche avant que l'assureur débourse pour une perte.

Il y a 2 types de déductibles :

déductible ordinaire Une fois que le montant de perte surpasse le déductible, l'assureur va payer le montant de la perte en excès du déductible.

déductible de franchise Une fois que le montant de perte surpasse le déductible, l'assureur va payer le montant **total** de la perte.

Par défaut, on suppose le déductible ordinaire.

Visuellement:



Déductible ordinaire

■ Montant de perte avec un déductible ordinaire

La variable aléatoire du montant de perte pour une police ayant un **déductible ordinaire** de d.


Assureur

Assuré

$$(X-d)_{+} = \begin{cases} 0, & X \leq d \\ X-d, & X > d \end{cases} \qquad X \wedge d = \begin{cases} X, & X < d \\ d, & X \geq d \end{cases}$$

- > Il s'ensuit que $(X-d)_+ = \max(X-d;0)$.
- > On observe que le montant de perte est la somme des contributions $X = X \wedge d + (X d)_+$.

Visuellement:



■ L'espérance du montant de perte avec un déductible ordinaire

L'espérance du montant de perte, pour l'assureur, avec un déductible ordinaire $E[(X-d)_+]$ correspond à :

$$E[(X-d)_{+}] = \int_{d}^{\infty} (x-d)f(x)dx$$

✓ « Loss Elimination Ratio (LER) »

Le « Loss Elimination Ratio (LER) » évalue combien qu'épargne l'assureur en imposant un déductible ordinaire de d, $LER = \frac{\mathbb{E}[X \wedge d]}{\mathbb{E}[X]}$.

« payment per loss » et « payment per payment »

Notation

 Y^L Montant de perte.

> « payment per **l**oss »

 Y^P Montant de paiement.

> « payment per **p**ayment »

 $\mathbf{E}[Y^L]$ Montant espéré de paiement **par perte** subie.

 $\mathbf{E}[Y^P]$ Montant espéré de paiement par paiement effectué.

- > Par exemple, lorsqu'une police a un déductible, les pertes dont le coût est inférieur au déductible ne seront pas reportées à l'assureur.
- > Le montant de paiement est donc le montant que l'assureur va payer conditionnel à ce qu'il y ait un paiement.
- \rightarrow Il s'ensuit que $E[Y^L] \ge E[Y^L]$

Pour un déductible ordinaire de d,

$$\mathrm{E}[Y^L] = \mathrm{E}[(X - d)_+]$$

$$E[Y^P] = E[X - d|X > d]$$

- \rightarrow On trouve que $\mathbb{E}[Y^P] = \frac{\mathbb{E}[Y^L]}{S(d)}$.
- \Rightarrow Également, le montant espéré de paiement par paiement effectué est la fonction d'excès moyen $\mathbb{E}[Y^P] = e(d)$.
- \rightarrow Si la police d'assurance comporte uniquement une limite, $Y^P = Y^L$

Relations pour quelques distributions :

X	(X - d X > d)
$\operatorname{Exp}(\theta)$	$\operatorname{Exp}(\theta)$
$\mathrm{Unif}(a,b)$	$\operatorname{Unif}(0, b - d)$
$Pareto(\alpha, \theta)$	Pareto(α , θ + d)
$Beta(1,b,\theta)$	Beta $(1, b, \theta - d)$


Déductible de franchise

■ Montant de perte avec un déductible de franchise

La variable aléatoire du montant de perte pour une police ayant un **déductible de franchise** de d.

$$(X|X > d) = \begin{cases} 0, & X \le d \\ X, & X > d \end{cases}$$

Visuellement:



■ L'espérance du montant de perte avec un déductible de franchise

L'espérance du montant de perte, pour l'assureur, avec un déductible de franchise E[X|X>d] correspond à :

$$E[X|X > d] = \int_{d}^{\infty} x f(x) dx = \int_{d}^{\infty} (x - d) f(x) dx + d \int_{d}^{\infty} f(x) dx$$
$$= E[(X - d)_{+}] + dS(d)$$

Impacts du déductible sur la fréquence


Pour la classe (a, b, 0) de distributions, on trouve les relations suivantes :

Nombre de pertes (N)	Nombre de paiements (N')
$Pois(\lambda)$	$Pois(S(d)\lambda)$
Binom(n, p)	$\operatorname{Binom}(n, S(d)p)$
$BinNeg(r, \beta)$	$BinNeg(r, S(d)\beta)$

Coassurance



Le pour centage de coassurance α correspond à la portion de la perte payée par l'assureur. Pour une perte de X, l'assureur paye αX et l'assuré paye $(1-\alpha)X$.



■ L'espérance du montant de perte avec coassurance

L'espérance du montant de perte, pour l'assureur, avec une coassurance de α est $E[\alpha X] = \alpha E[X]$.

Combinaison des facteurs

Cas d'un déductible et de coassurance

 \gt Habituellement, la coassurance est appliquée après le déductible et la perte pour l'assureur est :

$$Y^{L} = \begin{cases} 0, & X \le d \\ \alpha(X - d), & X > d \end{cases}$$

$$E[Y^L] = \alpha (E[X] - E[X \wedge d])$$

> Si une question spécifie que la coassurance s'applique *avant* le déductible, il suffit de remplacer d par $\frac{d}{\alpha}$ et mettre le α en évidence comme avant :

$$Y^{L} = \begin{cases} 0, & \alpha X \leq d \\ \alpha X - d, & \alpha X > d \end{cases} = \begin{cases} 0, & X \leq \frac{d}{\alpha} \\ \alpha \left(X - \frac{d}{\alpha} \right), & X > \frac{d}{\alpha} \end{cases}$$

$$\mathrm{E}[Y^L] = \alpha \left(\mathrm{E}[X] - \mathrm{E}\left[X \wedge \frac{d}{\alpha}\right] \right)$$

Soit une police ayant:

1. une coassurance de α ,

- 2. une limite de police de u,
- 3. un déductible *ordinaire* de d.

Alors, $\operatorname{E}[Y^L] = \alpha \left\{ \operatorname{E}[X \wedge m] - \operatorname{E}[X \wedge d] \right\}$ et

$$Y^{L} = \begin{cases} 0, & X \leq d \\ \alpha(X - d), & d < X < m \\ u, & X \geq m \end{cases}$$

où m est la perte maximale admissible.

\vee Perte maximale admissible m

Soit la perte maximale admissible $m = \frac{u}{\alpha} + d$ représentant la plus petite perte pour laquelle l'assureur paye la limite u.

> En anglais, « maximum covered loss ».

Visuellement:



Inflation

■ Inflation r

L'inflation de r augmente les coûts, mais, de façon générale, ils sont couverts par la compagnie d'assurance et ne causent pas de changements à la police.

■ L'espérance du montant de perte avec inflation

L'espérance du montant de perte, pour l'assureur, avec de l'inflation de r est E[(1+r)X] = (1+r)E[X].

Combiné avec les autres facteurs :

$$E\left[Y^{L}\right] = \alpha(1+r)\left(E\left[X \wedge \frac{m}{1+r}\right] - E\left[X \wedge \frac{d}{1+r}\right]\right)$$
$$E\left[Y^{P}\right] = \frac{E[Y^{L}]}{S_{X}\left(\frac{d}{1+r}\right)}$$

Note Si la distribution de X comporte un paramètre d'échelle θ , on peut simplifier les équations en posant $\theta' = (1+r)\theta$.

Estimation de modèles non paramétriques

Données complètes

Section à compléter avec mes notes d IARD et 11.2 de Nonlife Actuariel Models

Distribution empirique

Distribution empirique

Distribution discrète prenant comme valeurs y_1, \ldots, y_m avec probabilités

> On peut également la définir comme la distribution discrète équiprobable des valeurs x_1, \ldots, x_n .

Notation

- $\hat{f}()$ Fonction de densité empirique.
- $\hat{F}()$ Fonction de répartition empirique.
- $\tilde{F}()$ Fonction de répartition lissée;
- > En anglais, « smoothed empirical distribution function ».
- > On appelle parfois la fonction de répartition la fonction distribution (« distribution function »).

$$\hat{f}(y) = \begin{cases} \frac{w_j}{n}, & \text{si } y = y_j \,\forall j \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\hat{F}(y) = \begin{cases} 0, & y < y_1, \\ \frac{1}{n} \sum_{h=1}^{j} w_h, & y_j \le y < y_{j+1}, j = 1, \dots, m-1 \\ 1, & y_m < y \end{cases}$$

On peut estimer la valeur de $\hat{F}()$ pour un une valeur de y pas dans l'ensemble y_1, \ldots, y_m avec la fonction de répartition lissée $\tilde{F}()$. Pour $y_i \leq y < y_{i+1}$

et $j \in \{1, 2, ..., m-1\}$, $\tilde{F}(y)$ est une interpolation linéaire de $\hat{F}(y_{j+1})$ et $\hat{F}(y_j)$:

$$\tilde{F}(y) = \frac{y - y_j}{y_{j+1} - y_j} \hat{F}(y_{j+1}) + \frac{y_{j+1} - y_j}{y_{j+1} - y_j} \hat{F}(y_j)$$

On peut écrire la fonction de répartition empirique comme $|\hat{F}(y)| = \frac{Y}{n}$ où Y est le nombre d'observations qui sont inférieures ou égales à y tel que $Y \sim \text{Bin}(n, p = F(y))$

On trouve:

$$E[Y] = \frac{E[\hat{F}(y)]}{n} = F(y)$$

$$Var(Y) = \frac{Var(\hat{F}(y))}{n^2} = \frac{F(y)(1 - F(y))}{n}$$

Estimation par noyaux

La fonction de répartition empirique résume les données d'une distribution discrète. Cependant, lorsque la variable d'intérêt X est continue on souhaite estimer une fonction de densité.

Pour une observation x_i de l'échantillon, la fonction de répartition empirique assigne une masse de probabilité de 1/n au point x_i . Puisque X est continue, il est normal que l'on souhaite distribuer cette masse autour de x_i .

Si l'on souhaite distribuer cette masse de façon égale, on le fait sur l'intervalle $[x_i - b, x_i + b]$ avec la fonction de x_i $f_i(x)$:

$$f_i(x) = \begin{cases} \frac{0.5}{b}, & x_i - b \le x \le x_i + b, \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

- > Cette fonction est rectangulaire avec une base de longueur 2b et une hauteur de 0.5/b pour avoir une aire de 1.
- > On peut l'interpréter comme la fonction de densité contribuée par l'observation
- > On note que ceci correspond à la fonction de densité d'une distribution uniforme $U(x_i-b,x_i+b)$;
- \rightarrow Alors, seulement les valeurs de x contenues dans l'intervalle $(x_i b, x_i + b)$ reçoivent une "contribution" de x_i ;
- > La fonction de densité de X est donc la somme des masses de probabilité contri-

buées
$$\tilde{f}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x)$$
.

On défini
$$\phi_i = \frac{x - x_i}{b}$$
 et $K_R(\phi)$:
$$K_R(\phi) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 \le \phi \le 1, \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

> On trouve donc que $f_i(x) = \frac{1}{b}K_R(\phi_i)$ et $\tilde{f}(x) = \frac{1}{nb}\sum_{i=1}^n K_R(\phi_i)$

Notation

 $b \ll b$ and with \Rightarrow où b > 0;

 $K_R(\phi)$ « rectangular (box, uniform) kernel function »;

 $\tilde{f}(x)$ Estimation de la fonction de densité selon le noyau rectangulaire;

 $K_T(\phi)$ « triangular kernel »;

$$K_R(\phi) = \begin{cases} 1 - |\phi|, & -1 \le \phi \le 1, \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

 $K_G(\phi)$ « Gaussian kernel »;

$$K_G(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\phi^2}{2}}, -\infty < \phi < \infty$$

Données incomplètes

Section à compléter avec mes notes d IARD et 11.2 de Nonlife Actuariel Models (tse).

Estimateur de Kaplan-Meier

Soit:

$$S(y_j) = \Pr(X > y_1) \Pr(X > y_2 | X > y_1) \dots \Pr(X > y_j | X > y_{j-1}) = \Pr(X > y_1) \prod_{h=2}^{J} I$$

Où on peut estimer $\widehat{\Pr}(X > y_1) = 1 - \frac{w_1}{r_1}$ et $\widehat{\Pr}(X > y_h | X > y_{h-1}) = 1 - \frac{w_h}{r_h}$ pour h = 2

Il s'ensuit qu'on peut estimer $S(y_i)$ par :

$$\hat{S}(y_j) = \prod_{h=1}^j \left(1 - \frac{w_h}{r_h}\right)$$

Variance de l'estimateur Kaplan-Meier : $\operatorname{Var}(\hat{S}_K(y_j)|\mathcal{C}) \approx \left(S(y_j)\right)^2 \left(\sum_{h=1}^j \frac{1-S_h}{S_h r_h}\right)$

Approximation de Greenwood de la variance de l'estimateur Kaplan-Meier :

$$\widehat{\operatorname{Var}}(\hat{S}_K(y_j)|\mathcal{C}) \approx (\hat{S}_K(y_j))^2 \left(\sum_{h=1}^j \frac{w_h}{r_h(r_h-w_h)}\right)$$

Estimateur de Nelson-Aalen

Notation

h(y) Fonction de hasard.

H(y) Fonction de hasard cumulative.

$$H(y) = \int_0^y h(y) dy$$

Il s'ensuit que $S(y) = e^{-H(y)}$ et $H(y) = -\ln(S(y))$.

Avec l'approximation $-\ln\left(1-\frac{w_h}{r_h}\right) \approx \frac{w_h}{r_h}$ on trouve que $H(y) = \sum_{h=1}^{j} \frac{w_h}{r_h}$ qui correspond à l'**estimateur Nelson-Aalen** de la fonction de hasard cumulative.

Données groupées

Section à compléter avec mes notes d IARD et 11.3 de Nonlife Actuariel Models (tse).

Estimation de modèles paramétriques

Estimation par maximum de vraisemblance pour des données incomplètes et groupées

Lorsque les données sont groupées et/ou incomplètes, les observations ne sont plus iid, mais on peut quand même formuler la fonction de vraisemblance et trouver l'EMV.

La première étape est d'écrire la fonction de (log) vraisemblance adéquate pour la méthode d'échantillonnage des données.

Par exemple, soit des données groupées en k intervalles :

- > On trouve avec la fonction de répartition $F(\cdot;\theta)$ que la probabilité d'être dans l'intervalle $(c_{j-1},c_j]$ est $F(c_j;\theta)-F(c_{j-1};\theta)$;
- > On pose que les observations individuelles sont iid;
- > Donc, la vraisemblance d'avoir n_j observations dans l'intervalle $(c_{j-1}, c_j]$, pour $j=1,\ldots,k$ et $\mathbf{n}=(n_1,\cdots,n_k)$ est :

$$\mathcal{L}(\theta; \mathbf{n}) = \prod_{j=1}^{k} \left[F(c_j; \theta) - F(c_{j-1}; \theta) \right]^{n_j}$$

Fonction de vraisemblance

Données complètes

$$\mathcal{L}(\theta; \boldsymbol{x}) = \prod_{j=1}^{k} \underbrace{f(x_j; \theta)}_{\substack{\text{probabilité que chaque observation soit égale à \\ \text{la valeur observée}}}$$

\vee Données groupées en k intervalles

$$\mathcal{L}(\theta; \mathbf{x}) = \prod_{j=1}^{k} \underbrace{\left[F(c_j; \theta) - F(c_{j-1}; \theta)\right]^{n_j}}_{\text{probabilité qu'une observation soit contenue dans l'intervalle}}$$

✓ Données censurées vers la droite

On pose que n_1 observations sont complètes et que n_2 observations sont censurées à la limite de u :

$$\mathcal{L}(\theta; \mathbf{x}) = \underbrace{\left[\prod_{i=1}^{n_1} f(x_i; \theta)\right]}_{\text{probabilit\'e de chaque}}$$

soit supérieure, ou égale, à u $[1 - F(u; \theta)]^{n_2}$

observation à la valeur observée

v tronquées vers la gauche

On pose un déductible de d:

$$\mathcal{L}(\theta; x) = \underbrace{\frac{1}{[1 - F(d; \theta)]^n}}_{i=1} \qquad \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

pondère la vraisemblance par la probabilité d'être supérieur au déductible

Évaluation et sélection de modèles

Cette section n'est pas suffisamment bien expliquée pour que je la considère complète.

Contexte

Évaluer les modèles avec des méthodes non paramétriques a l'avantage d'avoir très peu d'hypothèses. Cependant, il est plus difficile d'évaluer le modèle d'un point de vue théorique.

Évaluer les modèles avec des méthodes paramétriques a l'avantage de résumer le modèle à un petit nombre de paramètres. Cependant, ces méthodes sont une simplification et risquent d'imposer la mauvaise structure.

Graphiquement

Avec les méthodes d'évaluation visuelles, on peut détecter si les données diffèrent anormalement du modèle paramétrique.

- > On peut évaluer la fonction de répartition empirique et la fonction de répartition théorique sur un même graphique pour évaluer l'ajustement.
- \gt On peut évaluer le tracé des probabilités (« P-P plot ») qui trace la répartition empirique et la répartition théorique.
- > On peut tracer l'histogramme des données et superposer la densité théorique pour évaluer l'ajustement.

Le désavantage de ces méthodes est qu'elles ne fournissent pas des mesures quantitatives sur l'ajustement du modèle.

Tests pour la qualité de l'ajustement

☐ Tests de spécification (« misspecification tests »)

Test de signifiance dont l'objectif est d'évaluer les hypothèses de distribution d'un modèle.

Notation

- $F^*()$ Fonction de répartition d'une v.a. continue (hypothèse nulle).
- $\hat{F}()$ Fonction de répartition empirique.

Les tests de Kolmogorov-Smirnov (K.-S.) et de Anderson-Darling sont idéaux lorsque l'on désire comparer les fonctions de répartition.

Le test de K.-S. compare la fonction de distribution (répartition) empirique à celle d'une distribution théorique. L'idée du test est donc de quantifier l'évaluation visuelle que l'on peut faire de l'ajustement.

≡ Test de Kolmogorov-Smirnov

On teste si les données semblent suivre une distribution (« supportent l'hypothèse nulle ») avec la statistique de Kolmogorov-Smirnov :

$$D = \max_{x_{(1)} \le x \le x_{(n)}} |\hat{F}(x) - F^*(x)|$$

- > Ceci équivaut donc à calculer la différence maximale entre la fonction de répartition empirique et celle de la distribution.
- > Puisque $\hat{F}()$ est une fonction à escalier, il faut seulement évaluer la fonction aux points observés $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \ldots \leq x_{(n)}$.
- \gt De plus, le maximum peut seulement arriver soit au point de saut $x_{(i)}$ ou immédiatement avant $x_{(i-1)}$.

On peut donc récrire

$$D = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \left\{ \max \left\{ \left| \hat{F}(x_{(i-1)}) - F^*(x_{(i)}) \right|, \left| \hat{F}(x_{(i)}) - F^*(x_{(i)}) \right| \right\} \right\}.$$


- \gt Si les données sont bien ajustées, on s'attend à ce que D soit très petit.
- > Lorsque la distribution est entièrement spécifiée (aucun paramètre n'est estimé), une table avec les valeurs critiques est donnée.
- > S'il faut estimer des paramètres, la simulation Monte-Carlo est utilisée pour trouver des nouvelles valeurs critiques.

▼ Test de K.-S. pour des données incomplètes

Pour des données tronquées à d et censurée (vers la droite) à u,

$$D = \max_{d \le x \le u} |\hat{F}(x) - F^*(x)|$$

Visuellement, le test de K.-S. ressemble à :



Lorsque les paramètres sont connus, le test de K.-S. n'est pas spécifique à aucune distribution avec des valeurs critiques générales. Le test de Anderson-Darling (A.-D.) considère toutes les différences $(\hat{F}(x) - F^*(x))$ et non seulement la différence maximale. Également, elle attribue plus de poids aux queues de la distribution en pondérant par la fonction de répartition et de survie :

$$A^{2} = n \int \frac{(\hat{F}(x) - F^{*}(x))^{2}}{F^{*}(x)S^{*}(x)} f^{*}(x)dx$$

Donc, lorsque $F^*(x)$ ou $S^*(x)$ est petit, la différence est attribuée plus de poids.

Il s'ensuit que le test de A.-D. est « spécifique par distribution » dans le sens que les valeurs critiques sont différentes selon la distribution sous-jacente—il y a une table de valeurs critiques pour une distribution normale, Weibull, exponentielle, etc.

■ Test de Anderson-Darling

L'intégrale ci-dessus se simplifie à :

$$A^{2} = -n - \frac{1}{n} \left[\sum_{j=1}^{n} (2j - 1) \log \left(F^{*}(x_{(j)}) \left[1 - F^{*}(x_{(n+1-j)}) \right] \right) \right]$$

Le test du khi carré sert à tester les hypothèses d'une distribution en comparant les fréquences observées aux fréquences théoriques.

≡ Test d'adéquation du khi-carré

Le test du rapport de vraisemblance teste la validité des restrictions d'un modèle et peut décider si un modèle peut être simplifié.

≡ Test du rapport de vraisemblance

Critères d'information pour la sélection de modèles

Lorsque l'on compare deux modèles, on dit qu'un modèle est « emboîté » si l'autre comporte tous ses paramètres. Par exemple, un modèle basé sur une distribution exponentielle est emboîté par un modèle basé sur une distribution gamma ayant le même paramètre de fréquence β .

Il s'ensuit que le modèle comportant le plus de paramètres aura l'avantage de mieux s'ajuster aux données avec une fonction plus flexible et, possiblement, une log-vraisemblance plus élevée. Afin de comparer les modèles sur une même base, on utilise la log-vraisemblance pénalisée.

≡ Critère d'information d'Akaike (AIC)

L'AIC pénalise les modèles ayant plus de paramètres en soustrayant le nombre de paramètres estimés p du modèle de la log-vraisemblance :

$$AIC = \log \mathcal{L}(\hat{\theta}_n^{\text{EMV}}; x) - p$$

- > On choisit le modèle qui maximise l'AIC.
- \rightarrow En anglais, « Akaike Information Criterion (AIC) ».

Le désavantage de l'AIC est que, pour deux modèles emboîtés, la probabilité de choisir le modèle plus simple (p. ex., un modèle basé sur la distribution exponentielle au lieu de la distribution gamma) alors qu'il est vrai)erreur de type I) ne tends pas vers 1 lorsque le nombre d'observations tend vers l'infini. On dit donc que c'est une mesure « inconsistent ».

≡ Critère d'information bayésien (BIC)

Le BIC pénalise plus sévèrement les modèles ayant plus de paramètres : $BIC = \log \mathcal{L}(\hat{\theta}_n^{\text{EMV}}; x) - \frac{p}{2} \log(n).$

> En anglais, « Bayesian Information Criterion (BIC) »

Le BIC est « consistent » et règle le désavantage de l'AIC avec une probabilité de 1 d'éviter une erreur de type I lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini.

Dans les deux cas, la probabilité de rejeter le modèle plus simple lorsque le vrai modèle est entre les deux tend vers 1.

Quatrième partie Sujets divers

Optimisation numérique

\blacksquare Algorithmes « Greedy »

Méthode de résolution de problèmes qui prend la décision optimale à chaque étape d'obtenir la solution optimale d'un problème.

On dit que ces algorithmes sont « greedy », car, à chaque étape, ils prennent la meilleure décision sans tenir compte des choix futurs qui pourraient être plus optimaux. Donc, la solution trouvée n'est pas nécessairement la solution optimale.

Ces algorithmes ont l'avantage d'être **plus rapide**s au coût d'être **moins précis**.

Théorie de la fiabilité

Théorie de la fiabilité

 ${\bf Contexte}: {\bf Un}\ syst\`eme\ {\bf ayant\ plusieurs}\ composantes.$

 $\mathbf{Id\acute{e}}$: Le fonctionnement du système dépend du fonctionnement des composantes.

La **théorie de la fiabilité** sert à quantifier la probabilité qu'un *système* fonctionne selon la fiabilité de ses composantes, et selon le rôle qu'elles ont dans le système.

possibles. Ceci résulte en $2 \times 2 \times \cdots 2 = 2^n$ différentes combinaisons possibles.

≡ L'état d'un système

L'état d'un système dépend des états de ses composantes. L'état du système est représentée sous la forme d'une fonction $\phi(x)$ binaire :

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & \text{si le système fonctionne} \\ 0, & \text{si le système ne fonctionne pas} \end{cases}$$

Introduction aux systèmes

Notation

- x_i **État** de la composante i.
- $\phi(x)$ « $Structure\ function$ » d'un système représentant son état.

■ L'état d'une composante

Chacune des composantes du sys tème a sa propre durée de vie (« lifetime »). Cette durée de vie est dénotée par la variable aléatoire binaire x_i représentant son état.

Soit la composante fonctionne, ou elle ne fonctionne pas :

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{si la composante fonctionne} \\ 0, & \text{si la composante ne fonctionne pas} \end{cases}$$

■ Vecteur des états d'un système

Le vecteur des états d'un système (« $state\ vector$ ») regroupe les états de toutes les composantes d'un système. Il indique donc quelles composantes fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Il est représentée sous la forme

$$x=(x_1,x_2,\ldots,x_n).$$


Note Un système ayant n composantes et le vecteur des états peut être un de 2^n différentes combinaisons.

> Puisque les composantes du système sont binaires, chacune a deux valeurs

Systèmes communs

Système parallèle

Fonctionne tant qu'au moins une des composantes du système fonctionne.



Système de série


Fonctionne seulement si toutes les composantes du système fonctionnent.



\square Système de k parmi n

Fonction si au moins k des n composantes du système fonctionnent.

 \gt Un système parallèle est donc un système de 1 parmi n et un système de série un système de n parmi n.



Autres systèmes

En bref, il y a une infinité de systèmes qui peuvent être construits comme des combinaisons des systèmes précédents.

Minimal path and minimal cut sets

≡ « Minimal path sets »

Si le système fonctionne, un vecteur d'états \boldsymbol{x} est un « path vector ». Si le système cesse de fonctionner dès qu'une des composantes qui fonctionne échoue, c'est à dire qu'il n'y a pas de composantes de « backup », alors le vecteur d'états \boldsymbol{x} est un « minimal path vector ».

Structure Functions

Reliability of Systems

Bounds of Reliability Functions

Random Graphs

Lifetime of Systems

Miscellaneous

Cinquième partie

Processus stochastiques

Introduction

Notation

 X_n État du processus au temps n.

 \rightarrow Par exemple, si $X_n=i$ alors le processus est dit d'être dans l'état i au temps n.

Processus stochastique

Soit le processus stochastique $\{X_n, n = 0, 1, 2, ...\}$

Processus de Poisson

Notation

 $\lambda(t)$ Fonction d'intensité d'un processus de Poisson.

> En anglais, « rate function ».

Processus stochastique

Une collection de variables aléatoires.

■ Processus de comptage

On dénote le processus de comptage par $\underline{N} = \{N(t), t \ge 0\}$. Le processus **compte le nombre d'événements** qui se produisent dans l'intervalle de temps (0,t] où t>0.

En termes mathématiques, c'est un processus stochastique dont les variables aléatoires prennent des valeurs non décroissantes et non négatives sous les conditions suivantes :

- 1. N(0) = 0;
- 2. $N(t) \ge 0$ (valeurs non négatives);
- 3. N(t) est entier;
- 4. $N(t+h) \ge N(h)$ pour h > 0 (valeurs non décroissantes).

Visuellement, on voir que l'accroissement N(t+h)-N(t) représente le nombre d'événements produits sur l'intervalle (t,t+h]:



> Alias, processus de dénombrement.

■ Processus de Poisson

Processus de comptage dont :

- 1. chaque accroissement est une variable aléatoire de Poisson,
- 2. les accroissements qui ne se chevauchent pas sont indépendants.

Pour un processus de Poisson avec fonction d'intensité $\lambda(t)$, l'accroissement $N(t+h)-N(t)\sim \mathrm{Poisson}\left(\lambda=\int_t^{t+h}\lambda(u)du\right)$.

- > On pose donc que le paramètre de la fréquence des accroissements λ est la moyenne de la fonction d'intensité des accroissements $\lambda(t)$ sur l'intervalle de temps (t, t+h].
 - ∨ Processus de Poisson homogène

Si la fonction d'intensité est constante, $\lambda(t) = \lambda$, le processus \underline{N} est un **processus** de **Poisson** homogène et $N(t+h) - N(t) \sim \operatorname{Poisson}(\lambda t)$.

▼ Processus de Poisson non homogène

Si la fonction d'intensité varie avec le temps t, le processus \underline{N} est un processus de Poisson non homogène.

Temps d'occurrence

Notation

 T_k Temps d'occurrence du k^e événement.

$$T_k = V_1 + V_2 + \cdots + V_k .$$


 V_k Intervalle de temps entre la réalisation du $(k-1)^e$ et du k^e événement.

> Alias, le temps inter arrivé.

$$> V_k = T_k - T_{k-1} .$$

$$\rightarrow$$
 On pose que $T_0 = 0$, $V_0 = 0$ et que $V_1 = T_1$.

Visuellement:



Temps d'occurrence

On peut définir le processus de comptage en fonction du temps d'occurrence des événements au lieu nombre de sinistres : $N(t) = \sup\{k \ge 1 : T_k \le t\}$,

$$\forall t \geq 0$$
.

$$Pr(T_k > s) = Pr(N(s) < k) .$$

C'est-à-dire,

$$\Pr\left(\stackrel{\text{le }k^{\ell}}{\text{evénement se produise}}\right)$$

$$= \Pr\left(\substack{\text{moins de } k \text{ \'ev\'enements se} \\ \text{produisent d'ici le temps } s} \right)$$

▼ Temps d'occurrence pour des processus de Poisson homogènes

Si
$$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$$

$$V_k \sim \mathrm{Exp}\left(heta = rac{1}{\lambda}
ight)$$

 et

$$T_k \sim \operatorname{Gamma}\left(lpha = k, heta = rac{1}{\lambda}
ight) \sim \operatorname{Erlang}\left(n = k, \lambda
ight).$$


Note La loi Gamma avec un paramètre de forme α entier correspond à la loi Erlang. L'avantage de la loi Erlang est qu'elle a une fonction de répartition explicite qui découle de la relation entre les processus de Poisson et les temps d'occurrences. Voir la sous-section sur les **Distributions** du chapitre de Mathématiques actuarielles IARD I.

Temps d'occurrence conditionnels

Note Voir la sous-section des Statistiques d'ordre du chapitre de Analyse statistique des risques actuariels.

Lorsque nous savons qu'un certain nombre d'événements se produit d'ici un temps t, les temps d'occurrences T_1, T_2, \ldots, T_n ne suivent plus une distribution Gamma. Ceci est puisque leurs domaines sont bornés à t au lieu d'être infinis.

Par exemple, N(t) = n implique que $T_1, T_2, ..., T_n \le t$:




On en déduit que les temps d'occurrences sont en fait des **Statistiques d'ordre** avec $0 < T_1 \le T_2 \le \cdots \le T_n \le t$:




Pour déterminer la distribution de T_i , $i=1,2,\ldots,n$, on rappel ces deux propriétés des processus de Poisson homogènes :

- 1 Les intervalles qui ne se chevauchent pas sont indépendants.
- 2 Le paramètre de fréquence λ est proportionnel à la longueur d'un intervalle, ce qui implique qu'il est identique pour des intervalles de la même longueur.


On en déduit que les temps d'occurrences des événements devraient être uniformément distribués en n+1 sous-intervalles :



Donc, T_1, T_2, \ldots, T_n sont les statistiques d'ordre d'une distribution U(0,t):



En bref:



Également, lorsque $X_k \sim U(a,b)$ pour $k=1,2,\ldots,n,$ on trouve que $\mathbb{E}[X_{(k)}] = \mathbb{E}[T_k] = a + \frac{k(b-a)}{n+1}.$

Exemple

Des autobus arrivent à un arrêt d'autobus selon une distribution de Poisson avec un paramètre de fréquence de $\lambda=4$ par heure. Les autobus commencent

à arriver dès 8h du matin.

On sait qu'aujourd'hui, trois autobus sont passés entre 8h et 9h du matin.


Calculer:

- 1. L'espérance du temps d'arrivé du 5^e bus,
- 2. L'espérance du temps d'arrivé du 2^e bus,
- 3. La probabilité que seulement un bus soit passé entre 8h et 8h30 du matin.

Premièrement, l'espérance du temps d'arrivé du 5^e bus :

- 1 On connaît l'intervalle de temps durant laquelle les 3 premiers autobus arrivent.
 - Ceci implique que le 5^e autobus peut arriver à tout moment passé 9AM—alias, T_5 est n'a pas encore eu lieu et n'est pas borné.
- 2 On peut donc récrire l'espérance conditionnelle : $E[T_5|N(8,9]=3]=E[T_2]$

Visuellement, on peut voir pourquoi ces deux écritures sont équivalentes :



2 Puisque T_5 n'est pas borné, il suit une distribution Gamma(2,1/4). Donc, $\mathrm{E}[T_2]=\frac{2}{4}=0.50$ ce qui équivaut à 9h30AM.

Deuxièmement, l'espérance du temps d'arrivé du 2^e bus :

- 1 On connaît l'intervalle de temps durant laquelle les 3 premiers autobus arrivent.
 - Ceci implique que le temps d'arrivé du 2^e doit être à, ou avant, 9AM—alias, T_2 a **eu lieu** et **est borné**.

2 Il s'ensuit que T_2 ne suit pas une distribution Gamma et que l'espérance conditionnelle de son temps d'arrivé, T_2 , équivaut à l'espérance de la 2^e statistique d'ordre, $X_{(2)}$, des temps d'arrivés non ordonnés X_k distribués uniformément entre 8AM et 9AM (U(8,9)) pour k=1,2,3:

$$E[T_2|N(8,9] = 3] = E[X_{(2)}] = 8 + \frac{2 \times (9 - 8)}{3 + 1} = 8.5$$
 qui équivaut à 8h30AM.

Dernièrement, la probabilité que seulement un bus soit passé entre 8h et 8h30 du matin.

1 On observe la probabilité qu'on désire calculer :



- 2 Le « *twist* » pour calculer la probabilité est de la voir comme une binomiale.
- 3 D'abord, puisque $X_k \sim \text{U}(8,9)$ alors la probabilité que n'importe lequel des autobus arrive dans la première demi-heure est $\Pr(X_k \leq 0.5) = \frac{1}{9-8+1} = 0.50$ pour k = 1, 2, 3.
- 4 Puis, on défini un « succès » comme « un autobus qui arrive dans la première demi-heure » ce qui implique que $\Pr(\text{succès}) = \Pr(X_k \le 0.50) = 0.50$.
- Finalement, $\Pr(N(8, 8.5] = 1|N(8, 9] = 3) = \Pr\left(\underset{\text{entre } 8h00 \text{ et } 8h30}{\text{un autobus arrive}} \cap \underset{\text{entre } 8h30 \text{ et } 9h00}{\text{2 autobus arrivent}}\right) = \Pr(1 \text{ succès}) = {3 \choose 1} 0.5^{1} (1 0.5)^{2} = 0.375$

Propriétés des processus de Poisson

Décomposition de processus de Poisson

💆 Décomposition de processus de Poisson (« Thinning »)

Si un processus de Poisson peut être décomposé en plusieurs sous-processus distincts, alors ces sous-processus distincts sont également des processus de Poisson avec une fonction d'intensité proportionnelle. Ce processus de décomposition s'appelle le « *thinning* ».

Soit:

- \rightarrow le processus de Poisson N avec fonction d'intensité $\lambda(t)$,
- \rightarrow les sous-processus distincts N_1, N_2, \ldots, N_n de N dont les proportions sont $\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n$.

Alors, N_1, N_2, \ldots, N_n sont des processus de Poisson indépendants avec paramètre de fréquence $\pi_1 \lambda(t), \pi_2 \lambda(t), \ldots, \pi_n \lambda(t)$.

Si le processus N est homogène et que les **proportions** π_i sont **constantes**, pour i = 1, 2, ..., n, alors les sous-processus sont **homogènes**. Cependant, si les **proportions** ne sont **pas constantes** alors les sous-processus ne sont **pas homogènes**.

Superposition

Somme de processus de Poisson (« Superposition »)

La somme de plusieurs processus de Poisson s'appelle la « superposition ». Si les processus de Poisson sont indépendants, leur somme est également un processus de Poisson.

Soit:

 \rightarrow les processus de Poisson indépendants N_1, N_2, \ldots, N_n avec paramètres de fréquence $\lambda_1(t), \lambda_2(t), \ldots, \lambda_n(t)$.

Alors, $N_1+N_2+\cdots+N_n$ est un processus de Poisson avec paramètre de fréquence $\lambda=\lambda_1(t)+\lambda_2(t)+\cdots+\lambda_n(t)$.

Probabilités conjointes

Notation

 N_1,N_2 Processus de Poisson indépendants avec paramètres de fréquence $\lambda_1,\lambda_2.$

 $T_{1,n}$ Le temps jusqu'au n^e événement de N_1 .

 T_{2m} Le temps jusqu'au m^e événement de N_2 .

$$\Pr\left(\begin{smallmatrix} \text{d'observer 1 \'ev\'enement de } N_1 \text{ avant} \\ \text{d'observer 1 \'ev\'enement de } N_2 \end{smallmatrix} \right) = \Pr(T_{1,1} < T_{2,1}) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

On peut généraliser ceci pour trouver une distribution binomiale négative ou binomiale :

$$\begin{aligned} & \Pr\left(\stackrel{\text{d'observer }n \text{ \'ev\'enements de }N_1 \text{ avant}}{\text{d'observer }m \text{ \'ev\'enement de }N_2} \right) = \Pr(T_{1,n} < T_{2,m}) \\ & = \Pr\left(\stackrel{\text{d'observer au plus }m-1 \text{ \'ev\'enements de }N_2 \text{ avant}}{\text{d'observer le }n^e \text{ \'ev\'enement de }N_1} \right) \\ & = \sum_{k=0}^{m-1} \binom{n+k-1}{n-1} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^n \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \\ & = \Pr\left(\stackrel{\text{parmis les }n+m-1}{\text{au moins }n \text{ proviennent de }N_1 \text{ et au plus }m-1 \text{ proviennent de }N_2 \right) = \Pr\left(\stackrel{n^e \text{ \'ev\'enement de }N_1 \text{ se produise avant}}{\text{le }m^e \text{ \'ev\'enement de }N_2} \right) \\ & = \sum_{k=0}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{(n+m-1)-k} \end{aligned}$$

Notes sur la représentation sous la forme binomiale négative :

- > Dans l'équation, on traite une réalisation de N_1 comme un « succès » et une réalisation de N_2 comme un « échec ».
- \rightarrow « Au~plus~m-1 », implique tout nombre d'événements du 2^e processus allant de 0 à m-1.
- \rightarrow L'approche est donc de fixer n réalisations de N_1 , puis de traiter tous les autres cas possibles en faisant varier le nombre de réalisations N_2 de 0 à m-1.
- \rightarrow Au total, il y aura au moins n événements $(N_2=0)$ et au plus n+m-1 événements $(N_2=m-1)$ qui vont se réaliser.
- \gt Ceci résulte en m différents scénarios possibles.

Notes sur la représentation sous la forme binomiale :

- \gt Dans l'équation, on traite une réalisation de N_1 comme un « succès ».
- > L'approche est donc de fixer le nombre de réalisations total à n+m-1 puis, d'attribuer le nombre d'événements aux deux processus en assurant au moins n réalisations de N_1 .

Mélanges de processus de Poisson

Lorsque la fonction d'intensité est une variable aléatoire, nous obtenons un mélange de processus de Poisson. Ce mélange est un nouveau processus qui n'est pas un processus de Poisson.

Identité Poisson-Gamma

Si la v.a. conditionnelle $(N|\Lambda) \sim \text{Poisson}(\Lambda)$ et que $\Lambda \sim \text{Gamma}(n,\theta)$ alors la v.a. inconditionnelle $N \sim \text{Binomiale N\'egative}(r=n,\theta)$.

Processus de Poisson composés

Processus de Poisson composé

${\bf Contexte}$

Les distributions composées permettent aux compagnies d'assurance de conjointement modéliser la fréquence et la sévérité de sinistres.

Si la fréquence d'accidents est distribuée selon une loi de Poisson et que les montants sont iid, la somme des montants des sinistres est un **processus** de Poisson composé.

Soit:

- \gt le processus de Poisson N,
- \succ la suite de v.a. iid $X_1, X_2, \dots, X_{N(t)}.$

Alors $S(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i$ est un processus de Poisson composé où S(0) = 0 et si N(t) = 0 alors S(t) = 0.

Fonctions du processus de Poisson composé

$$\mathrm{E}[S(t)] = \mathrm{E}[N(t)]\mathrm{E}[X] \qquad \qquad \mathrm{Var}(S(t)) = \mathrm{E}[N(t)]\mathrm{E}[X^2]$$

✓ Approximation de la distribution

Puisque la distribution de S(t) est difficile à déterminer, elle peut être approximée avec le **théorème limite centrale** où $S(t) \approx \mathcal{N}\left(\mathbb{E}[S(t)], \operatorname{Var}(S(t))\right)$.

Il s'ensuit que :

$$\Pr(S(t) < s) = \Phi\left(\frac{s - \mathrm{E}[S(t)]}{\sqrt{\mathrm{Var}(S(t))}}\right)$$

Cependant, dans le cas où nous utilisons une distribution continue (normale) pour approximer une distribution **de sévérité** discrète, il faut appliquer une correction de continuité.

☐ Correction de continuité

La correction de continuité s'applique lorsqu'une distribution continue approxime une distribution discrète.

Une distribution discrète est seulement définie sur les nombres entiers alors qu'une distribution continue est définie sur tous les nombres réels. La correction améliore donc l'estimation en remplaçant s par le point milieu entre s et la plus proche valeur de S(t) qui est inférieure à s.

Sommer des processus de Poisson résulte en un processus de Poisson dont la v.a. de sévérité est la moyenne des v.a. de sévérités de chacun des processus. C'est-à-dire que $f_X(x) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} f_{X_1}(x) + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} f_{X_2}(x)$.

Chaînes de Markov

Une chaîne de Markov pose que l'état du processus au temps n dépend seulement du dernier état à n-1 :

$$\Pr(X_n = j | X_{n-1} = i_{n-1}, X_{n-2} = i_{n-2}, \dots, X_0 = i_0) = \Pr(X_n = j | X_{n-1} = i) = P_{ij}$$

Équation de Chapman-Kolmogorov

Notation

 P_{ij} Probabilité de la transition de l'état i à l'état j.

$$P_{ij} = \Pr(X_n = j | X_{n-1} = i_{n-1})$$

 P^n_{ij} Probabilité de la transition de l'état i à l'état j dans n étapes.

$$P_{ij}^n = \Pr(X_{n+k} = j | X_k = i)$$

L'équation de Chapman-Kolmogorov trouve la probabilité d'être dans l'état j au temps t sachant qu'au temps 0 on était à l'état i: $P_{ij}^{n+m} = \sum_{k=0}^{\infty} P_{ik}^n P_{kj}^m \ .$

Temps inter

Soit n v.a. exponentielles indépendantes avec paramètres de fréquence $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, alors :

$$\Pr(X_i = \min(X_1, \dots, X_n) = \frac{\lambda_i}{\sum_{i=1}^n \lambda_i}$$

Sixième partie Séries chronologiques