

10_2Q2

David Beauchemin

30 novembre 2017

10.2Q.2

a)

i)

$$\begin{aligned} F_{X_1, X_2}(X_1, X_2) &= P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) \\ &= P(F_{X_1}^{-1}(U_1) \leq x_1, F_{X_2}^{-1}(U_2) \leq x_2) \\ &= P(U_1 \leq F_{X_1}(x_1), U_2 \leq F_{X_2}(x_2)) \\ &= C_{\alpha}^{Clayton}(F_{X_1}(x_1), F_{X_2}(x_2)) \end{aligned}$$

ii)

```
alpha <- 5
densityCopule <- function(u1, u2) {
  (u1 ^ (-alpha) + u2 ^ (-alpha) - 1) ^ (-1 / alpha)
}
FXX <- function(x1, x2) {
  densityCopule(pexp(x1, 1 / 100), plnorm(x2, log(100) - 0.32, 0.8))
}
FXX(100, 100)
```

```
## [1] 0.566258
```

```
FXX(200, 100)
```

```
## [1] 0.6396749
```

```
FXX(100, 300)
```

```
## [1] 0.6294209
```

b)

$$\begin{aligned} F_{X_1, X_2}(X_1, X_2) &= P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) \\ &= P(F_{X_1}^{-1}(U_1) \leq x_1, F_{X_2}^{-1}(1 - U_2) \leq x_2) \\ &= P(U_1 \leq F_{X_1}(x_1), 1 - U_2 \leq F_{X_2}(x_2)) \\ &= P(U_1 \leq F_{X_1}(x_1), U_2 > 1 - F_{X_2}(x_2)) \\ &= P(U_1 \leq F_{X_1}(x_1), U_2 > \overline{F}_{X_2}(x_2)) \\ &= 1 - \overline{F}_{X_2}(x_2) - C_{\alpha}^{Clayton}(F_{X_1}(x_1), \overline{F}_{X_2}(x_2)) \end{aligned}$$

ii)

```
FXX <- function(x1, x2) {  
  1 - pexp(x1, 1 / 100, lower.tail = FALSE) - densityCopule(pexp(x1, 1 / 100), 1 -  
    plnorm(x2, log(100) - 0.32, 0.8))  
}  
FXX(100, 100)  
  
## [1] 0.2904496  
FXX(200, 100)  
  
## [1] 0.5204432  
FXX(100, 300)  
  
## [1] 0.5940282
```

c)

$$\begin{aligned} F_{X_1, X_2}(X_1, X_2) &= P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) \\ &= P(F_{X_1}^{-1}(1 - U_1) \leq x_1, F_{X_2}^{-1}(U_2) \leq x_2) \\ &= P(1 - U_1 \leq F_{X_1}(x_1), U_2 \leq F_{X_2}(x_2)) \\ &= P(U_1 > 1 - F_{X_1}(x_1), U_2 \leq F_{X_2}(x_2)) \\ &= P(U_1 > \bar{F}_{X_1}(x_1), U_2 \leq F_{X_2}(x_2)) \\ &= 1 - \bar{F}_{X_1}(x_1) - C_{\alpha}^{Clayton}(\bar{F}_{X_1}(x_1), F_{X_2}(x_2)) \end{aligned}$$

ii)

```
FXX <- function(x1, x2) {  
  1 - (1 - plnorm(x2, log(100) - 0.32, 0.8)) - densityCopule(pexp(x1, 1 /  
    100, lower.tail = FALSE),  
    plnorm(x2, log(100) - 0.32, 0.8))  
}  
FXX(100, 100)  
  
## [1] 0.2910432  
FXX(200, 100)  
  
## [1] 0.5200954  
FXX(100, 300)  
  
## [1] 0.5941343
```

d)

$$\begin{aligned} F_{X_1, X_2}(X_1, X_2) &= P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) \\ &= P(F_{X_1}^{-1}(1 - U_1) \leq x_1, F_{X_2}^{-1}(U_2) \leq x_2) \\ &= P(1 - U_1 \leq F_{X_1}(x_1), 1 - U_2 \leq F_{X_2}(x_2)) \\ &= P(U_1 > 1 - F_{X_1}(x_1), U_2 > 1 - F_{X_2}(x_2)) \\ &= P(U_1 > \bar{F}_{X_1}(x_1), U_2 > \bar{F}_{X_2}(x_2)) \\ &= 1 - \bar{F}_{X_1}(x_1)\bar{F}_{X_2}(x_2) + C_{\alpha}^{Clayton}(\bar{F}_{X_1}(x_1), \bar{F}_{X_2}(x_2)) \end{aligned}$$

ii)

```
FXX <- function(x1, x2) {  
  1 - (1 - plnorm(x2, log(100) - 0.32, 0.8)) - pexp(x1, 1 / 100, lower.tail = FALSE) +  
  densityCopule(pexp(x1, 1 /  
    100, lower.tail = FALSE),  
    plnorm(x2, log(100) - 0.32, 0.8))  
}  
FXX(100, 100)  
  
## [1] 0.6519209  
FXX(200, 100)  
  
## [1] 0.6554128  
FXX(100, 300)  
  
## [1] 0.9618015
```