

$V^{(1)}_{n,p} = \sum_j c_j\, e^{i\pi n \phi_j/4}\, e^{iz_j t_p}$ (modes → time, occupied: f in c_j)
$g_q(t_p)$
n_8 n_7 n_6 n_5 n_4 n_3 n_2 n_1
p (dimension N_t)
q_1 q_2 q_3 q_4 q_5 q_6 q_7 q_8 q_9 q_{10}
$\hat{g}_{q,n}$
$\delta_{pp'p''}\,\varpi_p$
$\Lambda_{p,k} = e^{i w_k t_p}$: time → output on C_μ (bits of k)
adder
Q_1 Q_2 Q_3 Q_4 Q_5 Q_6 Q_7 Q_8 Q_9 Q_{10}
copy tensor: pointwise product in t, no core
k_9 k_8 k_7 k_6 k_5 k_4 k_3 k_2 k_1
q'_1 q'_2 q'_3 q'_4 q'_5 q'_6 q'_7 q'_8 q'_9 q'_{10}
$\hat{g}_{q',n}$
$\bar{g}_{q'}(t_p)$
n_8 n_7 n_6 n_5 n_4 n_3 n_2 n_1
p (dimension N_t)
$V^{(2)}_{n,p} = \sum_m d_m\, e^{i\pi n \phi_m/4}\, e^{-iz_m t_p}$ (modes → time)