

INFORMAÇÕES ACERCA DAS DOENÇAS TROPICAIS DA AMAZÔNIA LEGAL

Números ao lado da doença: números de notificações de 2018 em diante, os quais foram retirados do tabnet datasus.

Acre (AC) (<https://observatorio.saude.ac.gov.br/boletins/>)

1- Dengue: (66.962)

Como evitar adquirir?

- Eliminar água parada, onde o mosquito deposita seus ovos: Tampe caixas d'água e reservatórios, esvazie pratos de vasos de plantas ou coloque areia até a borda, descarte pneus, garrafas, latas e outros recipientes que possam acumular água.
- Evitar picadas do mosquito: Utilize repelentes, use roupas de mangas compridas e calças, principalmente durante o dia, instale telas em portas e janelas e, quando possível, utilize mosquiteiros.
- Manter o ambiente limpo: feche bem lixeiras, limpe quintais e terrenos, evite o acúmulo de objetos que possam reter água da chuva.
- Vacinação

Como reconhecer?

- Sintomas mais leves: Febre alta (38,5–40 °C), de início súbito, dor de cabeça intensa, dor atrás dos olhos (dor retro-orbitária), dores musculares e articulares intensas, cansaço e fraqueza, náuseas e vômitos, manchas vermelhas na pele (exantema), às vezes, causar coceira, perda do apetite.
- Sinais de alerta (indicam risco de dengue grave, esses sintomas costumam aparecer quando a febre começa a diminuir e exigem atendimento médico imediato): dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento pelo nariz, gengivas ou presença de sangue nas fezes ou vômitos, sonolência excessiva, irritabilidade ou confusão, dificuldade para respirar, pele fria, pálida ou úmida, tontura ou desmaio, diminuição da quantidade de urina.

Como tratar?

- Procure uma UBS (unidade básica de saúde) ou uma URAP (unidade de referência em atenção primária) e faça o que médico te recomendar, e além disso:
- Beba muita água
- Mantenha-se em repouso

2- Zika Vírus (4.616)

Como evitar adquirir?

- Proteção Individual Contra Picadas: Utilize repelentes, roupas adequadas, como calças e blusas de mangas compridas, barreira físicas, como telas de proteção em portas e janelas, instale mosquiteiros sobre a cama ou utilize ambientes com ar-condicionado.

- Eliminação de Criadouros do Mosquito: mantenha caixas d'água, tonéis e barris completamente tampados, mantenha lixeiras sempre fechadas, armazene potes virados para baixo para não acumular água, guarde pneus velhos em locais cobertos ou entregue-os aos serviços de limpeza urbana.
- Prevenção de Transmissão Sexual: o vírus Zika também pode ser transmitido por meio de relações sexuais e permanecer no sêmen por várias semanas após a infecção. O uso de preservativo é a forma mais segura de evitar essa via de transmissão

Como reconhecer?

Febre baixa (geralmente abaixo de 38,5°C), manchas vermelhas na pele (que coçam muito), dores nas articulações (principalmente nas mãos e pés, olhos vermelhos (conjuntivite sem secreção), dor de cabeça, dores musculares

Os sintomas costumam durar de 2 a 7 dias. Muitas pessoas infectadas não apresentam nenhum sinal da doença.

Como tratar?

- Procure uma unidade de saúde e faça o que o médico lhe recomendar
- Beba muita água e se alimente bem
- Repouse
- Não se auto medique

3- Leishmaniose (tegumentar e visceral): (6.633)

Como evitar adquirir?

- Evite a picada do mosquito-palha: utilize repelentes na pele exposta, principalmente ao entardecer e durante a noite, quando o mosquito é mais ativo, use roupas de mangas compridas, calças e meias ao permanecer em áreas de risco, durma sob mosquiteiros, especialmente em regiões endêmicas, instale telas em portas e janelas para impedir a entrada do inseto.
- Mantenha o ambiente limpo, evite acúmulo de lixo orgânico, faça poda da vegetação muito densa próxima à casa.
- Proteja os cães, os cães são importantes reservatórios da leishmaniose visceral em áreas urbanas, então: uso de coleiras impregnadas com inseticida específicas para leishmaniose, consultas veterinárias regulares, vacinação, quando indicada pelo médico-veterinário e disponível na região.
- Tenha cuidado em áreas de risco: evite permanecer em áreas de mata ao anoitecer, reforce o uso de repelentes durante atividades ao ar livre.

Quem tem maior risco?

- Pessoas que vivem ou trabalham em áreas rurais ou de mata.
- Moradores de regiões endêmicas.
- Trabalhadores rurais, militares, ecoturistas e pesquisadores de campo.

Como reconhecer?

Na leishmaniose tegumentar, os principais sintomas são: ferida na pele que geralmente não dói e cicatriza com dificuldade, úlcera com bordas elevadas e fundo avermelhado ou granuloso, surgimento de uma ou mais lesões na pele, ínguas (gânglios aumentados) próximas à lesão. Quando atinge as mucosas obstrução nasal, sangramentos pelo nariz, feridas na boca ou nariz.

Na leishmaniose visceral: Febre prolongada (geralmente por mais de duas semanas), cansaço intenso e fraqueza, perda de peso, falta de apetite, palidez devido à anemia, aumento do baço (abdômen fica inchado), aumento do fígado, infecções frequentes, sangramentos pelo nariz ou gengivas em casos avançados.

Como tratar?

- Procure atendimento médico em uma UBS, ou a fundação de Tecnologia e Saúde do Acre (Fundhacre) em Rio Branco e faça o que o profissional recomendar
- Cuide da ferida, mantenha seca, evite coçar
- Tenha cuidados com o corpo: beba muita água, alimente-se bem e monitore os sintomas

4- Leptospirose: (1.113)

Como evitar adquirir?

Evite andar descalço em áreas alagadas ou com lama, use botas e luvas ao limpar enchentes, esgotos ou terrenos úmidos, mantenha alimentos e água armazenados em recipientes fechados, elimine a presença de ratos em casa e controle nos arredores, descarte o lixo corretamente e mantenha quintais limpos, tampe caixas d'água e mantenha o saneamento adequado, após contato com água de enchente, lave bem o corpo com água e sabão.

Como reconhecer?

Após exposição a enchentes ou locais contaminados, procure atendimento médico se surgirem: febre alta, dor de cabeça, dores musculares (principalmente nas panturrilhas), náuseas ou vômitos, olhos avermelhados, pele ou olhos amarelados (icterícia)

Como tratar?

- Procure atendimento médico em uma UBS ou UPA (em caso de febre alta) e faça o que o profissional lhe recomendar
- Beba água
- Repouse
- Evite anti inflamatório

Amapá (AP)

1- Malária: (21)

Como evitar adquirir?

- Evite picadas do mosquito, o *Anopheles* costuma picar principalmente do entardecer ao amanhecer, é importante: Usar repelentes registrados pela Anvisa nas áreas expostas da pele, vestir roupas de mangas compridas, calças e meias ao anoitecer, dormir sob mosquiteiros, preferencialmente impregnados com inseticida, em áreas de risco, instalar telas em portas e janelas, quando possível, evite permanecer próximo a rios, igarapés e áreas de mata durante os horários de maior atividade do mosquito.
- Se for viajar para uma área com transmissão de malária: informe-se previamente sobre o risco da região, leve repelente e roupas adequadas.

Como reconhecer?

- Principais sintomas da malária: febre alta, geralmente intermitente, calafrios intensos, frequentemente seguidos de tremores, sudorese intensa após a febre, dor de cabeça, dores musculares e no corpo, cansaço intenso e fraqueza, náuseas e vômitos, perda do apetite, mal-estar geral.
- Em muitos pacientes, a crise de malária ocorre em três fases:
 1. Calafrios e tremores intensos.
 2. Febre alta, que pode ultrapassar 39 °C.
 3. Sudorese intensa, seguida de queda da temperatura e sensação de alívio.
- Sinais de gravidade: Alteração do nível de consciência ou confusão, convulsões, dificuldade para respirar, icterícia (pele e olhos amarelados), urina escura, sangramentos, fraqueza extrema ou incapacidade de se alimentar, diminuição da quantidade de urina.

Como tratar?

- Procure uma unidade de saúde e faça o que o médico lhe recomendar
- Beba muita água para manter-se hidratado
- Se alimente bem
- Mantenha-se em repouso

2- Dengue: (16.272)

Como evitar adquirir?

- Eliminar água parada, onde o mosquito deposita seus ovos: Tampe caixas d'água e reservatórios, esvazie pratos de vasos de plantas ou coloque areia até a borda, descarte pneus, garrafas, latas e outros recipientes que possam acumular água.
- Evitar picadas do mosquito: Utilize repelentes, use roupas de mangas compridas e calças, principalmente durante o dia, instale telas em portas e janelas e, quando possível, utilize mosquiteiros.
- Manter o ambiente limpo: feche bem lixeiras, limpe quintais e terrenos, evite o acúmulo de objetos que possam reter água da chuva.
- Vacinação

Como reconhecer?

- Sintomas mais leves: Febre alta (38,5–40 °C), de início súbito, dor de cabeça intensa, dor atrás dos olhos (dor retro-orbitária), dores musculares e articulares intensas, cansaço e fraqueza, náuseas e vômitos, manchas vermelhas na pele (exantema), às vezes, causar coceira, perda do apetite.

- Sinais de alerta (indicam risco de dengue grave, esses sintomas costumam aparecer quando a febre começa a diminuir e exigem atendimento médico imediato): dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento pelo nariz, gengivas ou presença de sangue nas fezes ou vômitos, sonolência excessiva, irritabilidade ou confusão, dificuldade para respirar, pele fria, pálida ou úmida, tontura ou desmaio, diminuição da quantidade de urina.

Como tratar?

- Procure uma unidade de saúde e faça o que médico te recomendar, e além disso:
- Beba muita água
- Mantenha-se em repouso

3- Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA)(4.496)

Como evitar adquirir?

- Proteção Individual: Use repelentes de insetos na pele ao frequentar áreas de mata ou rurais, dê preferência a camisas de manga comprida, calças compridas e calçados fechados.
- Barreiras Físicas: Instale telas de malha fina em portas e janelas, e utilize mosquiteiros ao dormir.
- Cuidados nos Horários de Pico: Evite atividades ao ar livre (como banhos de rio ou incursões em matas) ao amanhecer e ao entardecer, períodos em que o mosquito-palha é mais ativo.
- Manejo Ambiental: Mantenha quintais e arredores das residências limpos
- Destino do Lixo: Descarte adequadamente o lixo orgânico para evitar a aproximação de animais silvestres que servem de reservatórios para o parasita

Como reconhecer?

- Na leishmaniose tegumentar, os principais sintomas são: ferida na pele que geralmente não dói e cicatriza com dificuldade, úlcera com bordas elevadas e fundo avermelhado ou granuloso, surgimento de uma ou mais lesões na pele, ínguas (gânglios aumentados) próximas à lesão.
- Quando atinge as mucosas gera:obstrução nasal, sangramentos pelo nariz, feridas na boca ou nariz.

Como tratar?

- Procure atendimento médico em alguma unidade de saúde, em Macapá, procure o Centro de Referência em Doenças Tropicais (CRDT)

4- Doença de Chagas (54)

Como evitar adquirir?

- Prevenção por Higiene Alimentar (Transmissão Oral, o parasita pode estar nas fezes do inseto trituradas junto com alimentos): higienize muito bem alimentos crus com água tratada. Tenha atenção aos sucos e polpas: o risco é maior com a ingestão de açaí e bacaba artesanais, verifique a procedência e consuma apenas produtos

pasteurizados ou inspecionados. Armazenamento: Mantenha os alimentos sempre em recipientes fechados.

- Controle do Inseto "Barbeiro" (Transmissão Vetorial): Proteja sua casa: Instale telas de proteção em portas e janelas e tampe buracos e frestas nas paredes. Mantenha o ambiente limpo: Evite acumular entulhos, madeiras ou telhas no quintal. Limpe frequentemente atrás de móveis e embaixo de colchões. Não esmague o inseto: Se avistar um barbeiro, não o amasse ou bata com as mãos desprotegidas. Use uma luva ou saco plástico para capturá-lo e o leve intacto à unidade de saúde para análise.
- Outras Formas de Transmissão: durante a gestação: Mulheres que planejam engravidar ou estão no pré-natal devem realizar o teste para evitar a transmissão ao bebê.

Como reconhecer?

Febre prolongada, cansaço intenso, dor de cabeça e dores no corpo, inchaço de uma pálpebra (sinal de Romaña), inchaço no local da entrada do parasita (chagoma), aumento dos linfonodos ("ínguas")

Nas fases mais avançadas, podem surgir: palpitações e falta de ar, dor no peito, dificuldade para engolir, prisão de ventre intensa e persistente, inchaço nas pernas (em casos de insuficiência cardíaca)

Como tratar?

Procure atendimento médico e faça o que o profissional lhe recomendar

5- Leptospirose (325)

Como evitar adquirir?

Evite andar descalço em áreas alagadas ou com lama, use botas e luvas ao limpar enchentes, esgotos ou terrenos úmidos, mantenha alimentos e água armazenados em recipientes fechados, elimine a presença de ratos em casa e controle nos arredores, descarte o lixo corretamente e mantenha quintais limpos, tampe caixas d'água e mantenha o saneamento adequado, após contato com água de enchente, lave bem o corpo com água e sabão.

Como reconhecer?

Após exposição a enchentes ou locais contaminados, procure atendimento médico se surgirem: febre alta, dor de cabeça, dores musculares (principalmente nas panturrilhas), náuseas ou vômitos, olhos avermelhados, pele ou olhos amarelados (icterícia)

Como tratar?

- Procure atendimento médico em uma UBS ou UPA (em caso de febre alta) e faça o que o profissional lhe recomendar

- Beba água
- Repouse
- Evite anti inflamatório

Amazonas (AM)

Maranhão (MA)

Mato Grosso (MT)

Pará (PA)

Rondônia (RO)

Roraima (RR)

Tocantins (TO)