## Теменная доля

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Lobus Теменная доля (лат. parietalis) образование в коре большого мозга (Cortex cerebri). Спереди ограничена центральной бороздой, сзади — теменно-затылочной бороздой parietooccipitalis) и линией, проводится от конца теменно-затылочной борозды к концу верхней височной борозды temporalis superior).

## Функции Lobus parietalis

Теменная доля играет важную роль в анализе пространства.

## Поражения Lobus parietalis

- Апраксия теменного типа (пространственная апраксия). Сущность дефекта заключается в том, что нарушается пространственный компонент действия.
- Семантическая афазия для выявления заболевания больному задают вопросы типа: «картина на стене или стена на картине?», «стол под стулом или стул под
  - столом?» и т. д. Более сложные вопросы касаются отношений между людьми. Например: «кто старше мамина дочка или дочкина мама?». Больные либо затрудняются дать правильный ответ, либо говорят, что это одно и то же.
- <u>Акалькулия</u> (акалькуляция) расстройство счёта. Счёт в уме представляет собой символическую операцию. Она производится в <u>левом полушарии мозга</u> в области затылочно-теменного стыка.
- Алексия расстройство чтения. Возникает из-за поражения затылочно-теменного стыка.
- 1. Parietal lobe // Foundational Model of Anatomy (http://purl.org/sig/ont/fma/fma61826)

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Теменная доля&oldid=112284551



Эта страница в последний раз была отредактирована 9 февраля 2021 в 23:20.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.