Introducción a la Genómica UNAL nov 2017

Alejandro Caceres ISGlobal, Barcelona

October 11, 2017

Genómica

Estudio de la bioloía del genoma

- Estructura
 - Variantes estructurales: SNPs, detetions, translocaciones, CNVs, inversiones, etc
 - ► Topologa: Regulacion de la chromatina, Topological association domains(TADs), etc
- Función
 - Regulación de la expresión génica
 - Regulación de la microRNA
 - Productor moleculares del genoma
- Effectos sobre otros niveles biológicos de interés
 - ▶ Rol del genoma en funciones fisiologicas
 - Rol del genoma en diferencias (heredables) entre individuos
 - ▶ Rol del genoma en la adaptacion de individuos a su ambiente
 - Rol del genoma en la evolucion


Genómica

La bioloía del genoma también incluye interacciones

- Cómo la estructura determina función
- Cómo la estructura determina las characteristicas heredables
- Cómo la estructura influye en la adaptación
- Cómo se interaccionan differentes estructuras para ...
- Cómo se interaccionan differentes funciones para ...

- Los SNPs son una variante structural a nivel nucleotídico.
- ▶ La tecnología de microarrays permite genotipar miles de individuos en millones de SNPs

SNP (Single Nucleotide Polymorphism)





- ► cubren el genoma (1 SNP/Kb se distribuyen uniformemente)
- son la variante estructural mas común
- en total acumulan gran cantidad de variabilidad genética

Su estudio a nivel individual, local y global es esencial para entender procesos genmicos

Como estructura:

- si affectan función: eQTLs (expresión), mQTLs (metilación)
- si estan relacionados con enfermedades heredables: SNPs de riezgo
- o pueden estar bajo presiones evolutivas
- ▶ o pueden no hacer nada ... (mendelian randomization)

Propiedades:

- Mutaciones Mendelianas
- ► Taza de mutación 10⁸ generaciones
- Sometidos a deriva genética, selección o migración

Estructura local

- Están sometidos a recombinacin
- Que dos SNPs recombinene depende de su distancia
- Por tanto SNPs locales estan correlacionados

Correlación entre SNPs

Estructura local

- Están sometidos a recombinacin
- Que dos SNPs recombinene depende de su distancia
- ▶ Por tanto SNPs locales estan correlacionados

LD

Estructura local Correlación o Linkage Disequilibrium entre SNPs se mide con

	Α	Т	Total
С	XCA	XCT	90
A	XAA	X_{AT}	q_A
Total	p_A	рт	1

Lo que se desvan las casillas de la asociación por azar:

$$D = p_A * q_C - x_{CA} \circ D = -p_C * q_T + x_{CT}, ...$$

LD

SNPs se genotipan individualmente por lo que la fase se pierde!

	A/A=0	A/T=1	T/T=2	Total
C/C=0	<i>y</i> 00	<i>y</i> 01	<i>y</i> 02	q_0^2
C/A=1	<i>y</i> 10	<i>y</i> 11	<i>y</i> 12	$2 * q_0 * q_1$
A/A=2	<i>y</i> 20	<i>y</i> 21	<i>y</i> 22	q_1^2
Total	p_0^2	$2 * p_0 * p_1$	p_{1}^{2}	1

$$x_{CA} = 2 * y_{00} + y_{01} + y_{10} + n * y_{11}, n$$
?

Fase

Un sujetos en y₁₁ puede ser

SNP1 SNP2

chr1: C - A (Sí está en
$$x_{CA}$$
)

chr2: A - T o


chr1: C - T (No está en x_{CA})

chr2: A - A

Si se conoce la fase se conocen los haplotipos, regiones donde el LD es alto


Regiones con LD alto

Las regiones con LD alto dependen de la ancestría. r^2 es una medida normalizada de D. $r^2 = D^2/(p_A*p_T*q_C*q_A)$




LD con distancia

La recombinación disminuye el LD y aumenta con la distancia entre SNPs. Hay regiones con muchos SNPs que tienen LD alto entre ellos



Esas regiones forman haplotipos frequentes: macroestructuras de SNPs correlacionados.



Los haplotipos son la principal estructura que generan los SNPs Son indicativos de

- historia evolutiva: haplotipos en EU son mas grandes que en AF
- patrones especificos de recombinacion: Diferencias en hotspots
- presencia de otros variantes etructurales que repimen la recombinación.

"Si se conocen los haplotipos mas frecuentes de una población entonces pocos SNPs pueden taggear los haplotipos"

```
a SNPs
   Chromosome 1
                 AACACGCCA.... TTCGGGGTC.... AGTCGACCG....
   Chromosome 2
   Chromosome 3
b Haplotypes
                 Haplotype 1
                 Haplotype 2
                 Haplotype 3
                 Haplotype 4
e Tag SNPs
```

Si tenemos los haplotipos de referencia de una población

- Podemos predecir los SNPs no genotipados (imputar)
- Podemos encontrar una asociacion funcional en regiones alrededor de un SNP causal
- No hay que genotiparlos todos los SNPs

sin embargo

- no tendremos infomación sobre variantes mas raras u específicas
- cada población tiene una historia evolutiva diferente

Técnicas de genotipación

Secuenciación


- los SNPs son variantes estructurales por lo que la secuenciacin es mtodo ideal
- es cara y estudios de cohortes son hoy en dia impensables

hibridación

- se pueden sintetizar millones de sondas fluoresentes y ponerlas en un chip (miroarrays)
- es barato y se puede hacer en miles de individuos
- hay que conocer que sondas hay que poner
- las sondas dependen de una población de referencia
- no es un metodo para descubrir variantes desconocidas

microarrays


SNP genotyping via direct hybridization



cada punto es una sonda y el color e intensidad de la luz emitida determina si una muestra hiridizó

microarrays

cada sujeto tiene una intensidad for cada alelo(A y B)




entre menos varianza en angulo entre los grupos mejor es la genotipacion del SNP

- B-allelefreq: la intensidad relativa del allelo B respecto al A (angulo)
- log2ratio: la intensidad de la observación respecto al grupo (magnitud)

microarrays

SNP arrays como medida indirecta de otros variantes estructurales



- ► B-allelefreq: si un individuo esta entre dos clusters puede que tenda dos genotipos en sus celulas (Mosaicismos)
- log2ratio: mas intensidad es indicativo de mas copias de un allelo (CNVs)



GenomeStudio

Es el software de Illumina para hacer el genotipado de los SNPs (clustering)



- produce los genotipos en formato PLINK
- datos de B-allele freq y log2ratio son útiles para el gentipado de mosaicismos y CNVs (no lo hace GenomeStudio)

Genome-wide SNPs

SNPs genome-wide: barrido genomico con alguna resolución objetivo: determinar a que cromosoma de un individuo corresponde cada alelo

sequencia: ensamblar los reads

microarrays: fasearlos

Trios

Los datos de trios ayudan a resolver la fase


hijo chr padre: hijo chr madre:	SNP1 C C	-	SNP2 A/T A/T	-	SNP3 G G	-	SNP4 G/A G/A
padre chr1: padre chr2:	C/A C/A	- -	T T	- -		- -	G/A G/A
madre chr1: madre chr2:	C C	-	A/T A/T	-	G G	-	G/A G/A
común chr: menos común chr	C C	-	T T	-	G G	-	G A

Recordemos: Si tenemos los haplotipos de referencia de una población

- Podemos predecir los SNPs no genotipados (imputar)
- Podemos encontrar una asociacion funcional en regiones alrededor de un SNP causal
- ► No hay que genotiparlos todos los SNPs es una estimación de la varuiabilidad genética de la población

HAPMAP

Un proyecto de libre acceso a los datos



publicó los últimos datos (fase III) en el 2009. Loa datos están accesibles en formato PLINK.

HAPMAP

HapMap II

- 30 tríos (padres e hijo) de Nigeria.
- 30 tríos de Estados Unidos de origen europeo.
- ▶ 44 individuos sin relación genética de Japón (Tokio).
- 45 individuos sin parentesco de China (Peking).

HapMap III

- se extendio a 11 poblaciones diferentes inlcuyendo mas africanos, indios y mexicanos.
- Abarca unos 2 Millones de SNPs

1000 genomes



1000 Genomas

Rápidamente HapMap fue remplazado por los 1000 Genomas

- secuenciación de 1092 individuos
- 26 poblaciones
- 36 Millones de SNPs
- los datos están accesibles en formato VCF
- están integrados con el Genome Browser

1000 Genomes



Datos publicados el 2012

Otros proyectos

- ▶ 100 000 Genomes lanzado el 2014 (UK)
- ► Simons genome diversity proyect 300 individuos de 142 poblaciones lanzado 2016
- ▶ The haplotye reference consortium

The haplotye reference consortium

- ▶ 100 000 Genomes lanzado el 2014 (UK)
- ➤ Simons genome diversity proyect 300 individuos de 142 poblaciones lanzado 2016
- ► The haplotye reference consortium 64,976 individuos 39Millones de SNPs

The haplotye reference consortium



Datos publicados el 2012

Haplotipos de referencia

Una vez identificados los haplotipos de referencia

- variabilidda genética de la población
- frecuencia de alelos funcionales
- frecuencia de alelos de riezgo

Variabilidad genética

La variabilidad génetica dada por los haplotipos de referencia contribuye a determinar:

- la especificidad y frequencia de haplotipos
- medidas globales de heterocigocidad
- medidas globales de fijacion (FST)
- patrones de recombiación
- la presencia de otras variantes genéticas (CNVs, mosaicismos o inversiones)

Variabilidad genética

estudios comparativos permite estudiar

- la distancia genética a otras poblaciones
- evidencia de selección en regiones particulares
- evidencia de patrones de migracion y mestizage

Variabilidad genética


estudios comparativos permite estudiar

- la distancia genética a otras poblaciones
- evidencia de selección en regiones particulares
- evidencia de patrones de migración y mestizage

Tener un panel de referencia permite


- estimar las frecuencias que se esperan en la población general
- tener un grupo "control
- estudiar el contexto genético de los efectos de un SNP de riezgo
- integrar estudios de asociacion genética (imputación)

Los GWAS pretenden encontrar los SNPs de riezgo a una enfermedad (característica heredable)




Se basan en la hipotesis de que enfermedades comumunes pueden ser explicadas por variantes comunes

Los GWAS pretenden encontrar los SNPs de riezgo a una enfermedad (característica heredable)




Se basan en la hipótesis de que enfermedades comumunes pueden ser explicadas por variantes comunes

Hay miles de estudios reportados



Cromosomes amb variants de risc per diverses patologies identificades per GWAS Chromosomes with risk variants for several pathologies identified by GWAS

Se encuentran muchos efectos pequeos aditivos por lo que es necesario grandes estudios



- 298,420 sujetos para sintomas de bienestar
- ▶ 161,460 sujetos para sintomas de depresión
- ▶ 170,910 sujetos para sintomas de neuroticismo

Cada cohorte tiene unos datos de SNPs particulares, difrente densidad de SNPs.

- la imputación de los datos es necesaria para integrar las cohortes
- la imputación depende de los haplotipos de referencia

Haplotipos de referencia Colombianos

Variabilidad genética

- estructura de los haplotipos por regiones
- diferencias con haplotipos en otras poblaciones globales
- estructura de los haplotipos mestizos
- haplotipos indigenas
- los puntos de recombinación son facilmente identificables
- effectos de migración
- seales de selección
- frequencia de otros variantes estructurales

Haplotipos de referencia Colombianos

A nivel de SNPs

- ▶ frecuencia de SNPs de riezgo en población general
- effectos de SNPs en un contexto de mestizage
- cambios funcionales.
- cambios de riezgo a enfermedades
- effecto en la interaccion entre SNPs (epistasis)

Haplotipos de referencia Colombianos

imputación

- como se efecta la imputación al tener haplotipos mestizos
- ▶ como afecta el faseado al tener una población mestiza
- ▶ los heplotipos del los 1000 genomas son representativos?