

Proyecto de Minería de Datos

Portada

- **Nombre del Analista:** Alejandro Borrego Megías
- **Fecha:** 24-12-2023
- **Correo Electrónico:** alejbormeg@gmail.com

Índice

- 1. Introducción al objetivo del problema y las variables implicadas.
- 2. Importación del conjunto de datos y asignación correcta de los tipos de variables.
- 3. Análisis descriptivo del conjunto de datos.
 - 3.1 Número de observaciones
 - 3.2 Número y naturaleza de variables
 - 3.3 Datos erróneos, etc.
- 4. Corrección de los errores detectados.
- 5. Análisis de valores atípicos.
 - 5.1 Decisiones tomadas.
- 6. Análisis de valores perdidos.
 - 6.1 Estrategias de imputación.
- 7. Transformaciones de variables y relaciones con las variables objetivo.
- 8. Detección de las relaciones entre las variables input y objetivo.
- 9. Construcción del modelo de regresión lineal.
 - 9.1 Selección de variables clásica
 - 9.2 Selección de variables aleatoria
 - 9.3 Selección del modelo ganador
 - 9.4 Interpretación de los coeficientes de dos variables incluidas en el modelo (una binaria y otra continua)
 - 9.5 Justificación del mejor modelo y medición de la calidad del mismo
- 10. Construcción del modelo de regresión logística.
 - 10.1 Selección de variables clásica
 - 10.2 Selección de variables aleatoria
 - 10.3 Selección del modelo ganador
 - 10.4 Determinación del punto de corte óptimo
 - 10.5 Interpretación de los coeficientes de dos variables incluidas en el modelo (una binaria y otra continua)
 - 10.6 Justificación del mejor modelo y medición de la calidad del mismo

1. Introducción al objetivo del problema y las variables implicadas.

En el marco de la investigación y análisis demográfico y político, se aborda el desafío de comprender y prever los patrones de abstención en las elecciones municipales en España. La abstención electoral, medida a través del porcentaje de abstención, es una variable crucial que refleja la participación ciudadana en el proceso democrático.

El conjunto de datos utilizado, denominado "DatosEleccionesEspaña.xlsx", contiene información demográfica detallada sobre los municipios de España, así como los resultados de las últimas elecciones. Este conjunto incluye variables que abarcan desde características poblacionales hasta resultados de votación, proporcionando una visión integral de los factores que podrían influir en la abstención.

El objetivo principal de este análisis es desarrollar dos modelos predictivos: uno de regresión lineal para predecir el porcentaje de abstención y otro de regresión logística para prever la probabilidad de una alta abstención. Estos modelos tienen el propósito de identificar patrones y relaciones significativas entre las diversas variables demográficas y los resultados electorales, lo que podría ayudar a comprender mejor los factores que afectan la participación electoral.

Las variables consideradas serán las siguientes:

Variable	Descripción
Name	Nombre del municipio
CodigoProvincia	Código de la provincia (coincide con los dos primeros dígitos del código postal). Toma 52 valores distintos
CCAA	Comunidad autónoma a la que pertenece el municipio
Population	Población del municipio en 2016
TotalCensus	Población en edad de votar en 2016
AbstencionAlta	Variable dicotómica que toma el valor 1 si el porcentaje de abstención es superior al 30%, y 0 en otro caso
AbstentionPtge	Porcentaje de abstención
Age_0-4_Ptge	Porcentaje de ciudadanos con menos de 5 años
Age_under19_Ptge	Porcentaje de ciudadanos con menos de 19 años

Variable	Descripción
Age_19_65_pct	Porcentaje de ciudadanos entre 19 y 65 años
Age_over65_pct	Porcentaje de ciudadanos con más de 65 años
WomanPopulationPtge	Porcentaje de mujeres
ForeignersPtge	Porcentaje de extranjeros
SameComAutonPtge	Porcentaje de ciudadanos que reside en la misma provincia en la que nacieron
SameComAutonDiffProvPtge	Porcentaje de ciudadanos que reside en la misma CCAA en la que nacieron, pero distinta provincia
DifComAutonPtge	Porcentaje de ciudadanos que reside en la distinta CCAA de la que nacieron
UnemployLess25_Ptge	Porcentaje de parados de menos de 25 años
Unemploy25_40_Ptge	Porcentaje de parados entre 25 y 40 años
UnemployMore40_Ptge	Porcentaje de parados de más de 40 años
AgricultureUnemploymentPtge	Porcentaje de parados en el sector de la agricultura
IndustryUnemploymentPtge	Porcentaje de parados en el sector de la industria
ConstructionUnemploymentPtge	Porcentaje de parados en el sector de la construcción
ServicesUnemploymentPtge	Porcentaje de parados en el sector servicios
totalEmpresas	Número total de empresas en el municipio
Industria	Número de empresas del sector industrial en el municipio
Construccion	Número de empresas del sector de la construcción en el municipio
ComercTTEHosteleria	Número de empresas dedicadas a comercio, transporte u hostelería en el municipio
Servicios	Número de empresas del sector servicios en el municipio
ActividadPpal	Actividad principal de las actividades del municipio (Industria, Construcción, ComercTTEHosteleria, Servicios y Otros)
inmuebles	Número de inmuebles en el municipio
Pob2010	Población en el municipio en 2010
SUPERFICIE	Superficie del municipio
densidad	Densidad de población del municipio: MuyBaja (<1 hab/ha), Baja (entre 1 y 5 hab/ha), Alta (>5 hab/ha)
PobChange_pct	Porcentaje de cambio en la población (valores negativos indican que ha disminuido). Respecto a las anteriores elecciones
PersonasInmueble	Número medio de personas que habita un inmueble
Explotaciones	Número de explotaciones agrícolas en el municipio

En última instancia, este estudio busca proporcionar información valiosa para entender los determinantes de la participación electoral en los municipios españoles, contribuyendo así a la toma de decisiones informada en el ámbito político y social.

2. Importación del conjunto de datos y asignación correcta de los tipos de variables.

La base de datos se guarda en la carpeta `src/data` y se realiza la importación del conjunto de datos con la librería `Pandas` de Python. Una vez hecho esto eliminamos las variables objetivo relacionadas con el porcentaje de Izquierda, Derecha y otros, tanto continuas como categóricas:

```
# Cargo los datos
datos = pd.read_excel('src/data/DatosEleccionesEspana.xlsx')

# Eliminamos las variables que no usaremos
variables_a_eliminar = ["Izda_Pct", "Dcha_Pct", "Otros_Pct", "Izquierda", "Derecha"]

datos = datos.drop(columns=variables_a_eliminar)
```

Comprobamos que todas las variables tienen los tipos correctos ejecutando:

```
print(datos.dtypes)
```

Obteniendo:

Name	object
CodigoProvincia	int64

CCAA	object
Population	int64
TotalCensus	int64
AbstentionPtge	float64
AbstencionAlta	int64
Age_0-4_Ptge	float64
Age_under19_Ptge	float64
Age_19_65_pct	float64
Age_over65_pct	float64
WomanPopulationPtge	float64
ForeignersPtge	float64
SameComAutonPtge	float64
SameComAutonDiffProvPtge	float64
DifComAutonPtge	float64
UnemployLess25_Ptge	float64
Unemploy25_40_Ptge	float64
UnemployMore40_Ptge	float64
AgricultureUnemploymentPtge	float64
IndustryUnemploymentPtge	float64
ConstructionUnemploymentPtge	float64
ServicesUnemploymentPtge	float64
totalEmpresas	float64
Industria	float64
Construccion	float64
ComercTTEHosteleria	float64
Servicios	float64
ActividadPpal	object
inmuebles	float64
Pob2010	float64
SUPERFICIE	float64
Densidad	object
PobChange_pct	float64
PersonasInmueble	float64
Explotaciones	int64

Como vemos, las variables categóricas (Name, CCAA, ActividadPpal, Densidad) tienen el tipo `object` correctamente, mientras que las demás son numéricas todas, algunas enteros y otras en coma flotante.

3. Análisis descriptivo del conjunto de datos.

Ejecutando `datos.shape` observamos que las dimensiones del dataframe cargado son de `(8119, 36)`, lo que implica un total de 8119 ejemplos en la base de datos y un total de 36 variables (incluyendo las variables objetivo) que analizar y limpiar.

Separamos las variables en variables numéricas y categóricas:

```
# Seleccionar las columnas numéricas del DataFrame
numericas = datos.select_dtypes(include=['int', 'int32', 'int64', 'float', 'float32', 'float64']).columns

# Seleccionar las columnas categóricas del DataFrame
categoricas = [variable for variable in variables if variable not in numericas]
```

Obtenemos un total de 32 variables numéricas y 4 categóricas. Tras esto procedemos a un análisis más exhaustivo de las distintas variables.

Análisis variables categóricas

Para las variables categóricas emplearemos la función `analizar_variables_categoricas` del fichero `src/FuncionesMineria.py`. Esta función nos devuelve para cada variable categórica el número de ocurrencias para cada categoría así como el porcentaje que representa dentro del total de datos:

```
# Frecuencias de los valores en las variables categóricas
 analisis_categoricas = analizar_variables_categoricas(datos)

print(analisis_categoricas)
```

El resultado obtenido es el siguiente:

```
{ 'Name':      n      %
  La Zarza      2  0.000246
  Sada          2  0.000246
  Castejón      2  0.000246
  Moya          2  0.000246
  Rebollar      2  0.000246
```

```

...
Navia de Suarna    1  0.000123
Muras             1  0.000123
Monterroso        1  0.000123
Monforte de Lemos 1  0.000123
Zuñeda            1  0.000123

[8102 rows x 2 columns],
'CCAA':          n          %
CastillaLeón    2248  0.276881
Cataluña        947  0.116640
CastillaMancha  919  0.113191
Andalucía       773  0.095209
Aragón          731  0.090036
ComValenciana   542  0.066757
Extremadura     387  0.047666
Galicia         314  0.038675
Navarra         272  0.033502
PaísVasco       251  0.030915
Madrid          179  0.022047
Rioja           174  0.021431
Cantabria       102  0.012563
Canarias        88  0.010839
Asturias        78  0.009607
Balears         67  0.008252
Murcia          45  0.005543
Ceuta           1  0.000123
Melilla         1  0.000123,
'ActividadPpal': n          %
Otro            4932  0.607464
ComercTTEHosteleria 2540  0.312846
Servicios       620  0.076364
Construccion    14  0.001724
Industria       13  0.001601,
'Densidad': n          %
MuyBaja        6417  0.790368
Baja           1053  0.129696
Alta           557  0.068605
?              92  0.011331
}

```

De aquí podemos extraer las siguientes conclusiones:

- La variable "Name" suele presentar una única ocurrencia por clase, a excepción de algunos municipios que presentan 2 ocurrencias, esto no se trata de duplicados pues analizando los ejemplos encontramos casos como el del municipio de La Zarza que en España existe un municipio con ese nombre en Castilla y León y en Extremadura, o Sada en Galicia y Navarra.
- La variable "CCAA" presenta clases con una gran representación en el dataset (como es el caso de Castilla y León con el 27,6% de ocurrencias) y otras con una representación muy baja como son Ceuta y Melilla con únicamente una ocurrencia (pues se tratan de ciudades autonómicas). Esto implicará en futuros procesos agrupar de alguna forma las clases poco representadas.
- La variable "ActividadPpal" presenta 5 posibles valores ("Otro", "ComercTTEHosteleria", "Servicios", "Construccion", "Industria"). Estas clases parecen correctas aunque en el caso de Construccion e Industria se encuentran poco representadas.
- La variable "Densidad" presenta 4 posibles valores ("MuyBaja", "Baja", "Alta", "?") y detectamos un error, pues para representar los valores perdidos emplean "?" lo cual va a suponer una transformación en estos datos para procesarlos correctamente.

Análisis de variables numéricas

Para el análisis de las variables numéricas ejecutamos el siguiente código:

```

# Descriptivos variables numéricas mediante función describe() de Python
descriptivos_num = datos.describe().T

# Añadimos más descriptivos a los anteriores
for num in numericas:
    descriptivos_num.loc[num, "Asimetria"] = datos[num].skew()
    descriptivos_num.loc[num, "Kurtosis"] = datos[num].kurtosis()
    descriptivos_num.loc[num, "Rango"] = np.ptp(datos[num].dropna().values)

print(descriptivos_num)

```

Obteniendo los siguientes resultados:

Variable	Count	Mean	Std	Min	25%	50%	75%	Max	Asimetria	Kurtosis	Rango
CodigoProvincia	8119.0	26.67	14.90	1.00	13.00	26.00	41.00	52.00	0.01	-1.32	51.00
Population	8119.0	5741.85	46215.20	5.00	166.00	549.00	2427.50	3141991.00	45.99	2816.86	3141986.00
TotalCensus	8119.0	4260.67	34428.89	5.00	140.00	447.00	1846.50	2363829.00	46.51	2890.84	2363824.00
AbstentionPtge	8119.0	26.51	7.54	0.00	21.68	26.43	31.48	57.58	-0.05	0.50	57.58
AbstencionAlta	8119.0	0.31	0.46	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.81	-1.34	1.00
Age_0-4_Ptge	8119.0	3.02	2.05	0.00	1.39	2.98	4.53	13.25	0.34	-0.21	13.25
Age_under19_Ptge	8119.0	13.57	6.78	0.00	8.33	13.89	19.06	33.70	-0.10	-0.79	33.70
Age_19_65_pct	8119.0	57.37	6.82	23.46	53.85	58.66	61.82	100.00	-0.81	2.16	76.54
Age_over65_pct	8119.0	29.07	11.75	0.00	19.82	27.56	36.91	76.47	0.60	0.08	76.47
WomanPopulationPtge	8119.0	47.30	4.36	11.77	45.73	48.49	50.00	72.68	-1.67	5.80	60.92
ForeignersPtge	8119.0	5.62	7.35	-8.96	1.06	3.59	8.18	71.47	2.50	11.35	80.43
SameComAutonPtge	8119.0	81.63	12.29	0.00	75.81	84.49	90.46	127.16	-1.52	3.47	127.16
SameComAutonDiffProvPtge	8119.0	4.34	6.39	0.00	0.68	2.19	5.28	67.31	3.29	14.56	67.31
DifComAutonPtge	8119.0	10.73	8.85	0.00	4.93	8.27	13.90	100.00	2.43	9.66	100.00
UnemployLess25_Ptge	8119.0	7.32	9.41	0.00	0.00	5.88	10.47	100.00	4.15	31.66	100.00
Unemploy25_40_Ptge	8119.0	37.00	20.32	0.00	28.57	39.94	46.67	100.00	0.21	1.41	100.00
UnemployMore40_Ptge	8119.0	50.18	22.80	0.00	41.67	50.00	60.04	100.00	-0.23	0.86	100.00
AgricultureUnemploymentPtge	8119.0	8.40	12.96	0.00	0.00	3.49	11.73	100.00	3.23	15.58	100.00
IndustryUnemploymentPtge	8119.0	10.01	12.53	0.00	0.00	7.14	14.29	100.00	3.09	16.05	100.00
ConstructionUnemploymentPtge	8119.0	10.84	13.28	0.00	0.00	8.33	14.29	100.00	3.09	14.62	100.00
ServicesUnemploymentPtge	8119.0	58.65	24.26	0.00	50.00	62.02	72.12	100.00	-0.81	0.80	100.00
totalEmpresas	8114.0	398.60	4219.37	0.00	7.00	30.00	147.00	299397.00	53.70	3474.99	299392.00
Industria	7931.0	23.42	158.61	0.00	0.00	0.00	14.00	10521.00	44.27	2644.34	10520.00
Construccion	7980.0	48.88	421.86	0.00	0.00	0.00	25.00	30343.00	52.58	3506.59	30343.00
ComercTTEHosteleria	8110.0	146.74	1233.02	0.00	0.00	0.00	65.00	80856.00	45.41	2649.23	80855.00
Servicios	8057.0	172.15	2446.81	0.00	0.00	0.00	40.00	177677.00	57.50	3834.08	177677.00
inmuebles	7981.0	3246.16	24314.71	6.00	180.00	486.00	1589.00	1615548.00	44.55	2645.97	1615542.00
Pob2010	8112.0	5795.81	47535.68	5.00	177.75	582.00	2483.00	3273049.00	47.17	2942.10	3273044.00
SUPERFICIE	8110.0	6214.70	9218.19	2.58	1839.19	3487.74	6893.88	175022.91	6.07	62.34	175020.33
PobChange_pct	8112.0	-4.90	10.38	-52.27	-10.40	-4.96	0.09	138.46	1.51	15.10	190.73
PersonasInmueble	7981.0	1.30	0.57	0.11	0.85	1.25	1.73	3.33	0.26	-0.63	3.22
Explotaciones	8119.0	2447.20	15062.74	1.00	22.00	52.00	137.00	99999.00	6.32	37.99	99998.00

Todos los resultados parecen estar dentro de la normalidad a excepción de:

- Para la variable "Explotaciones" el valor máximo que se indica es de 99999.00, lo cual parece incorrecto y podría estar refiriéndose a valores perdidos.
- Las variables "ForeignersPtge", "SameComAutonPtge" y "PobChange_pct" presentan valores fuera de rango, como pueden observarse en sus valores máximos.

4. Corrección de los errores detectados.

Para corregir los errores detectados ejecutamos el siguiente código:

```
# A veces los 'nan' vienen como como una cadena de caracteres, los modificamos a perdidos.
for x in categoricas:
    datos[x] = datos[x].replace('nan', np.nan)

# Missings no declarados variables cualitativas (NSNC, ?)
datos['Densidad'] = datos['Densidad'].replace('?', np.nan)

# Missings no declarados variables cuantitativas (-1, 99999)
```

```
datos['Explotaciones'] = datos['Explotaciones'].replace(99999, np.nan)

# Valores fuera de rango
datos['ForeignersPtge'] = [x if 0 <= x <= 100 else np.nan for x in datos['ForeignersPtge']]
datos['SameComAutonPtge'] = [x if 0 <= x <= 100 else np.nan for x in datos['SameComAutonPtge']]
datos['PobChange_pct'] = [x if x <= 100 else np.nan for x in datos['PobChange_pct']]
```

Con esto corregimos todos los errores detectados en variables Numéricas y categóricas y convertimos los valores extraños a valores perdidos para un posterior tratamiento de los mismos.

5. Análisis de valores atípicos.

Se realiza in recuento de los valores atípicos con la función `atipicosAmissing` del fichero `src/FuncionesMineria.py`, con dicha función, dependiendo de si la variable numérica que se analiza es simétrica o asimétrica se calculan los atípicos con la regla de la desviación típoca (si es simétrica) o con la Desviación Absoluta de la Mediana (MAD). Además se calculan posibles valores atípicos con la regla de los cuartiles. El código empleado s el siguiente:

```
# Cuento el porcentaje de atipicos de cada variable.
resultados = {x: atipicosAmissing(datos_input[x])[1] / len(datos_input) for x in numericas_input}
```

El resultado formateado es el siguiente:

Variable	Proporción de Atípicos
CodigoProvincia	0.0000
Population	0.0993
TotalCensus	0.0962
Age_0-4_Ptge	0.0000
Age_under19_Ptge	0.0000
Age_19_65_pct	0.0029
Age_over65_pct	0.0000
WomanPopulationPtge	0.0026
ForeignersPtge	0.0000
SameComAutonPtge	0.0000
SameComAutonDiffProvPtge	0.0203
DifComAutonPtge	0.0049
UnemployLess25_Ptge	0.0032
Unemploy25_40_Ptge	0.0000
UnemployMore40_Ptge	0.0000
AgricultureUnemploymentPtge	0.0200
IndustryUnemploymentPtge	0.0059
ConstructionUnemploymentPtge	0.0065
ServicesUnemploymentPtge	0.0000
totalEmpresas	0.0000
Industria	0.0000
Construccion	0.0000
ComercTTEHosteleria	0.0000
Servicios	0.0000
inmuebles	0.0000
Pob2010	0.0000
SUPERFICIE	0.0000
PobChange_pct	0.0081
PersonasInmueble	0.0000
Explotaciones	0.0000

Como podemos ver la mayoría de variables no presentan valores atípicos y las que los presentan son valores muy bajos, siendo el máximo 10% aproximadamente para la variable "Population" y "TotalCensus". Por ello resolvemos transformar todos los valores atípicos a valores perdidos con el siguiente código:

```
# Modifico los atipicos como missings
for x in numericas_input:
    datos_input[x] = atipicosAmissing(datos_input[x])[0]
```

6. Análisis de valores perdidos.

Tras las transformaciones aplicadas y el tratamiento de valores atípicos, vamos a ver el total de valores perdidos por variable. Para ello ejecutamos el siguiente código:


```
variables = list(datos.columns)
print(datos[variables].isna().sum())
```

El resultado es el siguiente:

Variable	Missing Values
CodigoProvincia	0
CCAA	0
Population	0
TotalCensus	0
AbstentionPtge	0
AbstencionAlta	0
Age_0-4_Ptge	0
Age_under19_Ptge	0
Age_19_65_pct	0
Age_over65_pct	0
WomanPopulationPtge	0
ForeignersPtge	653
SameComAutonPtge	3
SameComAutonDiffProvPtge	0
DifComAutonPtge	0
UnemployLess25_Ptge	0
Unemploy25_40_Ptge	0
UnemployMore40_Ptge	0
AgricultureUnemploymentPtge	0
IndustryUnemploymentPtge	0
ConstructionUnemploymentPtge	0
ServicesUnemploymentPtge	0
totalEmpresas	5
Industria	188
Construccion	139
ComercTTEHosteleria	9
Servicios	62
ActividadPpal	0
inmuebles	138
Pob2010	7
SUPERFICIE	9
Densidad	92

Variable	Missing Values
PobChange_pct	9
PersonasInmueble	138
Explotaciones	189

"ForeignersPtge" muestra el máximo con 653, pero ninguna variable tiene una cantidad excesiva de valores perdidos en comparación con el conjunto total.



Destacan correlaciones significativas entre algunas variables. Por ejemplo, la alta correlación de 0.97 entre "Population" y "TotalCensus" es lógica, ya que ambos representan conceptos similares en el contexto electoral, donde el censo deriva de la población local. También, la correlación perfecta de 1.0 entre "PersonasInmueble" y "Inmuebles" indica una dependencia directa entre ambas, siendo la primera derivada de la segunda.

Además, se observan relaciones notables entre sectores económicos, como la correlación de 0.82 entre "Industria" y "Construcccion," reflejando una estrecha relación sectorial. Otras correlaciones relevantes incluyen 0.85 entre "TotalEmpresas" y "Pob210," y 0.63 entre "ComercTTEHosteleria" y "Pob210," indicando posibles interacciones demográficas y económicas en el análisis territorial. Este análisis resalta conexiones sustanciales entre variables, proporcionando insights para comprender mejor la estructura de los datos y las relaciones subyacentes.

A continuación creamos una nueva variable "prop_missings" para recoger la proporción de valores perdidos por cada observación, de cara a eliminar posibles observaciones con demasiados valores perdidos (más del 50%). Para ello usamos el siguiente código:

```
datos_input['prop_missings'] = datos_input.isna().mean(axis = 1)

# Elimino las observaciones con mas de la mitad de datos missings (no hay ninguna)
eliminar = datos_input['prop_missings'] > 0.5
datos_input = datos_input[~eliminar]
varObjBin = varObjBin[~eliminar]
varObjCont = varObjCont[~eliminar]

# Transformo la nueva variable en categórica (ya que tiene pocos valores diferentes)
datos_input["prop_missings"] = datos_input["prop_missings"].astype(str)
```

Estadísticas de la nueva variable:

Número de observaciones (count): 8119.

- Media (mean): 0.014306, lo que indica que, en promedio, alrededor del 1.43% de los datos están ausentes en cada observación.
- Desviación estándar (std): 0.025718, señalando la variabilidad en la proporción de valores faltantes entre las observaciones. Valor mínimo (min): 0, ya que no hay ninguna observación sin valores faltantes.
- Primer cuartil (25%): 0, indicando que el 25% de las observaciones tienen ningún valor faltante.
- Mediana (50%): 0, denotando que la mitad de las observaciones tienen un 0% de valores faltantes.
- Tercer cuartil (75%): 0.030303, revelando que el 75% de las observaciones tienen hasta un 3.03% de valores faltantes.
- Valor máximo (max): 0.333333, que representa la proporción máxima de valores faltantes en una observación, equivalente al 33.33%

Se opta por convertirla en categórica debido a los pocos valores distintos que toma.

Imputación de valores faltantes

En el proceso de imputación de valores faltantes, se aborda tanto la imputación para variables cuantitativas como para variables cualitativas.

Variables Cuantitativas:

Para las variables cuantitativas, se evalúa la simetría de cada variable mediante su coeficiente de asimetría. Si la simetría es menor a 1, se realiza la imputación utilizando la media de la variable. En cambio, si la simetría es igual o mayor a 1, se opta por la imputación mediante la mediana. Esta distinción se basa en la forma de la distribución, buscando preservar la representatividad de los datos centrales.

El código empleado es el siguiente:

```
for x in numericas_input:
    simetria = datos_input[x].skew()
    if simetria < 1:
        datos_input[x] = ImputacionCuant(datos_input[x], 'media')
    else:
        datos_input[x] = ImputacionCuant(datos_input[x], 'mediana')

for x in categoricas_input:
    datos_input[x] = ImputacionCuali(datos_input[x], 'moda')
```

Variables Cualitativas:

En el caso de las variables cualitativas, la imputación se lleva a cabo utilizando la moda, que representa el valor más frecuente en la variable. Esta elección se fundamenta en la naturaleza discreta de las variables cualitativas y en la búsqueda de preservar la tendencia central del conjunto de datos.

Finalmente, se realiza una verificación post-imputación para asegurar que no queden valores faltantes en el conjunto de datos resultante. Este procedimiento garantiza la coherencia y completitud de la información, preparando los datos para análisis subsiguientes.

7. Transformaciones de variables y relaciones con las variables objetivo.

8. Detección de las relaciones entre las variables input y objetivo.

9. Construcción del modelo de regresión lineal.

- Selección de variables clásica
- Selección de variables aleatoria
- Selección del modelo ganador
- Interpretación de los coeficientes de dos variables incluidas en el modelo (una binaria y otra continua)
- Justificación del mejor modelo y medición de la calidad del mismo

10. Construcción del modelo de regresión logística.

- Selección de variables clásica
- Selección de variables aleatoria
- Selección del modelo ganador
- Determinación del punto de corte óptimo
- Interpretación de los coeficientes de dos variables incluidas en el modelo (una binaria y otra continua)
- Justificación del mejor modelo y medición de la calidad del mismo