

Fecha de aplicación:

04

02

2026

dd mm aaaa

Número de Identificación
del respondiente (ID):

87967456

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS TERCERA VERSIÓN



Libertad y Orden

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá



CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS – TERCERA VERSIÓN

Señale con una X la casilla que indique la frecuencia con que se le han presentado los siguientes malestares en los últimos tres meses.

Malestares	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca
1. Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.			X	
2. Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del colon.		X		
3. Problemas respiratorios.		X		
4. Dolor de cabeza.				X
5. Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche.				X
6. Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.			X	
7. Cambios fuertes del apetito.		X		
8. Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez).				X
9. Dificultad en las relaciones familiares.		X		
10. Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.	X			
11. Dificultad en las relaciones con otras personas.				X
12. Sensación de aislamiento y desinterés.			X	
13. Sentimiento de sobrecarga de trabajo.	X			
14. Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.			X	
15. Aumento en el número de accidentes de trabajo.		X		
16. Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida.	X			
17. Cansancio, tedio o desgano.			X	
18. Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.	X			
19. Deseo de no asistir al trabajo.		X		
20. Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.	X			
21. Dificultad para tomar decisiones.		X		
22. Deseo de cambiar de empleo.	X			
23. Sentimiento de soledad y miedo.	X			
24. Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.	X			
25. Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.				X
26. Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.				X
27. Sentimientos de que "no vale nada" o "no sirve para nada".		X		
28. Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.			X	
29. Sentimiento de que está perdiendo la razón.	X			
30. Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.		X		
31. Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.				X