

План питания: коксартроз 4 ст., подготовка к эндопротезированию

Мужчина 53 года · без сахара, без глютена, без молочки · 1–3 приёма пищи, без перекусов · тарелка 500 г

ПРИОРИТЕТ КАРДИОЛОГА. На ЭКГ резко выраженная нерегулярность ритма (RR 592–1334 мс), предсердная экстрасистолия, брадисистолия 56. Это требует холтера и очного заключения кардиолога. До получения заключения: никаких нагрузочных проб, никаких провокационных вмешательств, никаких разгрузочных дней, никакого голодания и никаких интервальных схем. Питание по этому плану — обычное трёхразовое, оно не является нагрузкой. Любые физические нагрузки на подготовку к операции назначает кардиолог, не нутрициолог.

1. КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1. Хряща при 4 ст. нет и он не восстановится. Единственный оставшийся амортизатор — мышцы вокруг сустава, поэтому белок стоит первым, а не «противовоспалительная еда».
2. Креатинин 63 при норме от 62 — косвенный признак низкой мышечной массы. Перед эндопротезированием это фактор риска долгого восстановления, работаем на опережение.
3. Глюкоза 6.78 и мочевая кислота 418 закрываются одной схемой: убираем фруктозу, алкоголь и быстрый углевод — они поднимают и сахар, и урат через один механизм.
4. Белок нужен, но пуриновая нагрузка ограничена. Решение: яйца (пуринов ~5 мг/100 г) как ежедневная база, птица и белая рыба как якорь, высокопуриновые убранны полностью.
5. Омега-3 не добавляем в капсулах: субстрат ФП уже есть. Закрываем рыбой — расчёт по меню даёт ~0,5 г ЭПК+ДГК в среднем за сутки, вдвое ниже лимита 1 г.
6. Недостаточность кардии + застойная гастродуоденопатия: объём порции ограничен 500 г, ужин за 3 часа до сна, всё варёное и тушёное, провокаторы рефлюкса убраны.
7. Режим 1–3 приёма без перекусов. Пауза между едой запускает мигрирующий моторный комплекс — он механически чистит тонкую кишку. Перекус обнуляет этот процесс.
8. Чем меньше приёмов, тем глубже разгрузка ЖКТ, но тем меньше белка. Это прямой размен против задачи №1, поэтому режимы разведены по показаниям, а не по желанию.
9. Вздутие: рацион смещён на овощи с низким FODMAP. Капуста, лук, чеснок и бобовые в объёме убраны — при застойной гастродуоденопатии они дают газ и распирают.
10. Кальциноз клапанов: добавлен К2 к D3, чтобы кальций шёл в кость, а не в створки.
11. План вторичен по отношению к заключению кардиолога по холтеру — см. красную рамку в начале документа.

РАЗБОР ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЗАДАНИИ. Исходное ТЗ: минимум 4 приёма по 25–30 г белка, белок — приоритет №1. Уточнение заказчика: 1–3 приёма без перекусов, чтобы разгрузить ЖКТ. Совместить дословно нельзя, поэтому режимы разведены по показаниям.

База — 3 приёма: белок 110–118 г, это 1,2–1,5 г/кг для мужчины 78–95 кг. Задача №1 выполняется полностью, паузы по 5 часов дают разгрузку. Это рабочий режим на каждый день.

Разгрузка — 2 приёма: белок 100–110 г при увеличенной белковой доле тарелки. Задача №1 ещё выполняется. Порог «25–30 г за приём» намеренно превышен: данные последних лет показывают, что организм усваивает и 50–60 г за приём, просто дольше. Режим на 3–5 дней при обострении вздутия.

Один приём в день: максимум 65–85 г белка, это 0,8–1,0 г/кг. Целевой коридор НЕ достигается. При коксартрозе 4 ст. мышца — единственный оставшийся амортизатор, а креатинин 63 уже указывает на низкую мышечную массу. Однократное питание как режим будет работать против главной задачи и против подготовки к операции. Поэтому: только эпизодически, один день, не чаще раза в неделю, и с осознанием, что этот день по белку проигран. Как постоянный режим не рекомендую.

2. ТРИ РЕЖИМА — от одного до трёх приёмов, без перекусов

Режим	Когда выбираем	Тарелка	Белок за день	Что происходит с ЖКТ
3 приёма 08:00 · 13:30 · 18:30	База. Обычный день, самочувствие ровное. Так живём большую часть времени	500 г: половина овощи, четверть белок, четверть крупа. Крупа только утром и днём	110–118 г	Паузы по 5 часов. Кишечник успевает себя вычистить, белок добирается полностью
2 приёма 10:00 · 17:00	Вздутие усилилось, тяжесть, распирание. Держим 3–5 дней, потом возвращаемся к базе	500 г: половина овощи, ТРЕТЬ белок, крупа только в первый приём и немного	100–110 г	Пауза 7 часов. Разгрузка заметно глубже, белок ещё вытягиваем
1 приём 14:00	Только эпизодически: один день, не чаще раза в неделю. Не режим	500 г: половина белок, половина овощи. Крупы нет совсем	65–85 г	Максимальная разгрузка. Но белок в этот день не добирается — минус по мышцам

Как свернуть таблицу из 14 дней в 2 приёма: берём обед и ужин этого дня, завтрак пропускаем. В обед добавляем 3 яйца, порции мяса или рыбы в обоих приёмах поднимаем до 170–190 г готового. Крупу оставляем только в обеде и уменьшаем до 80 г. Как свернуть в 1 приём: берём только обед, мясо или рыбу поднимаем до 250 г готового, добавляем 3 яйца, крупу убираем, овощей 200 г. Один день — и обратно на базу.

3. ШЕСТЬ ЖЁСТКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ — и как каждое выполнено

№	Ограничение	Как выполнено в плане
1	Омега-3 не выше 1 г ЭПК+ДГК в сутки	Добавка омега-3 НЕ назначена. Жирная рыба 4 раза за 14 дней (горбуша, форель) — в среднем ~0,5 г ЭПК+ДГК в сутки. Остальная рыба белая, омега-3 в ней мало
2	Исключить пуриновую нагрузку	Убраны: бульоны костные, холодец, желатин в объёме, субпродукты, сардины, анчоусы, сельдь, шпроты, икра, алкоголь, фруктоза. Красное мясо — 2 раза за 14 дней. База белка — яйца, птица, белая рыба
3	Глюкозамина сульфат не рекомендовать	Не назначен. В блоке нутрицевтики его нет — при преддиабете он не показан
4	Магния оксид исключить	Назначен только цитрат или глицинат. Оксид прямо вынесен в запреты
5	Все добавки только с приёмом пищи	Каждая позиция в блоке нутрицевтики привязана к завтраку, обеду или ужину. Псиллиум тоже с едой, не натощак
6	Режим с учётом недостаточности кардии	Ужин за 3 часа до сна. Порция 500 г, не больше. Убраны кофе, острое, мята, томаты, цитрус, шоколад, газировка, жареное. Всё варёное, тушёное, на пару

4. ВАРИАНТ А — готовая таблица на 14 дней. Смотришь и делаешь

День	ЗАВТРАК 08:00	ОБЕД 13:30	УЖИН 18:30	Белок за день
День 1	Омлет из 2 яиц на оливковом масле + индейка отварная 100 г; гречка 100 г; кабачок с морковью тушёные 200 г белок 36 г	Треска запечённая 150 г; киноа 120 г; стручковая фасоль с морковью тушёные 250 г белок 41 г	Индейка тушёная 150 г; рагу из кабачка, шпината и перца 300 г белок 40 г	117 г
День 2	3 яйца всмятку + индейка 60 г; пшено 100 г; тыква тушёная 200 г белок 37 г	Бедро курицы без кожи 140 г; гречка 120 г; кабачок и морковь на пару 250 г белок 40 г	Судак на пару 160 г; шпинат и стручковая фасоль тушёные 300 г белок 38 г	115 г
День 3	Омлет из 2 яиц + горбуша 100 г; рис 100 г; огурец с укропом 150 г белок 36 г	Тефтели из индейки на пару 150 г; киноа 120 г; кабачок с зеленью тушёный 250 г белок 42 г	Минтай запечённый 170 г; рагу из баклажана, кабачка и перца 300 г белок 36 г	114 г
День 4	2 яйца пашот + курица 100 г; овсянка без глютена 100 г; морковь тушёная 200 г белок 39 г	Кролик тушёный 140 г; картофель отварной 150 г; стручковая фасоль 250 г белок 39 г	Треска на пару 170 г; шпинат и цуккини тушёные 300 г белок 38 г	116 г

День	ЗАВТРАК 08:00	ОБЕД 13:30	УЖИН 18:30	Белок за день
День 5	Омлет из 2 яиц + индейка 100 г; гречка 100 г; тыква с морковью тушёные 200 г белок 39 г	Горбуша запечённая 140 г; киноа 120 г; кабачок и зелёная фасоль 250 г белок 37 г	Грудка курицы 140 г; рагу из баклажана и перца 300 г белок 42 г	118 г
День 6	3 яйца + курица 60 г; рис 100 г; огурец и зелень 150 г белок 38 г	Индейка запечённая 150 г; батат 150 г; шпинат тушёный 250 г белок 41 г	Хек на пару 170 г; кабачок, морковь и стручковая фасоль 300 г белок 36 г	115 г
День 7	Омлет из 2 яиц + треска 100 г; гречка 100 г; морковь тушёная 200 г белок 35 г	Говядина постная тушёная 120 г; киноа 120 г; кабачок и перец 250 г белок 38 г	Индейка тушёная 150 г; рагу из шпината и цукини 300 г белок 40 г	113 г
День 8	3 яйца + индейка 60 г; пшено 100 г; тыква тушёная 200 г белок 37 г	Судак запечённый 160 г; картофель отварной 150 г; стручковая фасоль 250 г белок 37 г	Бедро курицы без кожи 150 г; рагу из кабачка, моркови и зелени 300 г белок 36 г	110 г
День 9	Омлет из 2 яиц + курица 100 г; овсянка без глютена 100 г; огурец, укроп 150 г белок 39 г	Форель запечённая 140 г; киноа 120 г; шпинат и кабачок тушёные 250 г белок 37 г	Индейка на пару 160 г; рагу из баклажана и перца 300 г белок 42 г	118 г
День 10	2 яйца + индейка 100 г; гречка 100 г; морковь с кабачком тушёные 200 г белок 39 г	Треска запечённая 160 г; рис 120 г; стручковая фасоль с зеленью 250 г белок 38 г	Кролик тушёный 150 г; шпинат и цукини тушёные 300 г белок 37 г	114 г
День 11	3 яйца + треска 80 г; гречка 100 г; тыква тушёная 200 г белок 36 г	Грудка курицы 140 г; картофель отварной 150 г; кабачок и перец 250 г белок 42 г	Минтай на пару 170 г; рагу из моркови, фасоли и зелени 300 г белок 36 г	114 г
День 12	Омлет из 2 яиц + индейка 100 г; киноа 100 г; шпинат тушёный 200 г белок 39 г	Креветки отварные 150 г; рис 120 г; кабачок и стручковая фасоль 250 г белок 39 г	Индейка тушёная 150 г; рагу из баклажана, перца и зелени 300 г белок 40 г	118 г
День 13	3 яйца + курица 60 г; гречка 100 г; морковь тушёная 200 г белок 38 г	Горбуша запечённая 140 г; батат 150 г; шпинат и кабачок тушёные 250 г белок 37 г	Судак на пару 170 г; рагу из цукини и фасоли 300 г белок 40 г	115 г
День 14	Омлет из 2 яиц + индейка 100 г; овсянка без глютена 100 г; тыква тушёная 200 г белок 39 г	Говядина постная 120 г; гречка 120 г; кабачок, морковь, зелень 250 г белок 38 г	Треска запечённая 170 г; рагу из шпината, перца и фасоли 300 г белок 39 г	116 г

- Граммовка мяса и рыбы — в готовом виде. Крупа — тоже в готовом, не в сухом.
- К каждому приёму: 1 ст. л. (10–15 г) оливкового масла и зелень — укроп, петрушка, базилик.
- После каждого приёма — травяной чай: фенхель, укроп, тмин, ромашка. Не мята.
- Дни можно менять местами целиком. Внутри дня менять приёмы местами нельзя: крупа есть на завтрак и обеде, на ужине её нет.
- Яйца 2–3 в день. После липидограммы пересмотреть: при высоком ЛПНП оставить 1 желток, остальное добирать белками яиц.

5. ВАРИАНТ Б — без таблицы. Пять правил и конструктор

Правило тарелки — общий объём порции 500 г

Часть тарелки	3 приёма	2 приёма	Что кладём
Овощи — половина	~250 г	~250 г	Тушёные, отварные или на пару. Сырое — только огурец и зелень
Белок — четверть / треть	130-150 г	170-190 г + 3 яйца в первый приём	Птица, белая рыба, кролик, яйца. Порция — с ладонь без пальцев
Крупа — четверть	100-120 г	80 г, только первый приём	Только завтрак и обед. На ужине эта четверть — снова овощи
Масло — сверху	1 ст. л.	1 ст. л.	Оливковое. Больше не нужно: жир тормозит опорожнение желудка и даёт заброс

Пять правил, которые заменяют всю таблицу

№	Правило	Что это значит
1	От одного до трёх раз в день, между — только вода	Обычный день — три раза: 08:00, 13:30, 18:30. Тяжесть и вздутие — два раза: 10:00 и 17:00. Между приёмами вода и травяной чай, больше НИЧЕГО. Пауза нужна не для похудения: именно в ней кишечник механически себя вычищает. Один перекус — и процесс сброшен на ноль, пауза считается заново.
2	Тарелка 500 г, не больше	Половина овощи, четверть белок, четверть крупа. Вечером крупу убираем. Порция больше 500 г при недостаточности кардии = заброс и изжога.
3	Белок в каждый приём, без исключений	Порция с ладонь. Пропущенный белок за день не догоняется — мышца строится только в тот приём, когда белок пришёл. Это то, что держит сустав.
4	Всё варёное, тушёное, на пару или запечённое	Ничего жареного, ничего в панировке. Жареное и жирное — прямой провокатор заброса и нагрузка на желчный.
5	Последняя еда за 3 часа до сна, после еды час не ложиться	Ужин 18:30 — сон не раньше 21:30. Если лечь раньше, содержимое желудка идёт обратно в пищевод. Изголовье кровати приподнять на 10-15 см.

Конструктор: собери тарелку сам

Слот	Выбери одно
Белок — птица	Индейка филе или фарш · грудка курицы · бедро курицы без кожи · кролик
Белок — рыба белая	Треска · судак · минтай · хек · пикша
Белок — рыба жирная	Горбуша · форель. Не чаще 2 раз в неделю — лимит по омега-3
Белок — яйца	2-3 яйца: омлет, пашот, всмятку. Каждый день, это самый низкопуриновый белок
Белок — иное	Креветки 1 раз в неделю · говядина постная 1 раз в неделю, не чаще
Крупа (завтрак и обед)	Гречка · киноа · рис · пшено · кукурузная крупа · овсянка «без глютена» · картофель отварной · батат
Овощи (всегда)	Кабачок и цукини · морковь · тыква · шпинат · стручковая фасоль · баклажан · перец болгарский · огурец · листовой салат · зелёная часть лука-порея
Жир	Оливковое масло · масло авокадо · авокадо 30 г · грецкие или кедровые орехи 20-30 г
Питьё	Вода · травяной чай: фенхель, укроп, тмин, ромашка · цикорий

6. ЗАМЕНЫ — чем закрыть сахар, глютен и молочку

САХАР — и почему это тут важнее обычного

Что убираем	Чем заменяем	Где брать
Сахар, мёд, сиропы, финики, сухофрукты, соки	Стевия. И всё. Фрукты в сушёном виде и соки не заменяются ничем — они уходят	ВкусВилл, Перекрёсток
Эритрит, ксилит и прочие сахарные спирты	НЕ используем. Дают вздутие, а по эритриту есть сигнал по сердечно-сосудистым событиям — при кальцинозе клапанов это лишний риск	—
Конфеты, шоколад, десерты	Ягоды до 100 г вместе с приёмом пищи, не отдельно и не каждый день. Шоколад не заменяем: он и сахар, и расслабляет сфинктер пищевода	рынок, ВкусВилл (заморозка)
Сладкие напитки, газировка	Вода, травяной чай (фенхель, укроп, ромашка), цикорий	Пятёрочка, Перекрёсток, ВкусВилл

ГЛЮТЕН

Что убираем	Чем заменяем	Где брать
Пшеница, рожь, ячмень, белая мука, манка, булгур, кускус	Гречка, киноа, рис, пшено, кукурузная крупа, амарант, овсянка «без глютена»	Пятёрочка, Перекрёсток, ВкусВилл
Хлеб	Гречневые, рисовые, кукурузные хлебцы — смотреть, чтобы без сахара в составе	ВкусВилл, Перекрёсток
Макароны	Паста из гречки, риса или кукурузы	Перекрёсток, ВкусВилл
Мука для панировки и загущения	Рисовая, гречневая, кукурузная мука, картофельный крахмал. Но панировка всё равно только для запекания, не для жарки	ВкусВилл, Перекрёсток

МОЛОЧКА

Что убираем	Чем заменяем	Где брать
Молоко	Кокосовое, рисовое или миндальное — без сахара в составе	ВкусВилл, Перекрёсток
Сливки	Кокосовые сливки, немного — это жир, а жир мы ограничиваем	ВкусВилл
Творог, йогурт	Кокосовый йогурт без сахара	ВкусВилл
Сыр	Ореховый сыр изредка. Проще обойтись — это жир и соль	ВкусВилл
Сливочное масло	Гхи (топлёное) — казеина и лактозы в нём нет. Но по этому плану основной жир всё равно оливковое масло	Перекрёсток, ВкусВилл

7. ИСКЛЮЧЕНИЯ — и причина по каждому пункту

Что исключаем	Причина — конкретно по этим анализам
Алкоголь полностью	Мочевая кислота 418 при потолке 416,5. Алкоголь поднимает урат и провоцирует предсердную экстрасистолию, которая уже есть на ЭКГ
Фруктоза: сахар, мёд, сиропы, сухофрукты, соки, сладкие напитки	Единственный углевод, который напрямую поднимает мочевую кислоту. Плюс глюкоза 6,78
Костные бульоны, холодец, желатин в объёме	Пуриновая нагрузка. Классические «схемы для суставов» на бульонах этому клиенту прямо противопоказаны
Субпродукты: печень, почки, сердце, язык	Самая высокая концентрация пуринов из всех продуктов, 300+ мг/100 г
Сардины, анчоусы, сельдь, шпроты, скумбрия солёная, икра	300-500 мг пуринов на 100 г — верхняя группа риска при МК 418
Красное мясо чаще 1 раза в неделю	Пурины плюс кардиометаболический риск при гипертрофии МЖП и кальцинозе клапанов
Омега-3 в капсулах	Дозы от 1 г ЭПК+ДГК повышают риск фибрилляции предсердий. Субстрат уже есть: предсердная экстрасистолия, RR 592-1334 мс

Что исключаем	Причина — конкретно по этим анализам
Глюкозамина сульфат	Влияет на углеводный обмен. При глюкозе 6,78 не назначается
Магния оксид	Осмотический эффект и раздражение слизистой при застойной гастроудоденопатии
Кофе, включая растворимый и без кофеина	Расслабляет нижний пищеводный сфинктер — прямой заброс при недостаточности кардии. Плюс провокация экстрасистолии
Мята и мятный чай	Расслабляет нижний пищеводный сфинктер сильнее, чем кофе
Шоколад и какао	Расслабляет сфинктер плюс сахар. Два повода сразу
Томаты, томатная паста, кетчуп	Кислота, прямое раздражение при застойной гастроудоденопатии
Цитрусовые и кислые соки	Кислота, рефлюкс. Витамин С добираем добавкой в буферной форме, а не апельсином
Острое: чили, аджика, хрен, горчица	Раздражение слизистой при гастроудоденопатии и ксантоме желудка
Жареное, фритюр, жирное в объёме	Замедляет опорожнение желудка → заброс. Плюс нагрузка на желчный
Газированные напитки	Механически растягивают желудок и выдавливают содержимое в пищевод
Порции больше 500 г и еда позже 18:30	Объём и горизонтальное положение — два главных триггера при недостаточности кардии
Пшеница, рожь, ячмень, белая и ржаная мука	По условию: питание без глютена
Все молочные продукты, кроме гхи	По условию: питание без молочки. Отдельно отмечу: молочка снижает мочевую кислоту, и её исключение мы компенсируем водой, псиллиумом и витамином С
Бобовые в объёме, капуста белокочанная, лук репчатый, чеснок, грибы в объёме	FODMAP и газообразование при хронической склонности к вздутию
Бульонные кубики, дрожжевой экстракт, готовые соусы	Пурины из дрожжей плюс натрий при кардиологической нагрузке
Перекусы между приёмами пищи	Любая еда в паузе останавливает мигрирующий моторный комплекс — тот самый механизм, которым кишечник себя очищает. Без пауз вздутие не уйдёт

8. ПОКУПКИ — Пятёрочка · Перекрёсток · ВкусВилл · рынок

Категория	Что берём	Пятёрочка	Перекрёсток	ВкусВилл	Рынок
Белок — птица	Индейка филе и фарш, грудка и бедро курицы, кролик	есть	есть	есть	лучше всего
Белок — рыба белая	Треска, судак, минтай, хек, пикша	есть	есть	есть	лучше всего
Белок — рыба жирная	Горбуша, форель — 2 раза в неделю, не больше	есть	есть	есть	есть
Белок — яйца	Яйца куриные С1, каждый день	есть	есть	есть	лучше всего
Крупы	Гречка, киноа, рис, пшено, кукурузная крупа	есть	есть	есть	—
Крупы	Овсянка с маркировкой «без глютена»	не всегда	есть	есть	—
Овощи	Кабачок, цукини, морковь, тыква, баклажан, перец, огурец	есть	есть	есть	лучше всего
Овощи	Шпинат, стручковая фасоль — можно замороженные, это удобнее	есть	есть	есть	сезонно
Корнеплоды	Картофель, батат	есть	есть	есть	лучше всего
Зелень	Укроп, петрушка, базилик, зелёная часть лука-порея	есть	есть	есть	лучше всего
Жиры	Оливковое масло, масло авокадо	есть	есть	есть	—
Жиры	Грецкие и кедровые орехи, авокадо	есть	есть	есть	есть

Категория	Что берём	Пятёрочка	Перекрёсток	ВкусВилл	Рынок
Без молочки	Кокосовое или рисовое молоко без сахара, кокосовый йогурт, гхи	не всегда	есть	есть	—
Напитки	Чай фенхель, укроп, тмин, ромашка; цикорий	не всегда	есть	есть	есть
Добавки	Псиллиум, магний цитрат или глицинат, D3, K2, цинк, витамин С, креатин	нет	нет	частично	нет — аптека

На рынке берём мясо, рыбу, яйца, овощи и зелень — там свежее и дешевле. Добавки — только аптека, ни рынок, ни супермаркет для них не подходят. «не всегда» значит: в крупных точках есть, в маленьких может не быть.

9. НУТРИЦЕВТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА — всё только с едой, ничего натошак

Что	Доза	Когда	С чем разносить	Зачем
Магний цитрат или глицинат	200 мг элементарного	С ужином	Не в один приём с цинком — интервал 2 часа	Аритмогенный субстрат, спазм, стул. Оксид исключён: гастрит
Витамин D3	2000 ME	С завтраком	Вместе с K2, оба на жире	Мышца, кость, иммунитет перед операцией. Точная доза — после 25(OH)D
Витамин K2 МК-7	90–100 мкг	С завтраком	Вместе с D3	Кальциноз створок: направляет кальций в кость, а не в клапан
Псиллиум	Старт 5 г, за неделю до 10 г	С обедом, запить 300 мл воды	Отдельно от цинка, D3, K2 — интервал 2 часа, сорбирует их	Глюкоза, мочева я кислота, стул. Растёт постепенно, иначе усилит вздутие
Витамин С буферный (аскорбат)	500 мг	С обедом	Можно вместе с цинком	Мягко снижает мочевую кислоту. Буферный — чтобы не кислотить желудок
Цинк пиколинат	15 мг	С обедом	Не с магнием — интервал 2 часа	Заживление слизистой желудка, подготовка тканей к операции
Креатин моногидрат	3 г	С обедом	Разносить не нужно	Мышечная масса при креатинине 63. Самая доказанная позиция под задачу №1
Белок изолят (гороховый или рисовый)	20–25 г при нехватке	В приём пищи	Не как перекус — только внутрь еды	Страховка, если приём не добрал белок. Не замена еде
Куркумин с пиперином	500 мг	С обедом	Опция, не база	Только после стихания симптомов гастрита. При малейшей изжоге — отменить

- Омега-3 в капсулах в этом списке НЕТ и не будет: лимит 1 г ЭПК+ДГК и субстрат ФП. Норма закрывается рыбой из меню.
- Глюкозамина сульфата в списке НЕТ: преддиабет.
- Магния оксида в списке НЕТ: гастрит и рефлюкс.
- Ничего не принимается натошак — все позиции привязаны к приёму пищи.
- K2 отменяется немедленно, если кардиолог назначит варфарин. Сейчас антикоагулянтов нет, МНО 0,99 — приём K2 допустим.
- Креатин может слегка поднять креатинин в анализе. Это лабораторный артефакт, не поражение почек. Предупредить врача перед сдачей.

10. АНАЛИЗЫ К ДОСДАЧЕ — что каждый даст

Анализ	Что он даст и что изменит в плане
HbA1c	Глюкоза 6,78 — это один замер. HbA1c покажет средний сахар за 3 месяца: преддиабет подтверждён или это разовый подъём. От этого зависит жёсткость по крупам
Липидограмма (ОХ, ЛПНП, ЛПВП, ТГ)	Кальциноз клапанов и гипертрофия МЖП без липидограммы ведутся вслепую. Прямо влияет на количество желтков: 2-3 в день или 1
25(ОН)D	D3 назначен вслепую 2000 МЕ. По анализу доза либо поднимется до 4000-5000, либо снизится. Дефицит D — это ещё и мышечная слабость
Ферритин + ОЖСС + железо	MCV 87,4 на нижнем краю нормы — ранний признак дефицита железа до анемии. Перед эндопротезированием критично: операция даёт кровопотерю
ТТГ (при отклонении — Т4 св.)	Брадикардия 56. Гипотиреоз даёт и брадикардию, и рост ЛПНП, и слабость мышц. Если он есть — часть картины объясняется им, а не питанием
Калий, магний, кальций ионизированный	Предсердная экстрасистолия. Дефицит калия и магния — обратимая причина аритмии. Нужен ДО того, как магний назначен курсом
СРБ высокочувствительный	Задача №2 плана — снизить фоновое воспаление. Без исходной цифры результат измерить нечем. Это точка отсчёта
H. pylori — дыхательный уреазный тест или антиген в кале	Застойная гастродуоденопатия и ксантома желудка без теста ведутся вслепую. Если H. pylori есть, питанием это не решается — нужен гастроэнтеролог
Альбумин + общий белок в динамике	Нутритивный статус перед операцией. Альбумин ниже 35 — прямой предиктор плохого заживления. Общий белок 80,9 сейчас хороший, нужна динамика
Мочевая кислота — повтор через 6 недель	Контроль, работает ли план. 418 при потолке 416,5 — цель уйти к 350 и ниже
Глюкоза натощак — повтор через 6 недель	Тот же контроль по второй мишени

11. КРАСНЫЕ ФЛАГИ — когда немедленно к врачу

Симптом	Что делать
Давящая или жгущая боль за грудиной, отдаёт в челюсть, руку, спину	СКОРАЯ, 103. Не ждать, не пробовать пережить
Обморок или предобморочное состояние, потемнение в глазах с перебоями	СКОРАЯ. При брадикардии 56 и паузах RR это возможная блокада
Пульс ниже 45 или ощутимые паузы в сердцебиении	СКОРАЯ или немедленно кардиолог
Перебои в сердце, которые длятся больше 30 минут подряд, впервые	Кардиолог в этот же день. Возможен срыв в фибрилляцию предсердий
Одышка в покое или ночью лёжа, нарастающие отёки голеней	Кардиолог срочно — признаки сердечной недостаточности
Рвота с кровью или «кофейной гущей», чёрный дёгтеобразный стул	СКОРАЯ. Желудочно-кишечное кровотечение
Пища застревает, глотать становится труднее	Гастроэнтеролог срочно, повторная ЭГДС с биопсией
Боль в животе, которая опоясывает и отдаёт в спину, с рвотой	СКОРАЯ. Возможен панкреатит
Внезапная сильная боль в суставе, покраснение, отёк, кожа горячая	Ревматолог срочно — похоже на подагрическую атаку. Сдать мочевую кислоту
Потеря веса больше 5% за месяц без усилий	Терапевт, онкопоиск. На этом плане вес так падать не должен
Нога перестала держать, сустав заклинило, резкая деформация	Травматолог-ортопед, не откладывая
Изжога, которая усилилась после старта плана	Снизить объём порции и жир, убрать куркумин. Если не ушло за 5 дней — гастроэнтеролог

12. С ЧЕГО НАЧАТЬ — первая неделя по шагам

Шаг	Что сделать	Когда
1	Записаться к кардиологу и сделать холтер. До заключения — никаких нагрузок и никаких разгрузочных дней	На этой неделе
2	Сдать анализы из раздела 10. Минимум: HbA1c, липидограмма, 25(OH)D, ферритин, ТТГ, калий и магний, СРБ, H. pylori	На этой неделе
3	Убрать из дома всё из раздела 7. Начать с четырёх главных: алкоголь, сахар, кофе, костные бульоны	Сегодня
4	Закупиться по разделу 8. Мясо, рыбу, яйца, овощи и зелень — на рынке, добавки — в аптеке	1-2 дня
5	Первые 3 дня — режим 3 приёма строго по таблице. Не 2 и не 1: сначала тело привыкает к объёму порции и к паузам	Дни 1-3
6	Псиллиум начинать с 5 г, а не сразу с 10. Иначе вздутие усилится в первые дни и план обвинят зря	С 1-го дня
7	Короткий дневник: стул, вздутие, изжога, тяжесть после еды. Три строчки в день, не больше	Каждый день
8	Режим 2 приёма пробовать только со 2-й недели и только если вздутие держится	С 8-го дня
9	Пересдать мочевую кислоту и глюкозу натощак, сравнить с апрелем	Через 6 недель

Важно. Документ носит нутрициологический характер: питание, режим, нутриенты. Он не является медицинским назначением, не заменяет консультацию врача и не содержит назначения лекарственных препаратов. Диагнозы не устанавливаются. При коксартрозе 4 ст. хрящ отсутствует и восстановлению питанием не подлежит — задача плана в другом: сохранить мышцы вокруг сустава, снизить фоновое воспаление и подготовить организм к операции. План вторичен по отношению к заключению кардиолога по холтеру.