

Университет ИТМО

Факультет ПИиКТ

Дисциплина: Математический анализ

Лабораторная работа №1
Численные методы интегрирования

Выполнил: Григорьев Александр Алексеевич
группа Р3130
Преподаватель: Фотин Алексей Дмитриевич

Санкт-Петербург 2022

1. Аналитическая часть

Интеграл по заданию:

$$\int_0^2 2^x dx$$

Так как 2^x непрерывна на $[0, 2]$, 2^x интегрируема на $[0, 2]$, то есть интеграл Римана существует.

Составим интегральную сумму. В качестве разбиения τ возьмём разбиение $[0, 2]$ на n равных отрезков. Тогда $x_i = \frac{2k}{n}$, $\Delta x_i = \frac{2}{n}$. Также выберем $\xi = x_i$. Тогда

$$\sigma_\tau(f, \xi) = \sum_{k=1}^n 2^{\frac{2k}{n}} \frac{2}{n} = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{2k}{n}}$$

По сумме геометрической прогрессии:

$$\frac{2}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{2k}{n}} = \frac{2}{n} \frac{2^{\frac{2}{n}}(1 - 2^2)}{1 - 2^{\frac{2}{n}}} = \frac{2}{n} \frac{3 \cdot 2^{\frac{2}{n}}}{2^{\frac{2}{n}} - 1}$$

Перейдем к пределу при $n \rightarrow \infty$ и заменим предел на эквивалентный:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \frac{3 \cdot 2^{\frac{2}{n}}}{2^{\frac{2}{n}} - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \frac{3 \cdot 2^{\frac{2}{n}}}{\frac{2}{n} \ln 2} = \frac{3}{\ln 2}$$

Теперь найдём значение интеграла по формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_0^2 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} \Big|_0^2 = \frac{3}{\ln 2}$$


2. Описание метода и результаты

Метод прямоугольников - метод численного интегрирования функции одной переменной, заключающийся в замене подынтегральной функции на многочлен нулевой степени, то есть константу, на каждом элементарном отрезке. Он заключается в приближённом вычислении площади под графиком суммированием площадей конечного числа прямоугольников, ширина которых будет определяться расстоянием между соответствующими соседними узлами интегрирования, а высота — значением подынтегральной функции в этих узлах.

Шаг интегрирования (h)	Численное решение F	Погрешность $ F - \tilde{F} $	Количество итераций N
0.2	4.32462	$3.47 \cdot 10^{-3}$	10
0.0	4.32805	$3.47 \cdot 10^{-5}$	100
0.002	4.32808	$3.47 \cdot 10^{-7}$	1000
$2 \cdot 10^{-4}$	4.32809	$3.47 \cdot 10^{-9}$	10^5
$2 \cdot 10^{-5}$	4.32809	$3.79 \cdot 10^{-11}$	10^6


3. Графики

1) График для разбиения τ отрезка $[0, 2]$ на 10 отрезков, в качестве ξ_i выбрана точка x_{i-1} :




Значение заданной интегральной суммы $\sigma_\tau(2^x, \xi) = 4.32462$

2) График для разбиения τ отрезка $[0, 2]$ на 20 отрезков, в качестве ξ_i выбрана точка x_i :




Значение заданной интегральной суммы $\sigma_\tau(2^x, \xi) = 4.32722$

3) График для разбиения τ отрезка $[0, 2]$ на 100 отрезков, в качестве ξ_i выбрана точка $\frac{x_i - x_{i-1}}{2}$:



Значение заданной интегральной суммы $\sigma_\tau(2^x, \xi) = 4.32805$

4) График для разбиения τ отрезка $[0, 2]$ на 200 отрезков, в качестве ξ_i выбрана точка $\frac{x_i - x_{i-1}}{2}$:



Значение заданной интегральной суммы $\sigma_\tau(2^x, \xi) = 4.32805$

4. Код программы

Репозиторий с проектом на GitHub