

BREVI NOTE

Riv. ital. Orn., Milano, 72 (2): 269-271, 30-VI-2003

**L'AVIFAUNA NIDIFICANTE NELLE BRUGHIERE
DELLA LOMBARDIA OCCIDENTALE**

ABSTRACT. – *Breeding birds of Western Lombardy heaths (Northern Italy).*

I frammenti di brughiera privi di vegetazione arborea non superano attualmente, nella Lombardia occidentale, i 10 kmq ripartiti tra le Province di Varese, Como e Milano. Questo habitat tipico delle aree collinari e dell'alta pianura, gravemente minacciato da trasformazioni ambientali e da urbanizzazione, è caratterizzato da vegetazione erbaceo-arbustiva a dominanza di *Molinia caerulea* e *Calluna vulgaris* (BANFI, 1982) ed ospita una comunità ornitica a prevalenza di Passeriformi (FORNASARI, 1987).

Il Gruppo Insubrico di Ornitologia coordina un'indagine biennale, iniziata nel 2001, per studiare la distribuzione dell'avifauna in 5 aree di studio situate nei parchi regionali del Campo dei Fiori, della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, della Valle del Ticino, della Brughiera e delle Groane.

Per il rilievo dell'avifauna nidificante è stata adottata la metodologia messa a punto per il Breeding Bird Survey britannico (GREGORY *et alii*, 1997). Sono state individuate 15 unità di rilevamento di 1x1 km distribuite nelle aree di studio come indicato in Tabella I. Per ciascuna unità di rilevamento è stato scelto un itinerario campione lungo il quale sono stati censiti i maschi cantori e gli individui in attività riproduttiva di 11 specie (Tab. I) tipiche della brughiera aperta o cespugliata. Nel corso della stagione riproduttiva, ciascun itinerario è stato percorso 3 volte durante le ore di massima attività canora, mentre per il censimento del Succiacapre, *Caprimulgus europaeus*, sono stati effettuati 2 rilievi crepuscolari.

Le specie censite sono ripartite nelle unità di rilevamento secondo quanto riportato in Tabella I. Il numero medio di specie per quadrato è 3,6 (0-7). Nelle brughiere del parco del Ticino nidificano 8 specie, in quelle del parco delle Groane 7; in ciascuno degli altri parchi, con un numero di quadrati visitati inferiore, le specie incontrate sono state soltanto 2.

TABELLA I. - Numero massimo di coppie stimate per ogni unità di rilevamento di 1x1 km: Campo dei Fiori (C), Pineta di Appiano Gentile e Tradate (P), Valle del Ticino (T), Brughiera (B), Groane (G).

	unità di rilevamento														
	C1	P2	P3	P4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	B11	G12	G13	G14	G15
<i>Coturnix coturnix</i>													3		
<i>Caprimulgus europaeus</i>	4	3	1		8	8	12		2	3	2		2		1
<i>Alauda arvensis</i>							2	3	2						
<i>Luscinia megarhynchos</i>					8	6	7	2	5	4	1	1	7		1
<i>Saxicola torquata</i>					4	1						2	2	4	
<i>Hippolais polyglotta</i>					12	11	8		2	2		1	1	2	1
<i>Sylvia communis</i>					5	4	4						4		1
<i>Lanius collurio</i>							1	3	3			1		1	
<i>Emberiza citrinella</i>		1													
<i>Emberiza cia</i>	1														
<i>Miliaria calandra</i>							1	3	2						

La specie più diffusa, presente in 11 delle 15 unità di rilevamento (e l'unica rilevata in tutti parchi), è il Succiacapre che è anche la più abbondante (46 maschi in canto). Tra le specie meno frequenti, lo Zigolo muciatto, *Emberiza cia*, è stato rinvenuto nell'unica area con caratteristiche collinari, la Quaglia, *Coturnix coturnix*, nel settore dell'alta pianura più vicino al limite delle risorgive, lo Zigolo giallo, *Emberiza citrinella*, nella brughiera frammista a pino silvestre del Parco Pineta. Quest'ultima osservazione conferma la tendenza ad occupare brughiera non eccessivamente aperte riportata nell'Atlante regionale (CAMBI, 1990).

Nel parco del Ticino e in misura inferiore nelle Groane sono state rinvenute densità elevate di specie ecotonali o comunque legate alla presenza di alberi o arbusti (Usignolo, *Luscinia megarhynchos*; Canapino, *Hippolais polyglotta*; Sterpazzola, *Sylvia communis*; Averla piccola, *Lanius collurio*). Le basse densità di Allodola, *Alauda arvensis*, nelle brughiere del Ticino e la sua assenza dalle altre aree è probabilmente da mettere in relazione alle caratteristiche della vegetazione erbacea, troppo fitta e alta per questa specie (GRANDI & NOVA, 1990). Sono meno chiari i motivi dell'assenza dalla maggior parte dei quadrati del Saltimpalo, *Saxicola torquata*, specie diffusa in tutti gli habitat aperti della regione (LARDELLI, 1990).

Infine, i dati relativi allo Strillozzo, *Miliaria calandra*, confermano da un lato la tendenza di questa specie ad occupare ridotte zone di brughiera aperta (MINGOZZI, 1988) in alternativa agli usuali habitat agricoli, dall'altro l'esistenza a livello regionale lombardo di una modesta popolazione isolata proprio nell'area di studio.

BIBLIOGRAFIA

- BANFI E., 1982 - La Brianza: un campione di flora e vegetazione - Regione Lombardia, Milano.

- CAMBI D., 1990 - Zigolo giallo. In: BRICHETTI P. & FASOLA M. (a cura di). Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia 1983-1987 - *Editoriale Ramperto*, Brescia, p. 225.
- FORNASARI L., 1987 - Forest bird communities in the Po Valley, Northern Italy - *Acta oecologica, Oecol. Gener.*, 8: 169-175.
- GRANDI E. & NOVA M., 1990 - Allodola. In: BRICHETTI P. & FASOLA M. (a cura di). Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia 1983-1987 - *Editoriale Ramperto*, Brescia, p. 126.
- GREGORY R.D., BASHFORD R.I., BALMER D.E., MARCHANT J.H., WILSON A.M. & BAILLIE S.R., 1997 - The Breeding Bird Survey 1995-1996 - *The British Trust for Ornithology*, Thetford.
- LARDELLI R., 1990 - Saltimpalo. In: BRICHETTI P. & FASOLA M. (a cura di). Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia 1983-1987 - *Editoriale Ramperto*, Brescia, p. 148.
- MINGOZZI T., 1988 - Strillozzo. In: MINGOZZI T., BOANO G. & PULCHER C. (a cura di). Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val d'Aosta 1980-84 - Museo regionale di Scienze Naturali, Torino, Monografie, p. 432-433.

PIERO ALBERTI, MONICA CARABELLA, SILVIO COLAONE,
GIANLUCA DANINI, FABIO SAPORETTI & CHIARA SCANDOLARA

Gruppo Insubrico di Ornitologia
Civico Museo Insubrico di Storia Naturale
Piazza Giovanni XXIII, 4
21056 Induno Olona (VA)

Riv. ital. Orn., Milano, 72 (2): 271-274, 30-VI-2003

**RAPACI RECUPERATI IN PROVINCIA DI BERGAMO (ANNI 1999-2001)
PRESSO IL CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI
WWF DI VALPREDINA**

ABSTRACT. - *Recovery of raptors in the Bergamo province (1999-2001) by the WWF rehabilitation station of Valpredina.*

Si riportano i dati preliminari relativi all'attività del Centro di Recupero degli Animali Selvatici posto all'interno della Riserva Naturale Regionale - Oasi WWF di Valpredina presso il Comune di Cenate Sopra (BG).

Nell'arco del periodo compreso tra il 1 Gennaio 1999 e il 15 Ottobre 2001 sono stati recuperati 290 rapaci di cui 154 diurni (108 Accipitridi, 2 Pandionidi, 44 Falconidi) e 136 notturni (4 Tironidi e 132 Strigidi) provenienti per la massima parte (93%) dalla provincia di Bergamo ed in percentuali minime dalle confinanti province di Brescia, Lecco e Cremona.

Suddividendo i dati in base ai mesi in cui è avvenuto il ricovero si sono ottenute indicative differenze tra gli ordini considerati; in ottobre e novembre, mesi di attività venatoria, si è avuto il maggior numero di recuperi di Accipitriformi e di Falconiformi. In particolare, la Poiana, *Buteo buteo*, e lo Sparviero, *Accipiter nisus*, sono le specie più abbondanti in periodo di caccia, rispettiva-