

Schiribilla e Voltolino - La situazione in Lombardia nel 2017


di Milo Manica

Introduzione

Grazie al LIFE Gestire 2020 sono state finanziate ricerche sugli uccelli nidificanti delle aree umide di Rete Natura 2000, nella fascia pedemontana della Lombardia. Sono stati considerati 21 siti umidi in cui sono state fatte sessioni di ricerca per le specie di allegato I della direttiva Uccelli potenzialmente nidificanti in questi siti.

Le 21 aree umide (nelle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo e Brescia):

- A: Palude Bruschera
- B: Sabbie d'oro
- C: Palude Bozza-Monvallina
- D: Lago di Comabbio
- E: Paludi di Arsago
- F: Palude Brabbia
- G: Lago di Biandronno
- H: Lago di Varese
- I: Alnete del Lago di Varese
- J: Palude di Albate
- K: Lago di Montorfano
- L: Lago di Piano
- M: Lago di Alserio
- N: Lago di Pusiano
- O: Lago di Segrino
- P: Pian di Spagna e L. di Mezzola
- Q: Lago di Olginate
- R: Lago di Sartirana
- S: Palude di Brivio
- T: Il Toffo
- U: Torbiere d'Iseo



Le specie e come censirle

Tra le specie anche due rallidi: la schiribilla (*Porzana parva*) e il Voltolino (*Porzana porzana*).

Schiribilla e voltolino sono uccelli acquatici di piccola-media dimensione, adattati a vivere nascosti tra la vegetazione delle zone umide. Hanno versi rumorosi e forti, nidificano nella vegetazione palustre fitta. In primavera compiono migrazioni notturne dalle zone di svernamento (Africa e Asia). Emettono il canto di notte, con momenti di maggiore intensità e frequenza in ore crepuscolari, con predilezione delle ore intorno ad alba e/o tramonto a seconda della specie. In particolare, da studi effettuati da Polak (2005) è emerso che la schiribilla mostra una preferenza per l'emissione del canto nei minuti che precedono il sorgere del sole, mentre il voltolino emette vocalizzazioni più frequenti appena dopo il tramonto.

Per lo studio sono stati eseguiti dei punti d'ascolto con la tecnica del playback (stimolazione del canto tramite emissione acustica).

I rilievi sono stati effettuati fra marzo e giugno nelle due ore precedenti l'alba oppure nelle due ore successive al tramonto. L'ascolto è stato fissato in 8 minuti

È stata confermata la rarità di nidificazione per questi uccelli (sono una coppia di schiribilla è stata accertata in periodo post migratorio e quindi in fase riproduttiva). Tuttavia si è rilevata una buona presenza in migrazione.



Schiribilla (foto Alvinio Ravasi)



Voltolino (foto Roberto Aletti)



I risultati

Lo studio ha confermato la rarità delle specie nella nostra regione e per la stagione 2017 la presenza come nidificanti è risultata essere nulla o estremamente scarsa.

Per la schiribilla si può confermare la presenza di una coppia ai canneti del Lago di Mezzola CO), mentre per il voltolino la presenza è stata accertata solamente in periodo di migrazione.

Prevedere interventi di gestione degli habitat idonei alla riproduzione di queste specie può essere una strategia da mettere in campo per la loro tutela.

Dallo studio emerge infatti che molte zone umide vedono un invecchiamento dei canneti che tendono a prosciugarsi, riducendone l'interesse per questi uccelli. Interventi di gestione attiva come sfalci o scavi nei canneti della nostra regione potrebbero essere soluzioni con risvolti anche importanti.



A sinistra osservazioni di schiribilla, a destra quelle di voltolino nel periodo compreso tra il 24 marzo e il 17 giugno 2017.

In giallo le osservazioni in periodo di migrazione primaverile, in rosso quelle in periodo riproduttivo. Quella segnata in verde indica l'unica coppia confermata in riproduzione.