Lista degli uccelli della provincia di Varese

Roberto Aletti – Gruppo Insubrico di Ornitologia Clivio (VA)

Lista completa con dati documentati di tutte le specie osservate in provincia di Varese *(aggiornamento anno 2020)*



Cannareccione (*Acrocephalus arundinaceus*) Lago di Varese (R. Aletti)

SOMMARIO

INTRODUZIONE 3

CAMPI CONSIDERATI NELLA LISTA 4
- Fenologia 4
- Frequenza osservazioni / Livello di diffusione 6
- Gruppo nidificazione 7
- Ultimo anno nidificazione certa 8
- Note osservazioni – Note nidificazione 8

SPECIE ESCLUSE 9
CONSIDERAZIONI GENERALI 9

LISTA UCCELLI – ORDINAMENTO SISTEMATICO 10
- Anseriformes 10
- Galliformes 18
- Gaviiformes 20
- Podicipediformes 20
- Phoenicopteriformes 21
- Ciconiiformes 22
- Pelecaniformes 22
- Suliformes 25
- Accipitriformes 25
- Otidiformes 29
- Gruiformes 30
- Charadriiformes 31
- Columbiformes 41
- Cuculiformes 42
- Strigiformes 43
- Caprimulgiformes 45
- Apodiformes 45
- Coraciiformes 46
- Bucerotiformes 46
- Piciformes 47
- Falconiformes 47
- Psittaciformes 48
- Passeriformes 49

ELENCO SPECIE ESCLUSE 70

RINGRAZIAMENTI 72

BIBLIOGRAFIA 72

R. Aletti, 2021 – Lista degli uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2020. (Gruppo Insubrico di Ornitologia – Clivio VA) pp. 77

INTRODUZIONE

Questa ricerca, attraverso la consultazione di fonti bibliografiche e piattaforme informatiche di associazioni ornitologiche e di birdwatching, ha come obiettivo l'individuazione di tutte le specie di uccelli segnalate recentemente o in passato nella provincia di Varese.
Nell'analisi, oltre alle osservazioni, sono state reperite nella stessa modalità segnalazioni e note relative alle specie che attualmente nidificano, o che hanno comunque nidificato in tempi recenti o passati, nel territorio provinciale.
La classificazione, l'ordinamento sistematico, la nomenclatura italiana e scientifica utilizzate nella LISTA DEGLI UCCELLI DELLA PROVINCIA DI VARESE (LISTA) fanno riferimento alla "Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014 (Brichetti e Fracasso, 2015) e, in sostanziale accordo con le liste AERC (Association of European Records and Rarities Committees), vengono quindi considerate le sole specie relative al territorio italiano appartenenti alle categorie **A**, **B** e **C** (Fracasso et al., 2009; Baccetti et al., 2014):

- **A** – specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire dal 1950.
- **B** – specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta tra il 1800 ed il 1949.
- **C** – specie introdotta dall'uomo o sfuggita dalla cattività, che ha formato almeno una popolazione nidificante in grado di auto sostenersi; la categoria **C** vale anche per individui giunti spontaneamente da popolazioni aventi le medesime caratteristiche, insediate al di fuori dell'Italia.

Le specie appartenenti alle sole categorie "di servizio" (Baccetti et al., 2014) **D**, **E, X** (specie con provenienza selvatica dubbia, specie rilasciate o sfuggite che non hanno generato popolazioni vitali e specie radiate) non sono quindi state considerate.

Le osservazioni relative alle sottospecie sono state ricondotte alla specie di riferimento.

Nella LISTA in riferimento alle osservazioni e segnalazioni avvenute nel secolo corrente o nel passato, considerando i criteri di inclusione ed esclusione indicati (vedi anche successivo paragrafo "SPECIE ESCLUSE"), alla data del 31/12/2020 per la provincia di Varese sono state individuate **347** specie (**141** Passeriformi e **206** non Passeriformi)

CAMPI CONSIDERATI NELLA LISTA

La LISTA è esposta in ordine sistematico, suddivisa in ordini, quindi famiglie e singoli generi e specie.
Per ogni specie sono stati inseriti i campi secondo il seguente criterio:

1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**
7	Oca lombardella	*Anser albifrons*	A? (2)	Molto rara		
7						
- (Ornitho) 29/01/2017 38 indd. Fiume Ticino Lonate Pozzolo osservate in volo provenienti da una zona nei pressi di Oleggio (NO) dove hanno sostato dal 26/01 al 12/02/2017 (E. Giussani), 26/12/2010 15 indd. Azzate (F. Miglierina rif. G. Zanetti). - (Bianchi et al. 1973) definita di comparsa regolare sui nostri laghi, segnalazioni Laghi Maggiore e Varese anni: 1969 1968 1966 1960 1956 1954 1950 e antecedente 1950.						

- **1** Numero progressivo della specie nella LISTA
- **2** Nome italiano e scientifico della specie

- **3** Fenologia

Per la fenologia si è cercato, in modo particolare per le categorie inerenti la nidificazione, di indicare le caratteristiche della specie in riferimento alla presenza sul territorio provinciale.
Tali categorie fenologiche si ispirano a quelle proposte da "Fasola e Brichetti (1984)" e "Brichetti e Fracasso (2015)", ma con alcune modifiche e adattamenti in relazione alla modalità espositiva adottata:

S = Sedentaria: specie legata per tutto il periodo dell'anno al territorio provinciale nel quale la specie normalmente si riproduce.

Sst = Sedentaria storica: specie sedentaria non più osservata sul territorio provinciale dopo l'anno 2000.

M = Migratrice: specie che compie ogni anno spostamenti dalle aree di riproduzione alle aree di svernamento e viceversa o che effettua movimenti dispersivi o spostamenti a corto raggio. Compare regolarmente o irregolarmente nel territorio provinciale. Essendo questa una lista provinciale si è ritenuto di non associare a tale categoria l'indicazione relativa alla regolarità (specie migratrice regolare o irregolare) e di fare riferimento al solo indice relativo al campo "Frequenza osservazioni / Livello di diffusione". Le specie sia sedentarie che migratrici sono definite con la simbologia (**SM**) cercando, ove possibile, attraverso le note di entrare nel merito della entità della parzialità di una categoria fenologica rispetto all'altra.

B = Nidificante (breeding): specie che si riproduce con certezza in un determinato territorio e che nidifica, o ha comunque nidificato, nel secolo attuale nel territorio provinciale.
Normalmente le specie sedentarie sono definite anche nidificanti (**S B**), a livello provinciale può essere che qualche specie sia stata definita sedentaria non nidificante in considerazione del fatto che la nidificazione non è stata riscontrata in provincia nel secolo attuale ed è possibile che avvenga in zone limitrofe confinanti, oppure la specie è oggetto di interventi di ripopolamento ma non è in grado di auto sostenersi nel territorio provinciale.

B? = Nidificante probabile: specie che probabilmente nidifica, o ha probabilmente nidificato, nel secolo attuale sul territorio provinciale. Questa indicazione fenologica non viene indicata per quelle specie che pur avendo "probabilmente" nidificato in passato (prima del 2001) non hanno avuto alcun riscontro di nidificazione certa o probabile nel secolo attuale.

Bst = Nidificante storica: specie che si è riprodotta con certezza in tempi passati (non in questo secolo) sul territorio provinciale. Può essere associato a **B?** quando ci sono prove di nidificazione probabile nel secolo attuale.

W = Svernante (wintering): specie migratrice (anche parzialmente) che passa l'inverno o parte di esso in un determinato territorio e che poi abbandona per dirigersi verso le aree di nidificazione. A livello provinciale può essere associato anche a specie più correttamente dette "invernali", osservate o osservabili nei mesi di dicembre/gennaio senza necessariamente avere certezza del tempo di permanenza nel territorio provinciale. L'associazione con **"irr" (Wirr) irregolare/occasionale** definisce l'irregolarità, l'occasionalità o la temporaneità della presenza invernale (breve sosta, numero limitato di individui) nella nostra provincia in relazione alle recenti osservazioni.
Per le specie sia sedentarie che migratrici (**SM**), non essendo sempre possibile a livello provinciale per alcune specie stabilire con certezza l'entità della presenza di individui migratori svernanti (non sedentari), viene sempre associato il carattere fenologico **W**.

A = Accidentale: specie che capita in modo assolutamente sporadico, singolarmente o con un numero limitato di individui. Nella LISTA sono state definite accidentali le specie segnalate almeno 1 volta nel secolo attuale e con un massimo di 10 segnalazioni a partire dall'anno 1951 o le specie segnalate sino ad un massimo di 3 volte in questo secolo.
A questa categoria viene associato il numero delle segnalazioni (non individui) documentate nella forma **Ax (y)**, dove "**x**" è il numero delle segnalazioni totali conosciute (comprensive anche di quelle antecedenti il 1951) e "**(y)**" il numero delle segnalazioni relative al solo secolo attuale.
Nella LISTA il carattere fenologico A Accidentale è stato attribuito alle sole specie che rientrano nella casistica sopra indicata e che appartengono, solo o anche, alla lista A delle categorie AERC.

Ast = Accidentale storica: nella LISTA sono state definite accidentali storiche le specie con almeno una segnalazione antecedente l'anno 2001 ma mai segnalate in questo secolo. A questa categoria, quando possibile, viene associato il numero delle segnalazioni documentate.


Int = Introdotta: specie introdotta volontariamente o involontariamente, non necessariamente nel territorio provinciale, che è normalmente in grado di auto sostenersi.

Rip = Ripopolata: specie che è stata introdotta o viene regolarmente introdotta (es. a scopi venatori) e che non è sempre in grado di auto sostenersi all'interno del territorio provinciale (o in certi casi lo è solo parzialmente).

? = Incerto/possibile/mancanza di dati: per indicare incertezze, dubbi, dati non completi o mancanti. Quando associato al carattere fenologico "**B**" ha il significato di "nidificante probabile".

Nella tabella e nel grafico che segue viene indicata la ripartizione dei caratteri fenologici prevalenti delle 347 specie segnalate:

Carattere fenologico	Fenologia	Numero specie
S	Sedentarie	24
M	Migratrici	178
SM	Sedentarie – Migratrici (indipendentemente dalla prevalenza di un carattere fenologico rispetto all'altro)	53
A	Accidentali: massimo 10 segnalazioni dal 1951 o massimo 3 segnalazioni in questo secolo	66
Stor	Accidentali storiche – Sedentarie storiche (Ast Sst): non più osservate in questo secolo	26
		347



- **4** Frequenza osservazioni / Livello di diffusione


La determinazione di questo indice si basa esclusivamente sulle osservazioni relative al periodo 2011 – 2020 (ultimi 10 anni) e per la sua formulazione sono state consultate in modo particolare le segnalazioni contenute nel portale ornitho.it.

L'importanza del portale ornitho.it è confermata dal numero sempre crescente di osservazioni inserite, alla data del 31/12/2020 per le sole specie che rientrano nelle categorie considerate e per la sola provincia di Varese sono presenti oltre 600.000 segnalazioni. Anche se una parte di questi dati è stata inserita con riferimenti antecedenti alla data di attivazione (2009), il numero delle osservazioni diviene particolarmente significativo e stabile a partire dall'anno 2011.

La formulazione di tale campo consente, attraverso l'analisi del numero dei dati e degli anni in cui sono avvenute le segnalazioni, la valutazione di "massima" del livello di diffusione e presenza delle specie osservate e inserite nella LISTA.
Per quanto riguarda questo indice e le relative analisi si devono comunque considerare alcuni aspetti, come l'elusività di alcune specie e la conseguente difficoltà di individuazione, i dati inseriti da più rilevatori in riferimento alla stessa osservazione e la non sempre omogenea distribuzione delle osservazioni sul territorio provinciale.


Di seguito gli indici attribuiti ad ogni specie con le relative spiegazioni, alcuni di questi indici sono ottenuti in relazione alla media annuale delle osservazioni relative al periodo 2011 – 2020.

Molto freq.	Specie osservata molto frequentemente
Freq.	Specie osservata frequentemente o abbastanza frequentemente
Poco freq.	Specie osservata poco frequentemente
Rara	Specie osservata raramente, abbastanza raramente o irregolarmente
Molto rara	Specie con fenologia "Accidentale" osservata almeno 1 volta in questo secolo
Stor.	Specie con fenologia "Accidentale/Sedentaria storica", mai osservata in questo secolo ma solo antecedentemente l'anno 2001



Al fine di determinare i mesi con la maggiore abbondanza di specie nel grafico che segue, relativo al periodo 2009 - 2020, vengono prese in esame tutte le specie complessivamente osservate nei vari mesi dell'anno nel territorio provinciale.

Dall'analisi di tale grafico si individua che il periodo di maggior ricchezza di specie coincide con la fase migratoria pre-riproduttiva nei mesi di aprile e maggio, mentre nella fase migratoria post-riproduttiva i mesi di maggior ricchezza risultano essere settembre e ottobre.
Aprile è in assoluto il mese con il numero maggiore di specie (**244**), gennaio quello con il numero minore (**160**).



NIDIFICANTI

Nella LISTA vengono individuate come NIDIFICANTI "CERTE" o "PROBABILI" le specie segnalate come nidificanti nel secolo attuale e NIDIFICANTI STORICHE le specie di cui si ha notizia di avvenuta nidificazione solo antecedentemente l'anno 2001.

Per i NIDIFICANTI nel secolo attuale i criteri che determinano la "certezza" o la "probabilità" di una nidificazione, pur avendo una logica di assegnazione comune, non sono necessariamente identici tra le varie fonti consultate.

- **5** Gruppo nidificazione

Analizzando periodi recenti e passati, con particolare riferimento per il periodo 2001 - 2009 ad una importante ricerca effettuata in provincia e alla relativa pubblicazione "Atlante Ornitologico Georeferenziato degli uccelli nidificanti in Provincia di Varese periodo 2003 - 2005 (Gagliardi et al., 2007), è stato assegnato un "codice gruppo nidificazione" alle specie nidificanti secondo il seguente criterio:

A	specie nidificanti prima dell'anno 2001 senza alcun dato di nidificazione (probabile o certo) nel secolo attuale
B	specie nidificanti prima dell'anno 2001 con solo dati di nidificazione probabile nel secolo attuale.
C	specie nidificanti nel periodo 2001 - 2009 e anche dopo il 2009.
D	specie nidificanti nel periodo 2001 - 2009 con solo dati di nidificazione probabile dopo il 2009.
E	specie nidificanti nel periodo 2001 - 2009 senza dati di nidificazione probabile o certa dopo il 2009.
F	specie NON nidificanti nel periodo 2001 - 2009 ma nidificanti dopo il 2009.
X	specie che non risultano aver mai nidificato ma con dati di nidificazione probabile nel secolo attuale.

- **6** Ultimo anno nidificazione certa

Viene riportato l'ultimo anno in cui è stata documentata con certezza la nidificazione della specie.

- **7** Note osservazione - Note nidificazione

Le note relative alle osservazioni e alla nidificazione sono state inserite facendo riferimento alle varie fonti consultate.

Le principali fonti possono essere così suddivise:

- Pubblicazioni ornitologiche, le note o le osservazioni relative a questa fonte sono precedute dai riferimenti bibliografici "Autore/i – anno pubblicazione" relativi all'opera descritta in modo completo in "Bibliografia e Fonti consultate". Es. (Bianchi et al. 1973).

- www.ornitho.it, le osservazioni che fanno riferimento a questo portale sono precedute dal simbolo (Ornitho) e sono normalmente poste nella forma dettagliata: data dell'osservazione, numero individui osservati (ind. / indd.) seguito in alcuni casi da "m." maschio "f." femmina "ad." adulto "juv." giovane, località dell'osservazione, nominativi degli osservatori. *Es. (Ornitho) 26/05/2012 1 ind. Dumenza (M.Carabella, F.Pianezza).* Per alcune specie le osservazioni sono indicate nella forma riepilogata: mese/anno delle osservazioni, numero massimo degli individui segnalati in una singola osservazione. *Es. (Ornitho) osservazioni: lug 2013, apr set 2012, mag 2011, max 6 indd. (oss. vari).*

Gli eventuali dati protetti considerati (relativi a specie a pubblicazione limitata o inseriti in modalità protetta) sono sempre stati esplicitamente autorizzati all'uso dall'autore della segnalazione e inseriti senza un riferimento preciso alla località dell'osservazione.

- EBN Italia, le osservazioni che fanno riferimento a questa associazione sono sempre precedute dai simboli di seguito elencati che meglio definiscono la fonte di provenienza:

EBN/an(anno) - in riferimento agli annuari dell'associazione "EBN Italia" pubblicati o reperiti sul relativo sito http://www.ebnitalia.it/ elencati in "Bibliografia e fonti consultate" come da modalità di citazione richiesta. Es. *(EBN/an2005) in rif. a Annuario 2005 (red. L. Ruggieri). Edizioni EBN Italia.*

EBN/BL – in riferimento alla Mailing List dell'associazione EBN Italia "Nodo Lombardia occidentale Birdin' Lombardia" elencata in "Bibliografia e fonti consultate".

EBN/IT – in riferimento alla Mailing List dell'associazione EBN Italia, elencata in "Bibliografia e fonti consultate"

- Dati inediti, segnalazioni prive di riferimenti bibliografici o altre fonti, effettuate da persone o associazioni. Questa tipologia di dato è stata utilizzata in modo limitato e nei casi possibili si è sempre cercato di verificare l'attendibilità.
Sono sempre precedute dal nome dell'autore della segnalazione seguito dalla sigla "rif.".

SPECIE ESCLUSE

Non tutte le specie appartenenti alle categorie A, B, C segnalate recentemente o nel passato in provincia di Varese sono state inserite nella LISTA.

Alcune segnalazioni relative al secolo scorso non sono state considerate (anche se nel passato considerate da alcuni autori), le motivazioni sono diverse:

- assenza di dati certi o comunque documentati.
- osservazioni che risulterebbero avvenute in zone limitrofe ma non nel territorio della provincia di Varese (in particolare lago Maggiore sponda Piemontese o zone di confine in Svizzera).
- notizie o segnalazioni storiche non confermate.

Tutte le specie che rientrano in questo livello di esclusione sono state riportate in fondo alla LISTA nel gruppo SPECIE ESCLUSE.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Per i dati provenienti dal portale ornitho.it, essendo il riferimento del dato il centroide della singola cella di 1 km di lato, è possibile che il perimetro di qualche cella "sconfini" in parte in qualche altra provincia e quindi, per questa ragione, il luogo esatto dell'osservazione potrebbe essere relativo a una provincia limitrofa.

Analogamente, per quanto riguarda le segnalazioni provenienti da fonti diverse e relative a località confinanti con altre province, quando possibile è stata verificata l'appartenenza territoriale delle osservazioni.

In riferimento alle osservazioni recenti, in particolare per le specie rare o accidentali, si è sempre cercato di verificare la correttezza del dato.
La responsabilità dei riferimenti relativi alle osservazioni citate resta comunque a carico dell'osservatore che ha effettuato la segnalazione.

	ANSERIFORMES	*ANATIDAE*				
1	**Oca granaiola**	***Anser fabalis***	Ast	Stor.		

- (Migratori acquatici - anno 1986 n° 4) 15/01/1986 7 indd. Lago di Comabbio.
- (Migratori acquatici - anno 1978 n° 1) 28/11/1977 1 ind. Lago di Varese.
- (Bianchi et al., 1973) definita la più frequente (tra le oche) sui nostri laghi nei mesi di gennaio e febbraio. Gennaio 1968 avvistamenti di piccoli gruppi a Lisanza Lago Maggiore, altre segnalazioni anni: 1965, 1963, 1962, 1960, 1959, 1957, 1956, 1955, 1954.

2	**Oca selvatica**	***Anser anser***	M Wirr	Rara		

- Sicuramente presenti osservazioni di individui di origine non completamente selvatica.
- (Ornitho) osservazioni: gen feb mag 2020, lug 2019, gen mar nov 2018, dic 2016, feb giu ott nov 2013, mag 2014, lug 2010, apr 2006, giu 2005 (oss. vari).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: gen. 2008 2 indd. Lago Varese.
- (Luoni e Scandolara, 2008) una coppia ha nidificato in Palude Brabbia nel 2007 e 2008, ma dubbi sulla selvaticità.
- (EBN/BL) 1/04/2007 1 ind. Lago di Varese (P. e L. Casali), 9/03/2007 2 indd. Lago di Varese (P. e L. Casali), 2/03/2007 2 indd. Palude Brabbia (A. Boto), 31/03/2006 3 indd. Ispra (P. Casali).
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 1 ind. da gen. a mar. 1999 fiume Ticino, gen. 1999 per 2 settimane 9 indd. Lago di Comabbio, dal 27/02/2000 al 19/03/2000 3 indd. Palude Brabbia e Lago Varese.
- (Bianchi et al., 1973) definita specie molto scarsa, segnalazioni anni: 1967, 1963?, 1954, passo straordinario inverno 1929.

3	**Oca lombardella**	***Anser albifrons***	A? (2)	Molto rara		

- (Ornitho) 29/01/2017 38 indd. Fiume Ticino Lonate Pozzolo osservate in volo provenienti da una zona nei pressi di Oleggio (NO) dove hanno sostato dal 26/01 al 12/02/2017 (E. Giussani), 26/12/2010 15 indd. Azzate (F. Miglierina rif. G. Zanetti).
- (Bianchi et al., 1973) definita di comparsa regolare sui nostri laghi, anche in marzo durante il ripasso è abbastanza frequente osservare qualche esemplare in transito. Segnalazioni Laghi Maggiore e Varese anni: 1969 1968 1966 1960 1956 1954 1950 e antecedenti 1950.

4	**Oca del Canada maggiore**	***Branta canadensis***	M Int	Rara		

- Specie appartenente alle cat. C5 E4 - sp. naturalizzata avventizia (esotiche, giunte spontaneamente da popolazioni naturalizzate all'estero) o rilasciata/sfuggita con eventi riproduttvi in natura (Baccetti et al., 2014).
- Possibile provenienza da popolazioni estere o da alcune regioni italiane (Lazio, Veneto, Emilia-Romagna) dove la specie si è naturalizzata, anche se non si può escludere la provenienza non selvatica.
- (EBN/IT) 6/08/2004 1 ind. foce Tresa Germignaga, individuo poco confidente e apparentemente selvatico (M. Viganò)

5	**Oca colombaccio**	***Branta bernicla***	Ast	Stor.		

- (Bianchi et al., 1973) definita accidentale e rara, notevole afflusso di questa specie nei mesi di gen. feb. dic. 1906, gen. 1907 e feb. 1927.

6	**Oca facciabianca**	***Branta leucopsis***	A1 (1)	Molto rara		

- Specie appartenente alle cat. A E3 - sp. apparentemente selvatica osservata almeno 1 volta dal 1950 o rilasciata/sfuggita (Baccetti et al., 2014).
- (Ornitho) 16/04/2018 1 ind. Buguggiate lago Varese (R. Aletti et al.) osservata inizialmente posata, si alza poi in volo a notevole altezza e sparisce in direzione NE; considerando tempo di permanenza e comportamento probabile individuo di origine selvatica o derivante da popolazioni naturalizzate presenti in alcuni stati europei, in particolare Germania, Olanda e Belgio.
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: da febbraio 1997 a aprile 1998 1 ind. fiume Ticino Sesto Calende (quasi certamente aufuga considerando comportamento e lunga permanenza).
- (Bianchi et al., 1973) definita eccezionalmente rara. Viene indicata una sola cattura avvenuta nel 1878 sul Ceresio, ma nei pressi di Lugano Svizzera.

7	Oca collorosso	*Branta ruficollis*	Ast2	Stor.		

- (Bianchi et al., 1973) definita accidentale e rara: 9/02/1954 2 indd. insieme a 8 germani reali sul Lago di Varese, 9/11/1953 1 ind. ucciso Lago di Varese.

8	Cigno nero	*Cygnus atratus*	M Wirr Int	Rara		

- Specie introdotta o fuggita alla cattività e acclimatata in alcune nazioni europee compresa l'Italia.
- (Ornitho) le poche segnalazioni post 2002 sono tutte relative a Lago Maggiore, Fiume Ticino e Lonate Pozzolo.

9	Cigno reale	*Cygnus olor*	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Specie introdotta in Lombardia nei primi decenni del 1900 a scopo ornamentale, in provincia è andata sempre piu diffondendosi a partire dagli ultimi anni del secolo scorso, in particolare sul Lago Maggiore, Lago di Lugano e Lago di Varese.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 191 (IWC gennaio 2018).

●Note nidificazione:

- (Tosi e Zilio, 2002) nel periodo 1998-2000 stimata una popolazione provinciale intorno alle 40 coppie così ripartite: 15 sul Lago Maggiore, 12 sul Lago di Varese, 2-3 sul Lago di Comabbio, 2-3 sul Lago di Monate, 1-2 sul Fiume Tresa, 1-2 sul Fiume Ticino e 1 nella Palude Brabbia.

10	Cigno minore	*Cygnus columbianus*	Ast2	Stor.		

- (Migratori acquatici - anno 1979 n° 1) 6/02/1978 4 indd. loc. Bruschera Angera Lago Maggiore.
- (Bianchi et al., 1973) definito accidentale e rarissimo. "Qualcuno comparve sul Lago Maggiore insieme ad altri cigni selvatici il 7/02/1954 (Mart. pag. 308)". (N.d.R. questa segnalazione indicata in riferimento a "Martorelli, 1960 – Gli uccelli d' Italia terza edizione riveduta ed aggiornata dal dr. Edgardo Moltoni. Edizioni Rizzoli" non è stata riscontrata).
- (Martorelli, 1960) nelle note dei revisori viene indicato 1 ind. femm. ucciso il 19/01/1929 a Lisanza sul lago Maggiore e donato dal dott. Carlo Belfanti al Museo Civico di Milano.

11	Cigno selvatico	*Cygnus cygnus*	A9 (1)	Molto rara		

- (A. Viganò rif.) dal 30/07/2007 al 6/09/2007 1 ind. Lago di Varese (N.d.R. non si esclude la possibile origine aufuga).
- (Bianchi et al., 1973) definito di comparsa relativamente frequente sui nostri bacini maggiori. Segnalazioni documentate: 29/12/1968 1 ind. medio Verbano, 22/03/1968 2 indd. Angera, gennaio 1963 5 indd. a Nord del Ponte di Oleggio, 4/03/1960 3 indd. Lago di Varese, gennaio 1938 alcuni individui Lago Maggiore, inverno 1935/1936 1 ind. catturato a Lisanza, 19/01/1929 1 ind. f. catturato a Lisanza.
- (Belfanti, 1935) 18/12/1933 2 indd. Lago Maggiore.

12	Oca egiziana	*Alopochen aegyptiaca*	M Wirr Int	Rara		

- Specie africana appartenente alle cat. C4 D1 E4 - sp. introdotta e naturalizzata, dubbi sulla provenienza selvatica, rilasciata o sfuggita con eventi riproduttivi in natura (Baccetti et al., 2014).
- Naturalizzata in alcune province italiane, tre segnalazioni provinciali post 2009: (Ornitho) 1/08/2018 1 ind. fiume Ticino Sesto Calende (C. Danesi), 7/12/2017 1 ind. Lago di Comabbio (L. Giussani), 19 e 22/04/2015 2 indd. Lonate Pozzolo (A. Nicoli, D. Bernasconi).
- (Zenatello et al., 2014) censimenti invernali IWC 2006: 2 indd. Fiume Ticino tratto 1.

13	**Volpoca**	*Tadorna tadorna*	M Wirr	Poco freq.		

- La quasi totalità delle recenti osservazioni è relativa al Lago Maggiore, Lago di Varese e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo, la specie risulta scarsamente ma più frequentemente osservata rispetto al secolo scorso.
- Interessante numero di individui osservati: 11/11/2006 20 indd. Lago Ceresio (R. Lardelli-EBN/BL).
- (A. Viganò rif.) 7/01/2008 e 12/07/2008 1 ind. loc. Arnetta Lonate Pozzolo, 6/09/2007 11 indd. loc. Arnetta Lonate Pozzolo, 3/04/2007 1 ind. loc. Arnetta Lonate Pozzolo.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: 1998 11 indd. Lago Maggiore, 2001 2 indd. Lago di Lugano, 2010 2 indd. Lago di Lugano.
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 19/09/1997 2 indd. Lago di Varese.
- (F. Casale rif.) 9/03/1982 1 ind. fiume Ticino Somma Lombardo.
- (Bianchi et al., 1973) definita specie invernale di comparsa accidentale, segnalazioni anni: 1968, 1910, 1901?, 1838.
- (Martorelli, 1960) nell'inverno 1910 a Lisanza lago Maggiore fu catturato un esemplare di questa specie dal dott. Carlo Belfanti.
- (Riva, 1860) il Prof. Balsamo Crivelli segnala che nel gennaio del 1838 alcuni individui sono stati presi sul lago di Varese.

14	**Casarca**	*Tadorna ferruginea*	M Wirr Int	Rara		

- Specie introdotta o fuggita alla cattività. Non si può comunque escludere l'osservazione di qualche individuo proveniente da popolazioni naturalizzate in seguito all'introduzione a scopo ornamentale in alcuni paesi europei. Nella vicina Svizzera in certi periodi dell'anno sono comunque presenti gruppi di diverse centinaia di individui.
- Sono note in provincia alcune segnalazioni post 2003, alcuni indd. sicuramente aufughi.

15	**Anatra mandarina**	*Aix galericulata*	SM B W Int	Poco freq.	F	2016

- Specie appartenente alle cat. C5 E4 - sp. naturalizzata avventizia (esotiche, giunte spontaneamente da popolazioni naturalizzate all'estero) o rilasciata/sfuggita con eventi riproduttvi in natura (Baccetti et al., 2014).

●Note nidificazione:

- Ha occasionalmente nidificato nel territorio provinciale, segnalazione di qualche individuo di origine incerta in particolare nei mesi invernali.

Prime nidificazioni conosciute:

- (Ornitho) 18/05/2016 1 ind. f. ad. con 3 pulcini Palude Brabbia (G. Taverna).
- (Casale, 2015) 25/09/2014 22 indd. dei quali la maggior parte giovani, Lagozza di Besnate (F. Casale).

16	**Canapiglia**	*Anas strepera*	M W B S?	Freq.	C	2019

- Specie essenzialmente migratrice, possibile che qualche individuo si fermi tutto l'anno nelle zone umide della provincia in particolare Lago di Varese e Palude Brabbia, inverno e primavera i periodi di maggior presenza.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 107 (IWC gennaio 2020).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, inizialmente contattata sul Lago di Lugano nel 1995 ha poi iniziato un lento incremento con ampie fluttuazioni.
- (Bianchi et al., 1973) definita di doppio passo, invernale, scarsa. Sul lago Maggiore si possono trovare con più facilità nel bacino meridionale.

●Note nidificazione:

- Tutte le recenti nidificazioni si riferiscono alla Palude Brabbia, Lago di Varese e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 ha nidificato nella Palude Brabbia, si segnalano con certezza 2 coppie nidificanti.
- (Tosi e Zilio, 2002) nella ricerca SIT-Fauna 1997/2000 viene segnalata come nidificante a partire dal 1996 nella Palude Brabbia, con 2-3 femmine per stagione riproduttiva.

17	Fischione	*Anas penelope*	M W	Poco freq.		

- Numero massimo delle osservazioni nel periodo invernale, in particolare mese di gennaio.
- Interessante presenza per il periodo: dal 30/06 al 12/07/2018 1 ind. Lonate Pozzolo (L. Prada, L. Pini/Ornitho).
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 14 (IWC gennaio 2017).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, 2005 3 indd. Palude Brabbia, 2002 8 indd. Lago Monate e Lago Maggiore.
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: tra febbraio 1997 e marzo 2000 69 indd. avvistati.

18	Germano reale	*Anas platyrhynchos*	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Il numero massimo di presenze viene raggiunto nel periodo invernale e durante le fasi migratorie, dove agli individui residenti si aggiungono svernanti e migratori. Non sempre possibile la determinazione certa degli indd. selvatici considerando la presenza di indd. di provenienza domestica con piumaggio similare al fenotipo selvatico.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 1534 (IWC gennaio 2012).

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 viene individuato come l'anatide più diffuso, presente in quasi tutte le zone umide della provincia. La porzione centrale del territorio provinciale è quella di maggior presenza della specie.

19	Mestolone	*Anas clypeata*	M W Bst	Poco freq.	A	1978

- Principalmente osservato durante la migrazione primaverile (marzo aprile), meno frequentemente nella migrazione post-riproduttiva e nei mesi invernali.
- Interessante numero di individui osservati: 5/04/2019 58 indd Lago di Varese (R. Aletti/Ornitho).
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 21 (IWC gennaio 2011).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, censito in 3 anni su 25: 2007 2 indd. Palude Brabbia, 1999 1 ind. Palude Brabbia, 1999 1 ind. Lago Maggiore, 1993 1 ind. Lago di Lugano.
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: osservazioni numericamente significative il 24/03/1997 205 indd. Lago di Comabbio e 22/03/1999 157 indd. Lago di Varese.

●Note nidificazione:

- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Realini, 1982) 10/06/1978, prima e unica segnalazione della provincia, avvistamento dei piccoli (E. Zanon) nei pressi dell'Isolino Virginia Lago di Varese.

20	Codone	*Anas acuta*	M Wirr	Poco freq.		

- Numero massimo osservazioni mesi da gennaio a aprile.
- Interessante numero di individui osservati: 29/02/2020 22 indd. Lonate Pozzolo (L. Giussani, J. Ferrario/Ornitho).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, 3 soli indd. censiti nel corso dei 25 anni: 2002 1 ind. fiume Ticino, 2009 1 ind. Lago Maggiore e 1 ind. Lago di Lugano.

21	**Marzaiola**	*Anas querquedula*	M B	Poco freq.	C	2020

- Principalmente osservata durante la migrazione primaverile (marzo e aprile), meno frequentemente nella migrazione post-riproduttiva (agosto e settembre).

●Note nidificazione:

- (Ornitho) 22/05/2020 coppia con 4 pulcini Cislago (N. Larroux), 21/05/2019 coppia con 11 pulcini Cislago (N. Larroux).
- (Laddaga e Casale, 2014) giugno 2013 femm. con 6 pulli Palude Brabbia (L. Laddaga).
- (Ornitho) 13/06/2009 > 8 indd. (femm. con pulli) Palude Brabbia (A. Prestileo), 11/08/2001 8 indd. (adulti con pulli) Palude Brabbia (L. Colombo).
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 è risultata nidificare con certezza nel 2003 sulle sponde del Lago di Varese e nel periodo della ricerca probabilmente anche all'interno della Palude Brabbia.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) rinvenuta nidificante in Palude Brabbia, sia nel 1983 (4 pulli con adulti) che nel 1986 (3 pulli).
- (Brichetti, 1984) femmina con pulli in Palude Brabbia nel 1984.
- (Realini, 1982) "intorno al 1980, una colonia di sette - otto coppie sostò a nidificare in maggio nei prati confinanti con la Palude Brabbia sotto Inarzo" (L. Ghiringhelli rif.).
- (Bianchi et al., 1973) si segnala che diverse coppie si fermano a nidificare nelle paludi e nei prati paludosi che costeggiano i nostri laghi. Negli ultimi anni comunque in progressiva diminuzione.

22	**Alzavola**	*Anas crecca*	M W B	Freq.	D	2007

- Le maggiori presenze durante la migrazione e nel periodo invernale.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 130 (IWC gennaio 2013).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, durante i 25 anni di censimento il numero massimo di individui è stato osservato nella Palude Brabbia (max 193 indd. nel 2004) e in misura notevolmente minore sul Lago di Varese.

●Note nidificazione:

- Dal 2010 solo dati di nidificazione probabile.
- (EBN/IT) 13/08/2007 osservata f. ad. con 1 pullo Palude Brabbia (P. Casali).
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è risultata nidificante con certezza sulla riva nord occidentale del Lago di Varese. Una coppia è stata seguita giornalmente da metà maggio fino alla prima settimana di giugno 2003, quando molto probabilmente si è allontanata in seguito alla distruzione del nido (Zanetti P. e G., Molinari, com. pers.).
- (Tosi e Zilio, 2002) nella ricerca SIT-Fauna 1997/2000 viene indicata come probabile la nidificazione, sia pure saltuaria, di 1-2 coppie nella Palude Brabbia.
- (Bianchi et al., 1973) ha sempre nidificato, più o meno frequentemente, soprattutto nel periodo anteguerra e fin verso il 1960, quando le rive dei laghi erano in gran parte a prato o a coltivo. Nei prati compresi tra la "Bruschera" di Angera e Lisanza ed il paese di S. Anna, in particolare dal 1930 al 1950, con frequenti ritrovamenti annuali di nidi e nidiate di alzavole e marzaiole. Altri casi di nidificazione nella Piana di Portovaltravaglia, Castelveccana e nella Bozza di Monvalle.

23	**Fistione turco**	*Netta rufina*	M Wirr B	Poco freq.	C	2020

- Punte massime delle osservazioni mesi di marzo, aprile e agosto.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, risulta l'anatra svernante più rara della provincia di Varese, 1991 1 ind. fiume Ticino, nessun individuo censito nel corso degli IWC 1998-2010.
- (Bianchi et al., 1973) specie fino a circa un ventennio fa considerata quasi rara ma attualmente in aumento e di doppio passo quasi regolare ogni anno, soprattutto sul Lago Maggiore.

●Note nidificazione:

- (G.I.O.) Le recenti segnalazioni (post 2009) di adulti con pulli sono relative a Lago Maggiore e Lago di Varese.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene indicata come nidificante sul Lago di Varese dal 1998 sino al 2004 con un numero di coppie variabile da 1 a 4.

24	**Moriglione**	*Aythya ferina*	M W B	Freq.	C	2020

- I periodi di maggior presenza sono quello autunnale e invernale.
- Interessante numero di individui osservati: 6/02/2020 126 indd. (102 m. e 24 f.) Cazzago Brabbia Lago di Varese (R. Aletti/Ornitho).
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 85 (IWC gennaio 2020).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, con l'eccezione del Lago di Comabbio e della Palude Brabbia è risultato discretamente diffuso nel corso dei censimenti IWC. Dalle poche decine di indd. censiti a partire dal 1987 si è arrivati con ampie fluttuazioni ai 334 indd. nel 2007. Riscontrata diminuzione nell'ultimo biennio 2009-2010.

●Note nidificazione:
- Le recenti nidificazioni (post 2014) sono relative alle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 osservata a fine luglio 2003 una femmina con due pulli alla foce del fiume Bardello sul Lago Maggiore.
- (Realini, 1982) a partire dal 1975 una coppia ha nidificato regolarmente nella Palude Brabbia. Nel 1977 sarebbero nati 7 piccoli; dieci nel 1978 (L. Ghiringhelli rif.).

25	**Moretta tabaccata**	*Aythya nyroca*	M W B S?	Freq.	C	2020

- Specie essenzialmente migratrice, possibile che qualche individuo si fermi tutto l'anno nelle zone umide della provincia, in particolare Palude Brabbia e Lago di Varese. Punte massime di osservazioni mesi marzo e aprile.
- Censimenti invernali IWC: numero massimo indd. censiti 114 (IWC gennaio 2020).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, censita la prima volta nel 1998 1 ind. Lago Maggiore, 2001 1 ind. Lago Maggiore, 2002 5 indd. Lago di Varese, dal 2003 al 2006 3 indd. Palude Brabbia, 2007 3 indd. Lago di Varese, 2008 1 ind. Lago di Varese.

●Note nidificazione:
- Le recenti nidificazioni (post 2010) sono relative al lago di Varese e alle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo.
- (Clarizio et al., 1991) la prima riproduzione accertata in Lombardia risale agli inizi degli anni '90 in Palude Brabbia.

26	**Moretta dal collare**	*Aythya collaris*	A1 (1)	Molto rara		

- (EBN/an2007) dal 24/12/2006 al 24/04/2007 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua, A. Turri et al.).

27	**Moretta**	*Aythya fuligula*	M W B	Freq.	C	2020

- Le maggiori presenze si ricontrano nel periodo novembre/marzo.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 136 (IWC gennaio 2017).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, tendenza crescente nei 25 anni di censimento, si raggiunge il massimo nel 2006 con 482 indd. per calare a circa 200 nel biennio 2009-2010.

●Note nidificazione:
- Le recenti nidificazioni riscontrate (post 2014) sono relative alle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo.
- (EBN/IT) 15/06/2002 osservata femm. ad. con 7 pulli Palude Brabbia (P. Casali).
- (Laddaga e Casale, 2014) una coppia ha nidificato negli anni 2000 in Palude Brabbia (A. Viganò com. pers.).
- (Realini, 1982) agosto 1978 osservata presenza di giovani Lago di Varese (E. Zanon), maggio 1980 avvistamento 5 piccoli Lago di Comabbio (S. Moalli).

28	**Moretta grigia**	*Aythya marila*	M Wirr	Rara		

- (Ornitho) osservazioni: gen feb 2019, gen feb mar 2017, feb dic 2013, gen nov 2006, gen 2005 max 6 indd. (oss. vari).
- (EBN/BL) 28-29/12/2013 4-6 indd. Ispra (P. Bonvicini, L. Marocchi et al.), 20/01/2008 3 indd. Sesto Calende (A. Nicoli), 4/12/2007 4 indd. fiume Ticino Golasecca (A. Nicoli), 9/03/2007 1 ind. Lago di Varese (P. e L. Casali).
- (A. Viganò rif.) 21/03/2005 3 indd. Lago di Varese, 12/03/2000 5 indd. Lago Maggiore.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: 1994 e 1998 1 ind. Lago di Ganna, 1995 3 indd. Lago di Lugano, 1997 e 2002 1 ind. Lago di Lugano, 2002 10 indd. Lago Maggiore (N.d.R. in Saporetti e Carabella, 2012 è erroneamente indicato Lago Varese).
- (F. Casale rif.) 1-2 indd. a Somma lombardo: feb 1982, feb 1986, mar 1987, gen feb dic 1988.
- (Bianchi et al., 1973) definita invernale di comparsa accidentale e irregolare, segnalazioni anni: 1968, 1963, 1954, 1951, 1948, 1937, 1933.

29	**Edredone**	*Somateria mollissima*	A10 (4)	Molto rara		

- (Ornitho) inverno 2011-2012 (data non precisa) 1 ind. osservato da A. Genoni dal kayak nei pressi di Sesto Calende (rif. F. Casale).
- (EBN/an2008) 21/09/2008 1 ind. Germignaga (O. Brambilla).
- (EBN/an2006) 17/11/2006 1 ind. m. Brusimpiano (P. Casali, L. Marocchi).
- (Casale, 2015) 23/09/2002 2 indd. fiume Ticino Somma Lombardo (F. Casale, A. Genoni).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: anni 1991 1993 1994 1995 1996 2001 2003 1 ind. f. Lago di Lugano (sempre lo stesso soggetto, probabile origine aufuga, non considerato).
- (Migratori acquatici - anno 1979 n° 1) 20/12/1978 4 indd. Lago Maggiore, 25/02/1978 1 ind. Lago Varese.
- (Migratori acquatici - anno 1978 n° 1) 30/11/1977 1 ind. m. juv. Lago di Varese.
- (Bianchi et al., 1973) definito accidentale e rarissimo, segnalazioni documentate: 4/10/1968 1 ind. catturato a Lisanza, novembre 1922 2 indd. insediati da alcuni cacciatori a Sesto Calende, marzo 1912 1 ind. catturato tra Lisanza e Arona.

30	**Orco marino**	*Melanitta fusca*	M W	Poco freq.		

- Specie osservata quasi esclusivamente nei mesi invernali, in particolare Lago Maggiore e meno frequentemente Lago di Varese.
- Interessante numero di individui osservati: 19/02/2008 29 indd. S. Anna Sesto Calende (A. Nicoli-EBN/BL).
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 14 (IWC gennaio 2019).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: censito inizialmente nel 1995 diviene regolarmente svernante nel decennio 2000-2010 sul Lago Maggiore e in misura minore e più sporadicamente sul Lago di Varese, numero massimo individui censiti 27 nell'anno 2002.
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: da nov. 1997 a mar. 1998 3-6 indd. Lago di Varese, 10/12/1998 7 indd. Lago Maggiore, 9/01/2000 3 indd. Lago Maggiore.
- (Bianchi et al., 1973) specie estremamente nordica di comparsa prevalentemente invernale e relativamente rara fino a circa un decennio fa. Sembra in progressivo aumento con il passare degli anni.

31	**Orchetto marino**	*Melanitta nigra*	M Wirr	Rara		

- Osservazioni in numero sempre limitato di indd., in particolare Lago Maggiore nel periodo dicembre/aprile.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, censita solo in tre anni su 25 e quasi esclusivamente sul Lago Maggiore max 3 indd., anni: 2008, 2006, 2002.
- (EBN/an2007) 2/12/2007 al 27/02/2008 2-3 indd. Sesto Calende (A. Nicoli, A. Turri et al.).
- (EBN/an2006) 26/03/2006 1 ind. Ispra (E. Giussani), 8/01/2006 Sesto Calende (F. Luoni, A. Viganò).
- (EBN/an2005) dal 8 al 28/12/2005 1 ind. Lisanza (E. Giussani, G. Crosta et al.).
- (Bianchi et al., 1973) specie definita rara o scarsa, segnalazioni anni: 1968, 1967, 1954, 1932, 1930, 1898, 1887.

32	**Moretta codona**	*Clangula hyemalis*	A12 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) dal 7 al 24/12/2013 1 ind. m. Brebbia/Besozzo Lago Maggiore (M. Carabella, L. Colombo et al.).
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 28/03/1999 1 ind. Lago Maggiore, dal 23/11 al 11/12/1998 3 indd. laghi Comabbio e Varese, 12/03/1997 1 ind. Lago Lugano.
- (Fornasari et al.,1992) (R. Lardelli) citate generiche osservazioni ed indizi di svernamento laghi Verbano, Ceresio e Varese.
- (Migratori acquatici - anno 1986 n° 4) 18/01/1986 1 ind. Lago di Comabbio.
- (Migratori acquatici - anno 1979 n° 1) 9/12/1978 1 ind. Lago Varese.
- (Bianchi et al., 1973) definita accidentale rara sui laghi della provincia, 22/12/1967 5 indd. (2m e 3f) catturati a Lisanza, 2/02/1963 3 indd. Reno Lago Maggiore, dicembre 1956 2 indd. Ranco Lago Maggiore, 26/04/1936 2 indd. Lisanza, 24/12/1931 1 ind. Lago di Varese, novembre 1901 1 ind. fiume Ticino.

33	Quattrocchi	*Bucephala clangula*	M W	Poco freq.		

- Osservazioni solitamente nei mesi invernali, in particolare Lago Maggiore e Lago di Varese.
- Interessante osservazione per il periodo: 30/08/2015 1 ind. Monvalle Lago Maggiore (A. Madella/ Ornitho).
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 15, tutti Lago di Varese (IWC gennaio 2017).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: specie rara ma costante sino al 2004. Presente in particolare sul fiume Ticino e osservata alcuni anni sui laghi Maggiore, Lugano e Varese.
- (Casale, 2015) dal 1985 al 2004 ha regolarmente svernato nel tratto del fiume Ticino tra le dighe di Porto della Torre e della Miorina, con numeri che hanno raggiunto il massimo di 26 indd. (F. Casale).

34	Pesciaiola	*Mergellus albellus*	M Wirr	Rara		

- (Ornitho) 29/11/2014 2 indd. Angera Lago Maggiore (F. Saporetti, A. Vidolini, D. Casola), 9/05/2014 1 ind. f. Gorla Minore (P. Monti), 5/01/2002 3 indd. Sesto Calende (L. Giussani).
- (EBN/BL) 25/01/2006 1 ind. m. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (L. Stefanazzi).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: 2002 1 ind. Lago di Varese, 1991 1 ind. fiume Ticino.
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 17/12/1999 1 ind. foce canale Brabbia Lago di Varese.
- (A.Viganò rif.) dal 18/11/1997 al 22/12/1997 1 ind. fiume Ticino, 14/02/1997 1 ind. fiume Ticino.
- (Fornasari et al., 1992) (R. Lardelli) gennaio 1990 1 ind. fiume Ticino nei pressi di Sesto Calende (INBS in verbis), gennaio 1987 1 ind. Lago Maggiore.
- (Bianchi et al., 1973) definita assai scarsa, segnalazioni Fiume Ticino Laghi Maggiore e Varese: 1967 1963 1955 1957 1950 1944 1929.

35	Smergo maggiore	*Mergus merganser*	SM B W	Freq.	C	2020

- Specie di recente immigrazione, sedentaria solo parzialmente in particolare Lago Maggiore.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 174 (IWC gennaio 2018).
- Per alcuni anni a partire dal 2010 la popolazione è stata monitorata con il «Progetto Smergo» in tutti i maggiori laghi e fiumi del Nord Italia, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia. I rilievi, coordinati per la provincia di Varese dal GIO ed effettuati lungo la sponda lombarda del Lago Maggiore e sui fiumi Tresa e Margorabbia, sono stati effettuati nei mesi di aprile (per rilevare le coppie potenziali) e in giugno (per contare le covate).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, a partire dall'anno 2000 con alcune fluttuazioni si registra una crescente progressione numerica (max 41 indd. Nel 2008).

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nel 2003 è stata accertata per la prima volta la nidificazione in provincia di Varese.

36	Smergo minore	*Mergus serrator*	M Wirr	Poco freq.		

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al Lago Maggiore nel periodo invernale, indd. isolati o gruppetti di pochi individui.
- Interessante numero di individui osservati: 12/04/2019 7 indd. tipo f. Monvallina Lago Maggiore (R. Aletti/Ornitho).
- Interessante tempo di permanenza: dal 31/01 al 3/03/2018 5 indd. f. Ranco-Ispra lago Maggiore (J. Ferrario et al./Ornitho).
- Interessante presenza per il periodo: 3/08/2007 1 ind. Germignaga fem./juv. (M. Viganò-EBN/BL).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti IWC 1986-2010: Lago Maggiore 3 indd. anni 2000 e 2008 e 1 ind. anni 2002 2007 2010, Lago di Varese 1 ind. anno 2001, fiume Ticino 1 ind. anno 2002.
- (Bianchi et al., 1973) viene segnalato di comparsa regolare e relativamente frequente sul Lago Maggiore, sugli altri laghi scarso e con frequenza irregolare.

37	Gobbo della Giamaica	*Oxyura jamaicensis*	M Wirr Int	Rara		

- Specie appartenente alla cat. C5 - sp. naturalizzate avventizie "esotiche, giunte spontaneamente da popolazioni naturalizzate all'estero" (Baccetti et al., 2014).
- (EBN/an2007) 6/04/2007 1 ind. f. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua, A. Turri et al.).
- (EBN/an2006) dal 29/10/2006 al 19/11/2006 1 ind. f. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua, A. Turri et al.).
- (Ornitho - EBN/an2005) dal 14/10/2005 al 24/12/2005 1 ind. f. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (P. Alberti et al.), dal 1/01/2005 al 11/03/2005 2 indd. f. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua, A. Giusto, M. Viganò et al.).

38	**Gobbo rugginoso**	***Oxyura leucocephala***	Ast3	Stor.		

- (Bianchi et al., 1973) Marzo 1971 1 ind. f. catturato a Ranco (F. Realini rif.), 22/09/1960 1 ind. Lago Maggiore tra Ispra e Belgirate (F. Realini rif.), 3/01/1934 1 ind. osservato a Lisanza (R.I.O. 1934, 82, Belfanti).

	GALLIFORMES	*ODONTOPHORIDAE*				
39	**Colino della Virginia**	***Colinus virginianus***	S B Int	Poco freq.	C	2018

- Specie introdotta a scopo venatorio intorno agli anni '80 del secolo scorso.
- (Brichetti e Cambi, 1983) ben rappresentato nelle province di Milano e Varese (soprattutto brughiere).

●Note nidificazione:
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 risulta stabilmente insediata nella porzione meridionale della provincia, valle del Ticino confinante con la provincia di Milano e brughiera residua a sud della Malpensa.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983-1987 inizialmente relegata nella parte sud-occidentale del territorio (medio e alto corso del Ticino e Valle Bagnoli) si è poi progressivamente diffusa in alcune zone di poco più a nord. Nidifica sia in habitat asciutti, coltivi alberati alternati a boschetti di robinia e zone di brughiera, sia in habitat relativamente umidi.

	GALLIFORMES	*PHASIANIDAE*				
40	**Francolino di monte**	***Tetrastes bonasia***	Sst Bst	Stor.	A	anni '70

- Specie sedentaria non piu' contattata dopo l'anno 2000.
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: alto Luinese, indagine effettuata mediante l'impiego di richiamo acustico, anni 1999-2000 censito 1 ind. m. ad.
- (Realini, 1988b) "Presente in alta Val Molinera sino al 1974" (A.A.V.V. 1984).
- (Brichetti e Cambi, 1982) la sua distribuzione attuale lo vede assente dalla provincia di Varese dall'inizio degli anni Settanta.
- (Bianchi et al., 1973) nessun dato preciso, segnalata in tempi precedenti su alcune montagne del Varesotto.

41	**Fagiano di monte**	***Lyrurus tetrix***	S B? Bst	Rara	B	1984

- Numero limitato di individui presenti nella parte settentrionale della provincia, lungo il confine con la Svizzera in contatto con individui del Canton Ticino, valli Veddasca e Dumentina.
- (A. Gagliardi rif.) censimenti annuali effettuati nella zona settentrionale della provincia:
(a cura C.A.N.V.) 2019 20 indd. (13 m. 7 f.), 2018 18 indd. (12 m. 6 f.), 2017 22 indd. (16 m. 6 f.), 2016 23 indd. (14 m. 9 f.), 2015 24 indd. (17 m. 7 f.), 2014 20 indd. (16 m. 4 f.), 2013 9 indd. (9 m.);
(a cura Univ. Studi Insubria e C.A.N.V.) 2012 20 indd. (16 m. 4 f.), 2011 21 indd. (16 m. 5 f.).
- (Gagliardi et al., 2007) censimenti anni 2005 e 2006 relativi alla fascia territoriale montana - subalpina al confine con la Svizzera: 2005 11 indd. m. in 4 arene di canto, 2006 12 indd. m. in 6 arene di canto.
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna periodo 1997-2000 Comprensorio Alpino Nord Verbano conteggi annuali: 1997 27 indd., 1998 19 indd., 1999 22 indd., 2000 23 indd.
- (Brichetti e Fasola, 1990) nel 1983 censite 9 arene e 13 maschi (P. Brichetti).

●Note nidificazione:
- Specie sedentaria senza dati documentati di nidificazione certa in questo secolo, solo dati probabili.
- (Realini, 1988b) Stimate 5-6 nidiate annue tra Val Veddasca e alta Val Dumentina, con popolazione regolare e costante (A.A.V.V. 1984).
- (Realini, 1982) una decina di coppie nidificanti stimate ripartite tra Forcora e Lema (A. Provini).
- (Bianchi et al., 1973) segnala l'osservazione di un abitante di Marchirolo che nella primavera del 1951 scoprì e seguì nella crescita una coppia con 8 piccoli nella zona di San Paolo in Colma a circa 1000 m. di altezza.

42	Coturnice	*Alectoris graeca*	S B	Rara	E	2005

- (Ornitho) 18 e 31/07/2020 1-2 indd. Alta Veddasca (D. Zaro).
- (A. Gagliardi rif.) Alta Veddasca: 6/10/2019 5 indd. osservati da alcuni cacciatori durante una uscita di caccia al camoscio, 9/05/2010 censimento a cura C.A.N.V. 5 indd. censiti.
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000 Comprensorio Alpino Nord Verbano conteggi annuali: 1997 0 indd., 1998 5 indd., 1999 9 indd., 2000 6 indd.
- (Realini, 1982) "Un tempo diffusa un po' dovunque sulle nostre montagne più alte, ora ridotta a pochi soggetti autoctoni, accanto ad esemplari recentemente importati dal Trentino e alla chukar".
- (A. Viganò rif.) inverno 1977 3 indd. monte Campo dei Fiori Tre Croci (oss. Aldo Viganò).
- (Bianchi et al., 1973) confinata in località ristrette ed impervie della dorsale del Campo dei Fiori, del Piambello, della Valtravaglia e dell'Alta Val Veddasca. Dai registri di caccia del Parroco di Montegrino Don Giulio Moroni redatti dal 1847 al 1893 risultava assai abbondante negli alpeggi di Maccagno, Val Veddasca e Sasso Galletto.

●Note nidificazione:

- Dal 2010 nessun dato di nidificazione certa o probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la presenza risulta stabile nell'area più settentrionale della provincia con un numero di coppie non superiore alla decina.
- (Brichetti e Cambi, 1983) per quanto riguarda la provincia di Varese il numero delle coppie superstiti viene definito irrilevante.

43	Coturnice orientale	*Alectoris chukar*	S Rip	Rara		

- Le poche osservazioni si riferiscono a individui ripopolati a scopo venatorio di cui non si hanno notizie di nidificazione.

44	Pernice rossa	*Alectoris rufa*	S Rip	Rara		

- Le osservazioni si riferiscono a individui ripopolati a scopo venatorio (immissioni non autorizzate) di cui non si hanno notizie di nidificazione nel territorio provinciale.

45	Starna	*Perdix perdix*	S Bst Rip	Rara	A	1978

- Specie occasionalmente presente per introduzione a scopi venatori.
- (Realini, 1994) segnala, le uniche coppie indigene confinate in zone di silenzio venatorio nel basso Varesotto.

●Note nidificazione:

- Nessun dato documentato di nidificazione certa in questo secolo.
- (Realini, 1979) primavera 1978: nidificazioni di 4 coppie su 5 immesse. "Eppure solo qualche decennio fa il sig. Achille Moretti censì più di 100 coppie indigene nidificanti nella sola zona di Caronno Pertusello".

46	Quaglia	*Coturnix coturnix*	M B	Poco freq.	F	2019

- Solitamente individuabile dal richiamo emesso, in particolare nei mesi di maggio e giugno in alcune zone meridionali e centrali della provincia. Non si esclude la presenza di individui immessi per l'addestramento dei cani da caccia (spesso ibridi derivati dall'incrocio con quaglia giapponese Coturnix japonica).
- (Bianchi et al., 1973) ritenuta in provincia discretamente numerosa sino al 1955-1960, poi in forte declino.

●Note nidificazione:

- Prima conferma nidificazione certa dopo la ricerca 1983/1987: 18/06/2019 insieme a 4 indd. adulti (2 maschi e 2 probabili femm.) sentiti e registrati in orario serale i pigolii di 1-2 pulli nei pressi di Brebbia (L. Giussani/Ornitho).
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è stata censita soprattutto nell'area meridionale della provincia in aree pianeggianti normalmente inferiori ai 300 m., solo segnalazioni isolate nella porzione settentrionale e centrale. Nel periodo di ricerca solo dati di nidificazione probabile.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 1 tavoletta IGM 1:25.000 nel settore meridionale della provincia.
- (Bianchi et al., 1973) segnala nel decennio 1950-1960 nella zona della Malpensa e della Valcuvia il ritrovamento di alcuni nidi (4 - 8 uova) in agosto e persino nella prima decade di settembre.

47	Fagiano comune	*Phasianus colchicus*	S B Rip	Freq.	C	2019

- La quasi totalità degli indd. risulta introdotta a scopo venatorio.

	GAVIIFORMES	*GAVIIDAE*				
48	**Strolaga minore**	***Gavia stellata***	M Wirr	Poco freq.		

- Le poche osservazioni sono relative al Lago Maggiore e Lago di Varese nel periodo invernale e di inizio primavera.
- Interessante numero di individui osservati: il 23/04/2006 18 indd. Porto Valtravaglia Lago Maggiore (M. Viganò/Ornitho).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: Lago Maggiore 2 indd. anno 1986 e 1 ind. anni 1989 1994 1995 1996, Lago di Lugano 1 ind. anno 1994.
- (Bianchi et al., 1973) "E' la specie circumpolare più comune sui nostri laghi".

49	**Strolaga mezzana**	***Gavia arctica***	M W	Poco freq.		

- Le osservazioni sono relative al Lago Maggiore e Lago di Varese nel periodo invernale e di inizio primavera.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: viene definita una specie censita regolarmente ma sempre con effettivi scarsi.
- (Bianchi et al., 1973) "Questa specie è presente quasi tutti gli anni nei mesi invernali ed anche in primavera".

50	**Strolaga maggiore**	***Gavia immer***	A11 (7)	Molto rara		

- (Ornitho) dal 14/12 al 31/12/2020 1 ind. al 1° inverno soventemente insieme a una strolaga mezzana loc. Quassa Ranco Lago Maggiore (L. Giussani et al.), 16-17/11/2018 1 ind. ad. abito invernale Lago di Varese (R. Aletti et al.).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: anno 2008 1 ind. Lago Maggiore.
- (Ornitho) 13/01/2007 1 ind. Porto Valtravaglia (M. Viganò), dal 2/04/2006 al 23/04/2006 1 ind. Porto Valtravaglia (M. Viganò).
- (EBN/an2006) 26/03/2006 1 ind. Ispra (E. Giussani).
- (Casale, 2015) 4/01/2006 1 ind. loc. Porto della Torre - Somma Lombardo (A. Turri).
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: maggio 1997 1 ind. Lago Maggiore.
- (Martorelli, 1960) 6/12/1930 1 ind. ucciso a Porto Valtravaglia Lago Maggiore, 5/06/1926 1 ind. m. juv rinvenuto impigliato tra le maglie di una rete da pesca nei pressi di Laveno Lago Maggiore (Moltoni, Natura, vol. XVII 1926, 101), 1867 1 ind. juv ucciso sul Lago di Varese e donato al Museo di Milano.

	PODICIPEDIFORMES	*PODICIPEDIDAE*				
51	**Tuffetto**	***Tachybaptus ruficollis***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Numero massimo di presenze nel periodo primaverile e autunnale/invernale, quando agli individui residenti si aggiungono quelli svernanti e in migrazione.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 472 (IWC gennaio 2018).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, media censita periodo 2001-2010 143 indd..

52	**Svasso collorosso**	***Podiceps grisegena***	M Wirr	Poco freq.		

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al Lago Maggiore, dicembre e gennaio i mesi con il maggior numero di osservazioni.
- Interessante numero di individui osservati: 9/04/2006 5 indd. Porto Valtravaglia (M. Viganò/Ornitho).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: definita specie alquanto scarsa con costante e progressiva rarefazione nel corso dei 25 anni, dai valori massimi degli anni 1987 (22 indd.), 1989 (18 indd.), 1992 (15 indd.) dopo l'anno 1993 diventa sempre più scarso o assente.
- (Bianchi et al., 1973) definito raro invernale e di passo, segnalazioni anni: 1968 1967 1956 1955 1942 1934 1929. Dalle cronache locali risulta che sul finire dell'Ottocento ed i primi del Novecento la specie era ancora discretamente abbondante. Riferisce che il passo fu particolarmente copioso negli anni: 1912, 1907, 1902, 1895, 1893, 1887, 1881.

53	**Svasso maggiore**	*Podiceps cristatus*	SM B W	Molto freq.	C	2020

- In notevole espansione a partire dagli anni '80 del secolo scorso, i mesi invernali e primaverili sono quelli di maggior presenza della specie.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 1781 (IWC gennaio 2019).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, uno degli acquatici svernanti più comune, numeri indd. censiti significativi e incrementi modesti, max censiti 3002 indd. anno 2006 equamente ripartiti tra Lago di Lugano e Maggiore, buone presenze indd. svernanti anche laghi di Monate e Varese.

●Note nidificazione:
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 vengono stimate circa 280-300 coppie nidificanti, il Lago di Varese rappresenta il bacino più utilizzato per la nidificazione.

54	**Svasso cornuto**	*Podiceps auritus*	M Wirr	Poco freq.		

- Le osservazioni sono tutte relativa al Lago Maggiore e al Lago di Varese, in particolare nel periodo invernale e di inizio primavera.
- Interessante numero di individui osservati: 19/04/2008 5 indd. Lago di Varese (P. e L. Casali, A. Madella-EBN/BL).
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 22/10/1999 1 ind. Lago Maggiore, 20/11/1999 2 indd. Lago Ceresio, dal 9/02/1999 al 13/03/1999 1 ind. Lago Varese.
- (Migratori acquatici - anno 1979 n° 1) 21/12/1978 1 ind. Lago di Comabbio.
- (Bianchi et al., 1973) definita specie rara, catturata esclusivamente in dicembre-gennaio. Segnalazioni anni: 1968, 1967, 1927?.
- (Martorelli, 1960) definita specie assai rara in Italia. 4/01/1930 1 ind. f. Lisanza Lago Maggiore (collez. Museo di Storia Naturale di Milano).

55	**Svasso piccolo**	*Podiceps nigricollis*	M W B? Bst	Freq.	B	1982

- I mesi invernali sono il periodo di maggior presenza della specie.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 396 (IWC gennaio 2018).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, svernante regolare con ampie fluttuazioni, maggiori concentrazioni: Lago di Lugano con medie di 101 indd. dopo l'anno 2005 , Lago di Varese con un max di 140 indd. nel 2008 e un calo nell'ultimo biennio (62 indd. 2009 e 39 indd. 2010), Lago Maggiore con una media di 20 indd./anno nell'ultimo decennio 2001/2010.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (Realini, 1984) 19 aprile 1981, nido con uova Lago di Varese (P. Zanetti) e 1982 nido con 1 uovo distrutto dalle piene primaverili.
- (Realini, 1982) 1980, permanenza di una coppia e successivo avvistamento nel mese di agosto di 3 piccoli (E. Zanon) foce canale Brabbia Lago di Varese.

	PHOENICOPTERIFORMES	*PHOENICOPTERIDAE*				
56	**Fenicottero**	*Phoenicopterus roseus*	A4 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) dal 20/02 al 03/03/2020 1 ind. 2° anno di calendario (2cy) sempre presente alla foce del Tresa a Germignaga (L. Tirotta, F. Saporetti et al.).
- (A. Viganò rif.) 1 ind. juv. osservato negli ultimi anni del secolo scorso (data non precisata) Lago Maggiore.
- (Bianchi et al., 1973) definito accidentale, di passo. 3/11/1951 1 ind. preso nella Palude Brabbia Lago di Varese (R.I.O. 1953, 41), primavera 1914 12 indd. in volo sul Lago di Varese.
- (Bettoni, 1865-1868) tra i luoghi delle osservazioni di questa specie in Lombardia viene indicato anche il lago di Varese.

	CICONIIFORMES	*CICONIIDAE*				
57	**Cicogna nera**	***Ciconia nigra***	M	Rara		

- (Ornitho) dal 15/04 al 1/09/2020 6 diverse oss. nella parte centrale della provincia (oss. vari), 26/03 16/04 28/04/2019 3 diverse oss. di 1 ind. in migrazione Brebbia (L. Giussani, L. Prada), 2/05/2019 2 indd. Comerio (M. Frigerio), 22 e 23/06/2019 1 ind. Varese (D. Perolini), 26/08/2019 2 indd. Cuvio (M. Carabella), 25/04/2018 1 ind. osservato dal Cuvignone proveniente da W/SW e diretto a Est lungo la Valcuvia (L. Giussani, N. Larroux), 28/03/2017 1 ind. Monte Cadrigna Maccagno (F. Saporetti) e 1 ind. Cassano Valcuvia in diverso orario e diversa direzione (M. Soldarini), 8/05/2016 1 ind. Luino (M. Viganò), 21/04/2016 1 ind. in migrazione Monte Cuvignone Cittiglio (M. Viganò), 6/04/2015 1 ind. Lonate Pozzolo (W. Guenzani, L. Colombo), 30/07/2014 1 ind. Buguggiate (S. Baratelli), 18/09/2013 2 indd. Lozza (L. Laddaga), 6/09/2011 1 ind. Morazzone (S. Baratelli), 4/04/2008 1 ind. Ternate (L. Giussani), 13/05/2007 1 ind. Rancio Valcuvia (M. Carabella, F. Pianezza).
- (EBN/BL) 18/05/2013 1 ind. Ternate (L. Giussani), 26/03/2010 1 ind. Germignaga (M. Viganò), 16/04/2008 1 ind. Morosolo (L. Marocchi).
- (M. Carabella, F. Pianezza rif.) aprile 2008 1 ind. Rancio Valcuvia.
- (Bordignon, 2005) 9/11/2005 1 ind. trovato morto per collisione cavi elettrici a Cittiglio.
- (EBN/IT) 6/06/2004 1 ind. loc. Campo dei Fiori, osservato dal Forte di Orino (P. & L. Casali).
- (F. Casale rif.) 12/09/1989 2 indd. Somma Lombardo.
- (Bianchi et al., 1973) 14/10/1961 1 ind. loc. "Laghetti" Cocquio Trevisago.

58	**Cicogna bianca**	***Ciconia ciconia***	M Wirr	Rara		

- Poche le segnalazioni, osservazioni in particolare nei mesi primaverili.
- Interessante segnalazione per il periodo (prima segnalazione documentata di presenza invernale): 16/01/2020 3 indd. Brebbia (L. Giussani/Ornitho).
- Interessante numero di individui osservati: fine agosto 2015 15 indd. osservati e fotografati nei pressi di Cascina Gaggio di Besnate (rif. V. Uboldi).

●Note nidificazione:
- La segnalazione della nidificazione di una coppia negli anni 2015 e 2016 nei pressi dell'Agriturismo Cascina Gaggio di Besnate (rif. V. Uboldi proprietario dell'agriturismo) è pervenuta solo nel 2017 e non è stato possibile alcun riscontro (non considerata).
- Un tentativo di nidificazione è stato effettuato da una coppia nella primavera 2008 in località Schiranna Lago di Varese senza alcun risultato positivo.

	PELECANIFORMES	*THRESKIORNITHIDAE*				
59	**Ibis sacro**	***Threskiornis aethiopicus***	M Wirr	Rara		

- Probabile che i soggetti osservati siano provenienti da province vicine (VC NO) dove la specie ha formato una popolazione stabile residente (prima nidificazione nel 1989 in provincia di VC). La specie è comunque in espansione territoriale e non si possono escludere movimenti migratori a corto raggio.
- Interessante numero di individui osservati: 29/11/2015 60 indd. in volo direzione nord Laveno Mombello (M. Carabella et al./Ornitho).

60	**Mignattaio**	***Plegadis falcinellus***	Ast4	Stor.		

- (Laddaga e Casale, 2014) fine anni '90 3 indd. osservati e fotografati presso Fosso di Mezzo Palude Brabbia (A. Bottelli rif.).
- (R. Aletti rif.) inizi anni '80 1 ind. osservato e fotografato sul Lago di Varese nei pressi di Capolago.
- (Bianchi et al., 1973) definito di passo, molto raro. Lago Maggiore 2 osservazioni tra Lisanza e Sesto Calende: marzo 1932 1 ind., ottobre 1927 1 ind.

61	**Spatola**	***Platalea leucorodia***	A6 (5)	Molto rara		

- (Ornitho) 6/05/2020 1 ind. Saronno (M. Monfrini), dal 28/04/2020 al 5/05/2020 3 indd. inizialmente Oasi Bruschera Angera e poi Capolago Lago di Varese (V. Piola, F. Aresi et al.), 16/11/2014 1 ind. Brissago Valtravaglia (F. Saporetti), 9/03/2012 1 ind. Biandronno (F. Boggiani).
- (M.Carabella, F.Pianezza rif.) 3/05/2005 1 ind. in volo Palude Brabbia.
- (Giglioli, 1889, 1890) 2/11/1887 1 ind. juv. ucciso nei pressi di Busto Arsizio (E. Bonomi).

	PELECANIFORMES	*ARDEIDAE*				
62	**Tarabuso**	***Botaurus stellaris***	M W B? Bst	Poco freq.	B	1967

- Le osservazioni più frequenti sono relative al periodo di fine autunno e invernale.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 15 (IWC gennaio 2016).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, censito a partire dall'anno 2000 sul Lago di Varese, tra il 2006 e il 2008 8-12 indd. Lago di Varese, 2003 1 ind. fiume Ticino, 2002 2 indd. Palude Brabbia, 2005 e 2006 1 ind. Palude Brabbia.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 l'unica segnalazione di nidificazione probabile si riferisce all'osservazione di un individuo avvistato per almeno una settimana alla fine di aprile 2005 nella Palude Brabbia.
- (Bianchi et al., 1973) segnala due casi di nidificazione nel 1966 e 1967, i nidi furono trovati nei canneti tra la Bozza di Monvalle e la riva del "Saresone" alla fine di maggio.

63	**Tarabusino**	***Ixobrychus minutus***	M B	Poco freq.	C	2020

- Osservazioni da aprile a settembre con punte massime nel periodo giugno/agosto (indd. estivanti/nidificanti e inizio migrazione post-riproduttiva), in sensibile diminuzione su tutto il territorio provinciale.

●Note nidificazione:
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 si nota una contrazione dell'area occupata in relazione alle precedenti indagini, con una conseguente diminuzione delle coppie nidificanti che rimangono concentrate alla porzione centrale del territorio provinciale, in particolare sul Lago di Varese.
- (Realini, 1982) si stimano 4-5 coppie nidificanti sul Lago di Comabbio e altrettante in Bruschera (Lago Maggiore), 2-3 coppie in Bozza-Monvallina (Lago Maggiore), una decina sul Lago di Varese e altrettante nella Palude Brabbia.

64	**Nitticora**	***Nycticorax nycticorax***	M B	Poco freq.	C	2020

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al periodo da marzo a ottobre, punte massime nel periodo di fine primavera/estate con particolare riferimento agli individui estivanti e nidificanti.

●Note nidificazione:
- Le recenti nidificazioni sono quasi tutte relative alla Palude Brabbia.
- (Banca dati Gruppo Garzaie Italia) totale nidi contati: 48 nidi nel 2016, 35 nidi nel 2015.
- (Provincia di Varese, 2012) totale numero coppie nidificanti: 75 coppie nel 2009 e nel 2010.
- (Bianchi et al., 1973) viene segnalata come scarsamente nidificante, in particolare lanche del Ticino a nord del ponte di Oleggio, Palude Brabbia e in Valcuvia località "Bouscasc".

65	**Sgarza ciuffetto**	***Ardeola ralloides***	M	Rara		

- Quasi sempre indd. isolati in spostamento migratorio nel periodo aprile-agosto.
- (Bianchi et al., 1973) definita di passo, molto rara, segnalazione anni: 1937.

66	**Airone guardabuoi**	***Bubulcus ibis***	M Wirr	Poco freq.		

- Stanziale in province limitrofe, migratore a corto raggio e areale in espansione.
- Interessante numero di individui osservati: 14/11/2018 circa 300 indd. loc. S. Anna Sesto Calende in un campo arato, si alzano poi in volo dirigendosi verso la sponda piemontese del Lago Maggiore (V. Piola/Ornitho).

67	**Airone cenerino**	*Ardea cinerea*	SM B W	Molto freq.	C	2020

- In aumento la popolazione residente.
- Censimenti invernali IWC: numero massimo indd. censiti 192 (IWC gennaio 2020).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, tra il 1995 e il 2005 valore medio censito 49 indd., valore max nel 2006 con 142 indd., sino ad arrivare ai 67 indd. del 2010. Maggiori presenze su laghi Maggiore e Varese.

●Note nidificazione:
- Principali recenti nidificazioni nelle garzaie della Palude Brabbia, Calcinate Lago di Varese, Somma Lombardo, Monvalle.
- (Provincia di Varese, 2012) totale numero coppie nidificanti: 124 coppie nel 2009, 111 coppie nel 2010.
- (Maroni e Boto, 1993) nel 1993 viene accertata la prima nidificazione in Palude Brabbia.
- (Realini, 1982) riporta la segnalazione di una piccola colonia nidificante (6-7 coppie) fino ai primi anni '70 del secolo scorso nella Vallata del Ticino entro i confini della Riserva di caccia "La Maddalena" di Lonate Pozzolo (rif. N. Casagrande).

68	**Airone rosso**	*Ardea purpurea*	M Wirr B	Poco freq.	C	2016

- Periodo di maggior presenza da aprile a settembre.
- Interessante segnalazione per il periodo (prima segnalazione documentata di presenza invernale): 9/01/2005 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua, A. Turri EBN/an2005).

●Note nidificazione:
- Le ultime nidificazioni riscontrate sono relative alle garzaie della Palude Brabbia e Calcinate Lago di Varese.
- (Banca dati Gruppo Garzaie Italia) totale nidi contati: 10 nidi nel 2016, 10 nidi nel 2015.
- (Provincia di Varese, 2012) totale numero coppie nidificanti: 20 coppie nel 2009, 23 coppie nel 2010.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) segnalata negli anni della ricerca 1983-1987 la presenza regolare da 2 a 5 indd. nella Palude Brabbia e nei canneti di Cazzago Brabbia sul Lago di Varese. Nessun indizio significativo di nidificazione.
- (Maroni e Boto, 1993) nel 1993 viene accertata la prima nidificazione in Palude Brabbia.

69	**Airone bianco maggiore**	*Ardea alba*	M W	Freq.		

- Specie in netta espansione dall'inizio di questo secolo come svernante in provincia, legata in particolare alle zone umide.
- Censimenti invernali IWC: numero massimo indd. censiti 166 (IWC gennaio 2019).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, prima oss. nel 2000 con 1 ind., picco di 53 indd. nel 2007 sul fiume Ticino.

70	**Garzetta**	*Egretta garzetta*	M W B	Freq.	F	2018

- Più frequentemente osservata nei periodi aprile/maggio e luglio/ottobre.
- Interessante numero di individui osservati: 9/07/2011 minimo 280 indd. Vasconi Arnetta Lonate Pozzolo (A. Nicoli-EBN/BL).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, anni 2001 2007 2009 censiti pochissimi indd. sul Lago Maggiore, n° max censito 2007 6 indd. fiume Ticino, 2008 1 ind. Lago di Varese.

●Note nidificazione:
- (Banca dati Gruppo Garzaie Italia) Garzaia della Maddalena Somma Lombardo anni: 2014 9 nidi, 2013 6 nidi, 2012 5 nidi, 2011 5 nidi, 2009 24 nidi. Garzaia Palude Brabbia: anno 2011 1 nido.
- (Bianchi et al., 1973) Oltre 40 - 50 coppie nidificano lungo la vallata del Ticino, altre piccole colonie sono poste a nord del ponte di Oleggio sino alle dighe di Porto della Torre (Somma Lombardo).

	PELECANIFORMES	*PELECANIDAE*				
71	**Pellicano comune**	***Pelecanus onocrotalus***	A9 (6)	Molto rara		

- (Ornitho) 13/04/2018 1 ind. in volo periferia Ovest di Varese (L. Colombo et al.), segnalato poi anche da altri osservatori presso Brebbia, Sangiano, Lago di Varese, Palude Brabbia e il giorno successivo 14/04/2018 sul Lago di Comabbio. Da alcune particolarità emerse dalle foto si è potuto stabilire che lo stesso ind. era stato segnalato lo stesso giorno della prima osservazione (13/04/2018) anche a Travacò Siccomario (PV).
- (Ornitho) dal 12/09/2013 al 13/10/2013 quasi certamente sempre lo stesso individuo osservato tra il Lago di Varese e il Lago Maggiore (A. Nicoli et al.), dal 22/03/2013 al 22/04/2013 1 ind. Palude Brabbia (A. Martinoli L. Laddaga et al.), 13/06/2012 5 indd. Cazzago Brabbia (A. Martinoli,
L. Laddaga), 20/04/2011 1 ind. garzaia Casale Litta (A. Martinoli).
- (EBN/BL) gennaio 2006 1 ind. Lisanza (anonimo tramite F. Luoni).
- (Migratori acquatici - anno 1978 n° 1) 19/12/1977 1 ind. Monvallina Lago Maggiore.
- (Bianchi et al., 1973) definito accidentale sino all'inizio del secolo scorso: 14/06/1902 1 ind. catturato sul Lago Maggiore (da Ghidini-Avicula 1902, n. 59-60, pag. 63).
- (Monti, 1845) in riferimento al Lago di Varese riporta: 21/07/1831 comparvero otto pellicani e che uno ne fu ucciso.

	SULIFORMES	*PHALACROCORACIDAE*				
72	**Marangone minore**	***Microcarbo pygmeus***	A4 (2)	Molto rara		

- (Ornitho) 7/08/2020 1 ind. Cazzago/Bodio Lago di Varese (L. Giussani, L. Nigro).
- (EBN/an2014) 10/09/2014 1 ind. Gorla Minore (P. Monti).
- (Bianchi E., 1962) Lago di Varese, gruppo di 7 indd. di cui 3 catturati "anni orsono" (anni '50 ?) più un'altra cattura di 1 ind. maschio in epoca non meglio definita.

73	**Cormorano**	***Phalacrocorax carbo***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Specie migratrice e sedentaria solo parzialmente, in notevole aumento residenti e migratori.
- Censimenti invernali IWC: numero massimo indd. censiti 2794 (IWC gennaio 2019).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010: a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, in forte aumento come svernante, con max 2656 indd. (2007) nel conteggio annuale; in media 1400 indd.

●Note nidificazione:
- (Provincia di Varese, 2012) nella colonia in Palude Brabbia i nidi occupati sono 198 nel 2010 e 155 nel 2011.
- (Gagliardi et al., 2007) ha iniziato a nidificare regolarmente dal 2004, anno in cui 4 coppie si sono riprodotte con successo in un'area della Torbiera Brabbia presso Varano Borghi. Negli anni precedenti si segnalano casi di estivazione e alcuni tentativi di nidificazione non andati a buon fine.

	ACCIPITRIFORMES	*PANDIONIDAE*				
74	**Falco pescatore**	***Pandion haliaetus***	M	Poco freq.		

- Le osservazioni in provincia sono concentrate soprattutto sul Lago di Varese, in Palude Brabbia e sul Lago Maggiore. Alcuni soggetti si fermano a estivare o sostano in zona anche diverse settimane in primavera e autunno.

	ACCIPITRIFORMES	*ACCIPITRIDAE*				
75	**Gipeto**	***Gypaetus barbatus***	A1 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) 20/03/2018 1 ind. ad. Veddasca loc. Forcora osservato in volo vicino ad una coppia di aquile diretto a nord (F. Saporetti), prima e unica segnalazione nota per la nostra provincia.

76	**Falco pecchiaiolo**	***Pernis apivorus***	M B	Freq.	C	2020

- Punte massime delle osservazioni mesi di maggio e agosto.

●Note nidificazione:
- (Saporetti et al., 1994) ricerca anni 1987-1991: risulta uniformemente distribuito, i territori sono occupati dalla seconda decade di maggio. Il numero massimo di territori occupati, sui 17 censiti, è stato pari a 16 nel 1991.

77	**Grifone**	*Gyps fulvus*	M	Rara		

- Numero massimo indd. osservati: 24/05/2020 > 10 indd. Alta Veddasca (G. Brambini/Ornitho).
- (Ornitho) dal 28/02 al 11/10/2020 8-9 segnalazioni nella parte settentrionale e centro-settentrionale della provincia (oss. vari), 16/10/2019 1 ind. Colmegna (P. Raimondi), 13/10/2019 9 indd. Bisuschio (M. Carabella), 21/06/2018 2 indd. Monte Crocetta Cittiglio (M. Viganò), 4/07/2018 >1 ind. sopra i Pizzoni di Laveno direzione NW verso Piemonte poi forse un secondo individuo (M. Viganò), 22/09/2018 1 ind. proveniente da nord termica sopra i Pizzoni di Laveno e si dirige verso Verbania/Intra (L. Giussani, M. Manica), 12/06/2017 8 indd. loc. Sass de Ferr Laveno Mombello (R. Tomasini), 11/06/2017 7 indd. Duno (R. De Ricco), 17/05/2017 2 indd. Cuvignone Cittiglio (C. Parnell), 8/11/2016 1 ind. in volo a Brissago (CH) direzione Luino (O. Ostinelli /Ornitho.ch), 14/05/2016 1 ind. Campo dei Fiori Varese (M. Carabella), 7/10/2015 1 ind. Valganna Varese (R. Talamona).
- (BirdAlertVA) 11/10/2019 1 ind. Rasa Varese (M. Bergomi).
- (EBN/BL) 4/08/2014 1 ind. Monte Campo dei Fiori Varese (E. Giussani), 25/04/2013 1 ind. Monte Martica Varese (A. Giusto et al.).
- (C. Scandolara rif.) 6/03/2010 1 ind. fotografato su traliccio Monte Cadrigna Val Veddasca.

78	**Avvoltoio monaco**	*Aegypius monachus*	A1 (1)	Molto rara		

- (G.I.O.) 19/04/2019 1 ind. dotato di dispositivo GPS e anello con sigla GYB (rilasciato in Francia nel Verdon il 24/03/2019) ha attraversato in volo buona parte della provincia di Varese. Dopo essere stato osservato nella mattinata a Bogogno (NO) è stato possibile attraverso i dati del GPS e la consultazione del sito https://www.movebank.org/ ricostruire il percorso effettuato; dopo aver raggiunto il territorio provinciale nei pressi di Somma Lombardo e sorvolato alcune zone nei dintorni di Vergiate, Cimbro e Lago di Varese, si è diretto verso nord per poi attraversare il Lago Maggiore nei pressi di Caldè e raggiungere il giorno successivo attraverso la Val d'Ossola alcune zone nelle vicinanze di Domodossola.
Il giorno 21/04/2019 è ricomparso in provincia di Varese, dove nei dintorni della Palude Brabbia è stata effettuata l'unica osservazione sul campo da parte di Marco Tessaro.
Nei giorni successivi l'individuo è stato recuperato in difficoltà nei pressi di Como e, dopo le cure effettuate dal CRAS WWF di Vanzago, è stato consegnato in Francia al centro che lo aveva rilasciato dove è tuttora in corso un progetto per la reintroduzione di questa specie.

79	**Biancone**	*Circaetus gallicus*	M B	Poco freq.	F	2020

- Mesi di maggior presenza: marzo, aprile, settembre.
- (Bianchi et al., 1973) definita di passo molto scarsa, segnalazioni anni: 1964, 1962, 1958, 1934.
●Note nidificazione:
- Dal 2010 si stimano complessivamente 2-3 coppie nidificanti nel territorio provinciale.
- (Colombo et al., 2019) coppia seguita nella porzione centro-settentrionale della provincia: anni 2012 e 2013 osservati sia il trasporto di prede sia ripetuti accoppiamenti e localizzati alcuni posatoi abituali senza che venisse tuttavia individuato il sito di nidificazione (Bertoncello com. pers.), dal 2014 al 2019 nidificazione confermata con l'involo dell'unico nato in tutte le stagioni riproduttive.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è stata segnalata solo 3 volte in ambiente idoneo in alta Val Veddasca e tra il Monte Campo dei Fiori e la Valganna, senza comunque alcuna prova di nidificazione certa.
- (Saporetti et al., 1994) nidificazione accertata per il periodo 1987-1989 su pino silvestre; poi nel 1990-91 su altra pianta a 200 m. dal precedente, sempre su pino silvestre.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificante con una sola coppia nella parte settentrionale della provincia.
- (Brichetti e Cambi, 1980) tra gli areali di nidificazione in Lombardia viene segnalata anche la zona del Campo dei Fiori di Varese.

80	**Aquila anatraia minore**	*Clanga pomarina*	A1 (1)	Molto rara		

- (EBN/an2011) 29/06/2011 1 ind. Cadrezzate (M. Piha).

81	**Aquila anatraia maggiore**	*Clanga clanga*	A3 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) 4/11/2020 1 ind. inizialmente osservato in volo nei pressi di Locate Varesino (CO) si ferma per alcuni minuti nei pressi di Tradate (N. Larroux) e nel primo pomeriggio viene nuovamente osservato nei pressi dell'Aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto); conferma stesso individuo dal confronto delle foto poiché nell'ala sinistra in parte mancante una penna remigante secondaria.
- (Bianchi et al., 1973) autunno 1946, 1 ind. fase chiara ucciso in località "Novaglia" Bodio-Galliate (Lago di Varese) e sempre nel 1946 altro individuo catturato tra Tradate e Valle Olona (soggetto visionato in carne presso un'armeria di Varese).

82	**Aquila minore**	*Hieraaetus pennatus*	M	Rara		

- (Ornitho) 5/05/2020 1 ind. Sangiano (F. Aresi), 9/09/2019 1 ind. Montegrino Valtravaglia (P. Salimbeni), 7/09/2019 1 ind. morfismo scuro Valganna (A. Giusto), 22/09/2017 1 ind. Lonate Pozzolo (F. Casale), 30/04/2014 1 ind. Lonate Pozzolo (A. Vidolini, P. Bonazzi), 4/04/2014 1 ind. Varano Borghi (L. Laddaga), 2/04/2013 1 ind. Ternate (L. Giussani), 24/04/2011 1 ind. morfismo scuro Casorate Sempione (A. Vidolini), 15/04/2005 1 ind. Biandronno (L. Giussani), 16/09/2004 6 indd. Besozzo e 2 indd. Biandronno (L. Giussani).
- (Laddaga e Casale, 2014) 26/04/2012 1 ind. fase scura Palude Brabbia (L. Laddaga).
- (EBN/an2006) 17/09/2006 1 ind. Palude Brabbia (F. Luoni, A. Galimberti).
- (EBN/IT) 8/04/2001 1 ind. Palude Brabbia (P. Casali, L. Marocchi), 10/09/2000 1 ind. Palude Brabbia (O. Janni, R. Garavaglia, A. Nicoli, P. Casali et al.)
- (Laddaga e Casale, 2014) 17/09/2000 1 ind. Palude Brabbia (A. Viganò dati ined.).

83	**Aquila imperiale**	*Aquila heliaca*	A2 (2)	Molto rara		

- (Ornitho) 4/05/2017 1 ind. imm. Casorate Sempione (S. Daverio), 1/04/2017 1 ind. Castelveccana (L. Nigro).

84	**Aquila reale**	*Aquila chrysaetos*	S? M? B?	Poco freq.	X	

- In sensibile aumento le segnalazioni post 2018 con una media di circa 50 osservazioni/anno.
- Le recenti osservazioni (post 2009), quasi tutte effettuate nella parte settentrionale della provincia, sono relative a soggetti di diverse classi di età. Molto probabile la presenza di alcuni individui erratici provenienti dalle Alpi, ma alcune ripetute e ravvicinate osservazioni post 2014 fanno pensare alla presenza stabile di qualche individuo nel territorio provinciale.
- (Bianchi et al., 1973) viene segnalata la comparsa abbastanza regolare di individui sui monti del Luinese e dell'Alta Val Veddasca.

●Note nidificazione:

- (G.I.O.) alta provincia segnalazioni post 2013 solo alcuni dati di nidificazione probabile (ripetuta presenza di almeno una coppia nel periodo primaverile con comportamento territoriale e volo a festoni) ma nessuna conferma di nidificazione certa. Molto probabilmente presenza e comportamenti sono da riferirsi ad alcune coppie nidificanti nel territoro Svizzero.

85	**Sparviere**	*Accipiter nisus*	SM B W	Freq.	C	2020

- Alla popolazione locale si possono aggiungere durante il periodo migratorio individui provenienti dall'Europa nord-occidentale.

●Note nidificazione:

- Negli ultimi decenni la specie ha ampliato notevolmente l'areale riproduttivo.

86	**Astore**	*Accipiter gentilis*	SM B W	Poco freq.	C	2018

- Oltre alla popolazione sedentaria provinciale si possono aggiungere giovani in dispersione provenienti da altre zone e qualche migratore proveniente dal Nord Europa.

●Note nidificazione:

- (Saporetti et al., 1994) prima nidificazione provinciale accertata nel corso della ricerca 1987-1991, in precedenza solo dati probabili.

87	**Falco di palude**	*Circus aeruginosus*	M W B? Bst	Freq.	B	1844

- Punte massime delle osservazioni mesi di marzo e aprile.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, pochi indd. svernanti, 2001 2002 e 2005 1 ind. Palude Brabbia, 2010 1 ind. Lago Maggiore.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (A. Viganò rif.) Primav. 2001 1 ind. trasporto materiale per il nido a Biandronno (nidificazione probabile).
- (G.I.O.) marzo/giugno 1999, osservata più volte la coppia trasportare cibo e materiale per il nido, località Arnetta Lonate Pozzolo (nidificazione probabile).
- (Realini, 1982) segnala nel 1977 la possibile nidificazione in Palude Brabbia.
- (Brichetti e Cambi, 1980) in riferimento alla regione Lombardia viene riportato: "..... un tempo stazionario e nidificante in modo generico nella regione (Prada 1877; Bettoni 1865) o più particolarmente nel Mantovano (Lanfossi 1835; Giglioli 1890) e nella Palude Brabbia in provincia di Varese (Cattaneo 1844).
- (Riva, 1860) riporta: "Il prof. De Filippi lo dà per comune nella Palude Brabbia presso Varese. Io però lo feci ricercare da esperti cacciatori ripetutamente, ma non venne loro mai fatto di osservarlo".

88	**Albanella reale**	*Circus cyaneus*	M W	Poco freq.		

- Specie invernale, principali osservazioni nei mesi da novembre a marzo.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, nei 25 anni 1 solo indd. censito nel 2006 in Palude Brabbia.

89	**Albanella pallida**	*Circus macrourus*	A3 (3)	Molto rara		

- (Ornitho) 27/04/2018 1 ind. Brebbia (L. Prada), 19/09/2015 1 ind. 1° anno di calendario (1cy) Ternate (L. Giussani), 1-3-6/05/2015 1 ind. tipo f. Aerop. Malpensa (S. Daverio).
- (Bianchi et al., 1973) definita di passo, poco osservata e quasi sconosciuta. Vengono citate osservazioni individuali e generiche nei mesi da aprile a maggio nella zona di Golasecca.

90	**Albanella minore**	*Circus pygargus*	M Bst	Rara	A	1970

- Osservata quasi esclusivamente nel periodo primaverile, scarse le osservazioni durante la migrazione post-riproduttiva.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Realini, 1982) intorno all'anno 1970 rinvenuto nido con 4 uova posizionato a terra in una radura della Riserva di caccia La Maddalena a Lonate Pozzolo (rif. N. Casagrande).

91	**Nibbio reale**	*Milvus milvus*	M Wirr Bst?	Poco freq.	A	1979?

- Principalmente osservato nel periodo primaverile (marzo/maggio).
- (Bianchi et al., 1973) Definito non molto comune di passo, nidificante.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- La specie in questa Lista in relazione ai dati reperiti viene definita "nidificante certa storica" con qualche dubbio.
- (Realini, 1982) Si fa riferimento a due nidificazioni non verificate dagli autori: Poncione di Ganna nel 1974 (C. Croci) e Sasso della Nonna negli anni 1977-1979 (M. Cutali).
- (Bianchi et al., 1973) 20/04/1963 oss. 9 indd., di questi 4 indd. restarono nei boschi vicini sino al 15/07/1963. Opinione degli autori che nidificarono in zona.

92	**Nibbio bruno**	***Milvus migrans***	M B	Molto freq.	C	2020

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al periodo da marzo a agosto, con punte massime nel mese di aprile, dalla prima metà del mese di agosto gli individui che si sono fermati a estivare e nidificare iniziano la migrazione post-riproduttiva.
- (Colombo et al., 2020) conteggi in direzione roost serale nei pressi di Calcinate Lago Varese anni 2019-2020: dal 3/06 al 8/08/2020 in 15 conteggi serali stimato un numero massimo di 195 indd., dal 24/06 al 19/07/2019 in 9 conteggi serali stimato un numero massimo di 210 indd..

●Note nidificazione:
- (Saporetti et al., 1994) ricerca anni 1987-1991: la specie mostra una distribuzione raggruppata, in relazione alla presenza delle zone di foraggiamento lacustri e fluviali. I territori sono occupati a partire dalla terza settimana di marzo in avanti .

93	**Poiana calzata**	***Buteo lagopus***	Ast6	Stor.		

- (Laddaga e Casale, 2014) terza decade ottobre 1995 1 ind. Palude Brabbia (A. Viganò dati ined.).
- (Ferrari, 1980) 2/01/1980 osservazione di 1 ind. sulle colline di Cuvio.
- (Bianchi et al., 1973) definita specie invernale, irregolare ma non del tutto rara, con variazioni annuali di densità. Uniche segnalazioni sicure documentate: 13/01/1963 1 ind. m. fase scura catturato a Ispra (coll. Martire), gennaio 1963 1 ind. catturato a Ispra donato ad un collezionista sconosciuto, 9/02/1941 1 ind. Brusimpiano (R.I.O. 1941, 129).
- (Martorelli, 1960) nell'inverno 1928-1929 1 ind. catturato nella provincia di Varese (cfr. Moltoni, il Cacciatore italiano, ottobre 1929, p. 1057).

94	**Poiana codabianca**	***Buteo rufinus***	A2 (2)	Molto rara		

- (Ornitho) 7/09/2016 1 ind. Ternate (L. Giussani).
- (Bird Control Italy s.r.l., 2012) monitoraggio effettuato da luglio 2007 a giugno 2008 all'Aeroporto di Malpensa, osservato 1 ind. durante i rilievi del 22/05/2008 e del 5/06/2008 (probabilmente lo stesso individuo) comuni Ferno-Samarate.
- (Bianchi et al., 1973) citata sul territorio della provincia ma senza prove certe.

95	**Poiana**	***Buteo buteo***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Numero massimo delle osservazioni nei mesi di marzo e aprile.
- (Ornitho) due segnalazioni relative alla ssp vulpinus Poiana delle steppe: 12/08/2017 1 ind. Veddasca (F. Saporetti, W. Guenzani), 2/04/2013 1 ind. Ternate (L. Giussani).

●Note nidificazione:
- (Saporetti et al., 1994) nella ricerca anni 1987-1991 la specie presenta una distribuzione regolare, con 56 territori censiti risulta il più comune rapace diurno dell'area.

	OTIDIFORMES	*OTIDIDAE*				
96	**Otarda**	***Otis tarda***	Ast1	Stor.		

- (Moltoni, 1968) anno 1841 1 ind. Lago di Varese, nota ripresa da: Cattaneo 1844, Notizie Naturali e Civili sulla Lombardia, pag. 374.
- (Bianchi et al., 1973) 1 ind. probabilmente catturato nei pressi di Angera il 18/01/1968 (non considerato perché località probabile).

97	**Ubara asiatica**	***Chlamydotis macqueenii***	Ast1	Stor.		

- (Moltoni, 1952) 14/10/1951 1 ind. ucciso nella riserva di caccia della Maddalena Somma Lombardo e donato al museo di Milano, era la quarta segnalazione conosciuta a livello nazionale.

	GRUIFORMES	RALLIDAE				
98	**Porciglione**	***Rallus aquaticus***	SM B W	Freq.	C	2018

- Specie di non sempre facile osservazione, solitamente individuabile dal verso, le maggiori presenze si riscontrano durante la migrazione e lo svernamento.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, incluso nei conteggi solo dai primi anni 2000 per la difficoltà di individuazione di questa specie, contattato prevalentemente sul Lago di Varese (max 61 indd. nel 2007) e in Palude Brabbia (max 18 indd. nel 2005), censito anche in alcuni canneti del Lago Maggiore.

●Note nidificazione:
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è risultata presente sulle rive dei principali corpi idrici con rigogliosa vegetazione igrofila erbacea e arbustiva, in particolare: sponde Lago Maggiore, sponda occidentale e orientale Lago di Varese, porzione meridionale Lago di Comabbio e Palude Brabbia. L'elevato numero di segnalazioni di nidificazione probabile, rispetto a quelle di nidificazione certa, è da mettere principalmente in relazione all'elusività della specie.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 per la Palude Brabbia si stima una popolazione nidificante di 15/20 coppie.

99	**Re di quaglie**	***Crex crex***	A? (2)	Molto rara		

- (D. Nisoli rif.) 8/09/2015 1 ind. rinvenuto morto nei pressi dell'Ospedale di Busto Arsizio, da luogo e foto si presume che la morte sia stata causata da impatto.
- (Regione Lombardia, 2009) 27/09/2009 1 ind. catturato nella Staz. Ornit. Dogana Vizzola Ticino (P. Bonazzi).
- (Laddaga e Casale, 2014) la specie veniva catturata fino agli anni '70 dai cacciatori di Inarzo (A.Viganò, com. pers.).
- (Bianchi et al., 1973) definito raro, osservato di norma nel passo autunnale. Da testimonianze raccolte, la specie nei primi decenni del 1900 era invece abbastanza comune e oggetto di una caccia particolare. Due segnalazioni provinciali relative a individui catturati: settembre 1957 1 ind. Piana della Malpensa e ottobre 1950 1 ind. Monte Monarco Varese, più altri dati generici relativi alla prima metà del secolo scorso.

100	**Schiribilla**	***Porzana parva***	M B? Bst	Poco freq.	B	1973

- Di difficile osservazione, solitamente indd. isolati, principalmente primavera e fine estate/autunno Lago Maggiore e Lago di Varese, nessun dato di svernamento in tempi recenti.
- (Bianchi et al., 1973) definita comune nel passo primaverile, estiva nidificante e parzialmente invernale. Vengono citati alcuni casi di svernamento nella palude Brabbia e alcune catture relative ai mesi di dicembre e gennaio negli anni dal 1922 al 1968.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (Laddaga e Casale, 2014) viene segnalata come specie probabilmente nidificante nella Palude Brabbia.
- (Saporetti, 2001) anni 1999-2000 osservazioni di individui e contatti al canto nel periodo riproduttivo, Palude Brabbia e Lago di Varese.
- (Bianchi et al., 1973) definita nidificante, "alcune coppie si stabiliscono nelle nostre paludi (Brabbia, Biandronno, Mergozzo, ecc.) per nidificarvi".

101	**Schiribilla grigiata**	***Porzana pusilla***	Ast1	Stor.		

- (Bianchi et al., 1973) definita discretamente presente nel passo primaverile, estiva, forse nidificante. Unica segnalazioni nota: 15/01/1966 1 ind. precedentemente osservato per più giorni tra i falaschi nelle vicinanze del golf di Luvinate e successivamente catturato abusivamente da un cacciatore locale.

102	**Voltolino**	***Porzana porzana***	M B? Bst	Poco freq.	B	1973

- Quasi tutte le osservazioni sono relative al Lago Maggiore, Lago di Varese e Palude Brabbia.
- (Regione Lombardia, 2008) anno 2008, 2 indd. catturati nella stazione di inanellamento Palude Brabbia.
- (Bianchi et al., 1973) definito comune di passo, estivo nidificante, forse invernale.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (Laddaga e Casale, 2014) viene segnalata come specie probabilmente nidificante nella Palude Brabbia.
- (Bianchi et al., 1973) definito nidificante, "diverse coppie nidificano, lasciando però all'osservatore rarissime occasioni per poterne studiare le abitudini".

103	**Gallinella d'acqua**	***Gallinula chloropus***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Il numero massimo di presenze viene raggiunto durante le fasi migratorie, dove agli individui residenti si aggiungono svernanti e migratori.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, specie sicuramente sottostimata per la sua elusività, indd. censiti in crescita nell'ultimo decennio con una media di circa 284 indd./anno, max assoluto nel 2005 con 488 indd. di cui 313 sul Lago di Varese.

104	**Folaga**	***Fulica atra***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Le maggiori presenze si riscontrano nel periodo primaverile e invernale.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 3636 (IWC gennaio 2012).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, specie molto comune, progressivo incremento registrato con max 3625 indd. nel 2006, media decennio 2000-2010 di 2277 indd./anno.

	GRUIFORMES	*GRUIDAE*

105	**Gru**	***Grus grus***	M Wirr	Poco freq.		

- Anno 2020: dal 20/02 al 8/03/2020 e dal 3/11 al 23/11/2020 circa 20 segnalazioni di individui in migrazione notturna o diurna, in particolare nella parte centro-meridionale della provincia. Nel periodo della migrazione post riproduttiva punte massime nei giorni 21 e 22 novembre.
- Anno 2019: periodi gennaio/marzo e novembre/dicembre circa 13 segnalazioni (stima complessiva 400/500 indd. in migrazione); nella mattinata del 3/11/2019 interessante numero di 13 indd. osservati in sosta migratoria per alcune ore nei pressi di Galliate Lombardo (L. Prada et al.).
- Anno 2018: 14-15-16 novembre, buon flusso migratorio in particolare nella parte centrale della provincia.
- Anno 2016: 28-29 novembre, in seguito ad un fronte gelido da NE, è stato riscontrato un eccezionale fenomeno migratorio (mass migration) in particolare in alcune zone della provincia (Ternate, Cuveglio, Palude Brabbia, Gorla Minore, Varese), stimati qualche migliaio di indd. in migrazione.
- (Migratori acquatici - anno 1979 n° 1) 25/03/1978 12 indd. Lago Comabbio.
- (Bianchi et al., 1973) definita di passo periodico in primavera a piccoli gruppetti, segnalazioni relative al solo Lago di Varese negli anni: 1968, 1963, 1961, 1959, 1957, 1956, 1955.

	CHARADRIIFORMES	*BURHINIDAE*

106	**Occhione**	***Burhinus oedicnemus***	M	Rara		

- (Life Ticino Biosource/L. Giussani) Registrazione notturna: 08-09/10/2020 1 ind. Tornavento.
- (Ornitho) 7/03/2019 1 ind. Brebbia (L. Giussani, L. Nigro et al.), 10/05/2018 1 ind. Lonate Pozzolo (L. Pini), 7/04/2018 1 ind. Ternate "registrazione notturna" (Trektellen/L. Giussani), 26/01/2016 1 ind. recuperato morto dal veterinario M. Marelli nei pressi di Gorla Maggiore (rif. E. Bassi), 16/04/2012 2 indd. Lonate Pozzolo (S. Daverio), 19/04/2010 1 ind. Lozza (M. Tomasi), 18/02/2009 1 ind. Brebbia (rif. A. Boto).
- (EBN/BL) 27/04/2008 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua).
- (Bianchi et al., 1973) "non si hanno osservazioni recenti per questi territori " ... "cacciatori locali assicurano che questo trampoliere non è raro durante le epoche di passo". Segnalazioni: 27/09/1953 2 indd. Turbigaccio Lonate Pozzolo, 4/10/1951 1 ind. Turbigaccio Lonate Pozzolo, 6/11/1939 1 ind. Lisanza Sesto Calende.

	CHARADRIIFORMES	*HAEMATOPODIDAE*

107	**Beccaccia di mare**	***Haematopus ostralegus***	M	Rara		

- Solitamente individui isolati periodo aprile/giugno e agosto/settembre, Lago Maggiore in particolare Germignaga foce Tresa, Ispra e Monvalle.
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: luglio 1999 4 indd. Lago di Varese, 4/09/1999 1 ind. Lago Maggiore.
- (Migratori acquatici - anno 1978 n° 1) 18/09/1977 1 ind. loc. Bozza Lago Maggiore.
- (Bianchi et al., 1973) definita di comparsa rara nella tarda primavera e da fine agosto a metà settembre, segnalazioni anni: 1964 1963 1940 1936.

	CHARADRIIFORMES	*RECURVIROSTRIDAE*				
108	**Cavaliere d'Italia**	***Himantopus himantopus***	M B	Poco freq.	F	2020

- Specie osservata principalmente nei mesi primaverili e estivi, quasi esclusivamente nella zona umida delle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo.
- Interessanti osservazioni per luogo e numero individui: 25/04/2019 12 indd. Germignaga foce Tresa (F. Saporetti/Ornitho), 16/04/2019 11 indd. lago Varese (L. Giussani, L. Nigro /Ornitho).
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 26/04/1997 2 indd. Lago Maggiore, 29/03/2000 1 ind. Lago di Varese, 27/04/2000 14 indd. Palude Brabbia.
- (Bianchi et al., 1973) definito molto raro, segnalazioni anni: 1964,1953.

●Note nidificazione:

- Le nidificazioni ad oggi accertate in provincia sono tutte avvenute in un'area confinante con la provincia di Milano (Vasche Arnetta Lonate Pozzolo), prima nidificazione documentata anno 2011. Alcune nidificazioni antecedenti il 2010 non risultano relative alla provincia di Varese ma alla zona confinante delle Vasche di fitodepurazione di Castano Primo (MI).

109	**Avocetta**	***Recurvirostra avosetta***	A6 (2)	Molto rara		

- (Ornitho) 11-12/05/2016 1 ind. Germignaga (M. Viganò, F. Saporetti et al.), 8/05/2011 2 indd. Sabbie d'Oro Ispra (E. Giussani).
- (Bianchi et al., 1973) definita molto rara, segnalazioni anni: settembre 1969 1 ind. loc. Bruschera Angera, 15/01/1968 1 ind. catturato loc. Bruschera Angera, marzo 1962 1 ind. catturato Palude Brabbia, 3/04/1958 1 ind. catturato Palude Brabbia (collezione E. Bianchi).

	CHARADRIIFORMES	*CHARADRIIDAE*				
110	**Pavoncella**	***Vanellus vanellus***	M Wirr B	Poco freq.	F	2020

- Più frequentemente osservata nel periodo febbraio-marzo e luglio-novembre.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, unico dato anno 2002 1 ind. Lago Maggiore.

●Note nidificazione:

- (Ornitho) dal 26/05 a 2/06/2020 confermata nidificazione in una località situata nella parte meridionale della provincia, osservati indd. adulti con 1 pulcino (F. Casale, T. Zennaro et al.), prima nidificazione confermata e documentata con foto in questo secolo.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987, anno 1984 Palude Brabbia - 2 coppie con nido.
- (Realini, 1977) periodo aprile-maggio 1977 Palude Brabbia, rinvenimento di un nido con 4 uova (R. Aletti), prima nidificazione accertata a livello provinciale. Nello stesso anno e nella stessa zona furono poi rinvenuti altri 2 nidi.

111	**Piviere dorato**	***Pluvialis apricaria***	M Wirr	Rara		

- (Life Ticino Biosource/L. Giussani) Registrazione notturna: 20-21/09/2020 1 ind. Tornavento, 22-23/09/2020 1 ind. Tornavento, 29-30/11/2020 2 indd. Tornavento.
- (Ornitho) 9/12/2020 1 ind. foce Tresa Germignaga (M. Viganò), 7/12/2020 1 ind. Biandronno apparso inizialmente debilitato si é poi involato (F. Tenconi), 4/03/2019 1 ind. Brebbia (L. Giussani), 3/03/2019 1 ind. Saronno (P. Bonvicini), 24/09/2016 1 ind. Germignaga (A. Capoferri), 26/12/2013 > 4 indd. Ferno (S. Daverio), 24/12/2012 3 indd. Ferno (S. Daverio), 26/11/2011 1 ind. Lonate Pozzolo (A. Vidolini), 4/12/2010 1 ind. Cuvio (M. Carabella, R. Pianezza).
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 14/05/1997 1 ind. Lago Maggiore.
- (G. Corbellini rif.) settembre 1990 1 ind. osservato e fotografato alla foce Tresa a Germignaga.
- (Bianchi et al., 1973) definito di passo, non comune. Occasionalmente qualche volo, anche di 50 individui, si fa sorprendere nelle rare insenature del Ticino e nelle campagne di Brebbia e di Monvalle, una sola segnalazione documentata: 9/04/1933 1 ind. f. Lisanza Lago Maggiore.

112	**Pivieressa**	***Pluvialis squatarola***	A8 (7)	Molto rara		

- (Ornitho) 17/10/2020 1 ind. Aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto), 27-29/09/2019 1 ind. Sesto Calende (L. Giussani, V. Piola), 1/05/2017 4 indd. Foce Tresa Germignaga (F. Saporetti, L. D'Orazio, M. Bergomi), 24/05/2015 2 indd. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti), dal 25/09/2013 al 6/10/2013 1-3 indd. Ispra/Besozzo (oss. vari), dal 4/09/2012 al 10/09/2012 1 ind. Monvalle/Besozzo (L. Giussani et al.).
- (EBN/BL) 8-10/10/2005 1 ind. Germignaga (M. Viganò).
- (Saporetti 1977a) 25/04/1976 2 indd. foce fiume Tresa Luino (F. Saporetti).
- (Bianchi et al., 1973) definita rarissima, non vengono indicate segnalazioni provinciali.

113	Corriere grosso	*Charadrius hiaticula*	M	Poco freq.		

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa ad alune zone rivierasche del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, Besozzo, foce del Tresa a Germignaga).
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 14/05/1997 3 indd. Lago Maggiore.
- (Bianchi et al., 1973) definito raro, esclusivamente di passo lungo il Ticino.

114	Corriere piccolo	*Charadrius dubius*	M B	Freq.	C	2020

- Osservazioni da fine marzo a settembre, con punte nei mesi di aprile e maggio.
- Interessante numero di individui osservati: 3/04/2019 23 indd. Monvalle (L. Giussani/Ornitho).

●Note nidificazione:
- Post 2009 nidificazioni saltuarie di qualche coppia: Germignaga, Ternate, Varese, Lonate Pozzolo e dal 2018 al 2020 in una nuova località nei pressi di Gorla Minore.
- (Gagliardi et al., 2007) durante l'indagine 2003-2005 si è riprodotto in due differenti ambienti: foce del Fiume Tresa a Germignaga e più diffusamente lungo il corso del Fiume Ticino tra Castelnovate e Tornavento.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nidificante in alcune località adatte nella parte sud-orientale e meridionale della provincia, greti ciottolosi e sabbiosi del Fiume Ticino e cave di ghiaia e sabbia in disuso o in parziale attività.

115	Fratino	*Charadrius alexandrinus*	Ast2	Stor.		

- (Saporetti 1977a) 1/04/1974 1 ind. foce fiume Tresa Germignaga (F. Saporetti).
- (Bianchi et al., 1973) definito raro, di passo lungo il Ticino. 13/04/1964 1 ind. Fiume Ticino.

116	Piviere tortolino	*Charadrius morinellus*	M	Rara		

- (Life Ticino Biosource/L. Giussani) Registrazione notturna: 19-20/08/2020 1 ind. Tornavento.
- (Ornitho) 26/09/2020 > 2 indd. Monte Chiusarella Varese (P. Fumagalli), 21/10/2018 2 indd. Ternate (a poca distanza l'uno dall'altro) "registrazione notturna" (Trektellen/L. Giussani), 12/09/2017 1 ind. Ternate "registrazione notturna" (Trektellen/L. Giussani), 5/09/2017 1 ind. Ternate "registrazione notturna" (Trektellen/L. Giussani), 28/08/2016 1 ind. Ferno (S. Daverio), 8/08/2013 1 ind. Lonate Pozzolo (S. Daverio).
- (EBN/an2004) 15/09/2004 1 ind. juv Germignaga Lago Maggiore (M. Viganò).
- (Migratori acquatici - anno 1986 n° 4) 16/03/1986 1 ind. loc. Bruschera Angera Lago Maggiore.
- (Bianchi et al., 1973) definito raro, pochi individui vengono presi di tempo in tempo sia lungo i corsi dei fiumi come nelle brughiere, 29/09/1961 1 ind. m. juv. catturato nei pressi di Cairate (note personali prof. Moltoni) e settembre 1957 1 ind. piana della Malpensa.

	CHARADRIIFORMES	*SCOLOPACIDAE*

117	Beccaccia	*Scolopax rusticola*	M W B	Poco freq.	E	2006

- Osservazioni nei mesi autunnali/invernali di individui in migrazione e sosta, e fine inverno - inizio primavera durante la migrazione prenuziale.

●Note nidificazione:
- Dal 2010 nessun dato di nidificazione certa o probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 non è stato possibile accertare la nidificazone certa della specie, solo segnalazioni di nidificazione probabile in diverse aree del territorio provinciale.

Al di fuori della ricerca l'unico dato di nidificazione certa relativo a questo secolo è il rinvenimento di un nido con uova nella prima decade di aprile del 2006, individuato attraverso una ricerca mirata con l'ausilio di cani da ferma addestrati.
- (Soave e Rizzi, 1997) segnalati 2 indd. in periodo riproduttivo 1992-1995 nel Parco dell'Alto Milanese comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano.
- (Realini, 1982) nel tratto del Ticino in provincia di Varese, nei confini della Riserva di caccia "La Maddalena", nel 1970 "sarebbero venuti alla luce 3 piccoli".
- (Bianchi 1963, Bianchi et al., 1973) viene segnalata come nidificante nei luoghi adatti, in particolare nella zona montuosa della provincia.

118	**Frullino**	*Lymnocryptes minimus*	M Wirr	Rara		

- (Ornitho) 20/10/2018 1 ind. Lonate Pozzolo (F. Aresi, P. Bonazzi), 2/12/2015 1 ind. Golasecca (F. Casale), 23/04/2014 1 ind. Ternate (L. Laddaga), 4/04/2014 2 indd. Ternate (L. Laddaga), 24/10/2013 1 ind. Ternate (L. Laddaga), 27/09/2013 1 ind. Sabbie d'Oro Ispra (L. Giussani), 9/04/1983 >3 indd. Palude Brabbia (F. Ornaghi).
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 26/04/1997 1 ind. Sabbie d'oro Brebbia.
- (Migratori acquatici - anno 1978 n° 3) 6/05/1978 1 ind. Palude Brabbia.
- (Bianchi et al., 1973) definito di passo in marzo-aprile, mai abbondante. Scarso e irrilevante nel passo autunnale.

119	**Croccolone**	*Gallinago media*	M Bst	Rara	A	1943

- (EBN/BL) 30/04/2011 1 ind. Palude Brabbia (P. e L. Casali), 24/04/2008 1 ind. Palude Brabbia (P. Casali).
- (Luoni e Scandolara, 2008) aprile 2008 1 ind. Palude Brabbia.
- (EBN/an2007) 28/04/2007 2 indd. Palude Brabbia (L. Marocchi, P. Casali).
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 24/02/1997 2 indd. Palude Brabbia, 12/03/2000 1 ind. Palude Brabbia.
- (Migratori acquatici - anno 1978 n° 3) 6/05/1978 1 ind. Palude Brabbia.
- (Bianchi et al., 1973) definita specie poco osservata, il ripasso primaverile avviene in aprile e nella prima quindicina di maggio, il passo autunnale praticamente inesistente. Vengono riportate diverse segnalazioni di presenza nei mesi di aprile e maggio tra il 1930 e il 1950 in alcune zone rivierasche del Lago di Varese.
- (Riva, 1860) tra i siti dove è più facile rinvenire questa specie viene indicata "la Brebbia vicino a Varese". (N.d.R. forse Brabbia in riferimento a Palude Brabbia, oppure effettivamente Brebbia dove in quegli anni nei pressi di Brebbia erano presenti alcune torbiere e zone paludose come riportato in "Quaglia G., 1884").
- (Monti, 1845) tra i siti dove il croccolone abbonda viene citata la Palude Brabbia.

●Note nidificazione:

- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Bianchi et al., 1973) riporta la segnalazione di due casi di nidificazione sulle sponde del Lago di Varese, sottobosco ontani zona del Pan (attuale zona fronte lago Volo a Vela Calcinate del Pesce): 1936 -1937 nido con tre uova e giugno 1943 nido con 4 uova con nascita piccoli prima decade di luglio.

120	**Beccaccino**	*Gallinago gallinago*	M W Bst	Poco freq.	A	1977

- Mesi di maggior presenza: agosto e settembre.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 4 (IWC gennaio 2016).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, scarsi i dati come svernante, 2010 1 ind. Palude Brabbia, 2002 1 ind. Lago Maggiore, 2001 1 ind. Palude Brabbia, 1998 1 ind. Lago di Varese.

●Note nidificazione:

- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Realini, 1977) 28/05/1977 rinvenuto nella Palude Brabbia un nido con 4 uova, prima nidificazione documentata in Italia.

N.d.R. - in riferimento a "prima nidificazione documentata in Italia" segnaliamo un dato antecedente al 1977 relativo a 4 uova di beccaccino trovate presso il fiume Stura in Piemonte il 7/06/1958 e consegnate al Museo Civico di Milano (nota dei revisori in Martorelli, 1960).

121	**Pittima reale**	*Limosa limosa*	A9 (3)	Molto rara		

- (Ornitho) 15/03/2018 1 ind. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti), 19/02/2012 1 ind. Schiranna/Cazzago (M. Tomasi, L. Prada et al.), 13/10/2010 1 ind. foce Tresa Germignaga (C. Scandolara).
- (A. Viganò rif.) 5/10/1997 4 indd. loc. Bruschera Angera Lago Maggiore (P. Zanetti).
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 20/03/1997 1 ind. Palude Brabbia, 28/03/1998 1 ind. Lago Maggiore, 14/03/1999 3 indd. Lago di Varese.
- (Viganò, 1995) seconda decade di novembre 1995 1 ind. Palude Brabbia.
- (S. Esterri rif.) primi anni '80 in primavera osservati e fotografati 7 indd. in Palude Brabbia nei pressi di Varano Borghi, in una zona in quel periodo completamente allagata.
- (Bianchi et al., 1973) definita rara, segnalazioni non documentate decennio 1930/1940 Lago Maggiore e in alcune altre località confinanti con la provincia.

122	**Pittima minore**	*Limosa lapponica*	M	Rara		

- (Ornitho) set 2019, set 2018, set 2016, set ott 2013, sett 2010, max 2 indd. (oss. vari).
- (A. Viganò rif.) 28/03/1998 1 ind. lido del Laurass Ispra.
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 24/04/1997 1 ind. lido del Laurass Ispra.

123	**Chiurlo piccolo**	*Numenius phaeopus*	M	Rara		

- Le recenti segnalazioni sono in particolare relative al Lago Maggiore nei mesi primaverili.
- Interessante numero di individui osservati: 11/04/2013 stormo di 21 indd. in migrazione Casale Litta (A. Martinoli, L. Laddaga/Ornitho).
- (M. Viganò rif.) 9/04/2005 5 indd. Germignaga.
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 18/04/1998 1 ind. foce fiume Tresa Germignaga.
- (Bianchi et al., 1973) definito scarso, sconosciuto ai cacciatori o confuso con il chiurlo maggiore, segnalazioni anni 1968, 1965, 1943 e catture non documentate a Lisanza.
- (Martorelli, 1960) segnalato qualche volta sul Lago Maggiore nella zona di Lisanza.

124	**Chiurlottello**	*Numenius tenuirostris*	Ast1	Stor.		

- (Bianchi et al., 1973) definita specie rarissima. 3/11/1917 1 ind. ucciso in località Sabbie sul Ticino.
- (SBCWG - Gruppo di lavoro sul chiurlottello www.slenderbilledcurlew.net) viene ormai indicato come l'uccello più raro del Paleartico occidentale, in pericolo di estinzione e senza avvistamenti confermati dal 1998.

125	**Chiurlo maggiore**	*Numenius arquata*	M Wirr	Rara		

- Le recenti scarse segnalazioni sono in particolare relative al Lago Maggiore, Ferno zona Malpensa e Lonate Pozzolo.
- (Laddaga e Casale, 2014) 13/11/2013 2 indd. Palude Brabbia (G. Zanetti), 23/04/1998 1 ind. Palude Brabbia (A. Viganò dati ined.).
- (EBN/BL) 3/04/2008 1 ind. Ispra/Brebbia Lago Maggiore (P. e L. Casali), 01/01/2009 1 ind. Varese (A. Giusto).
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 19/04/1998 1 ind. Lago Maggiore, 23/04/1998 1 ind. Palude Brabbia.
- (Laddaga e Casale, 2014) negli anni '80 qualche indd. frequentava i prati umidi nei pressi della località Gaggio Palude Brabbia (G. Pinoli, com. pers.).
- (Bianchi et al., 1973) definita specie di doppio passo, regolare tutti gli anni sempre però in scarso numero.

126	**Piro piro codalunga**	*Bartramia longicauda*	A1 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) 28/10/2011 1 ind. area Malpensa Lonate Pozzolo (A. Vidolini).

127	**Totano moro**	*Tringa erythropus*	M	Rara		

- Le poche osservazioni sono quasi tutte relative al Lago Maggiore e alle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo, numero massimo delle osservazioni nei mesi di aprile e settembre.
- Interessante osservazione per il periodo: 20/11/2017 1 ind. Bruschera Angera (M. Manica/Ornitho).
- Interessante numero di individui osservati: 20/04/2013 13 indd. campo allagato a fianco dei Vasconi Arnetta Lonate Pozzolo (A. Nicoli-EBN/BL).
- (Tosi e Zilio, 2002) progetto SIT-Fauna 1997/2000: 16/04/1997 3 indd. Lago Maggiore, 01/09/1998 1 ind. Lago Maggiore.
- (Bianchi et al., 1973) 5/05/68 diversi indd. osservati al laghetto di Biandronno.

128	**Pettegola**	*Tringa totanus*	M	Poco freq.		

- Principali osservazioni nei periodi di aprile-maggio e agosto-settembre in alcune zone rivierasche del Lago Maggiore (Ispra, Besozzo, Germignaga) e alle Vasche dell'Arnetta di Lonate Pozzolo.
- (Bianchi et al., 1973) definita di doppio passo, più abbondante in quello primaverile.

129	**Albastrello**	*Tringa stagnatilis*	A1 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) 12/04/2013 1 ind. Germignaga (M. Carabella).

130	**Pantana**	*Tringa nebularia*	M Wirr	Poco freq.		

- La maggior parte delle osservazioni è relativa alle zone umide del Lago Maggiore (Sabbie d'Oro, foce Tresa a Germignaga) e alle Vasche dell'Arnetta a Lonate Pozzolo, numero massimo delle osservazioni nei mesi di agosto e settembre.
- Interessante segnalazione per il periodo (prima segnalazione documentata di presenza invernale): 20/01/2018 e 30/01/2018 1-2 indd. Lonate Pozzolo (G. Taverna/Ornitho).

131	**Piro piro culbianco**	*Tringa ochropus*	M Wirr	Poco freq.		

- La maggior parte delle osservazioni è relativa alle zone umide del Lago Maggiore (Bruschera, Sabbie d'Oro, foce del Tresa a Germignaga), Palude Brabbia e Vasche dell'Arnetta a Lonate Pozzolo.
Numero massimo delle osservazioni nei mesi di aprile e agosto.

132	**Piro piro boschereccio**	*Tringa glareola*	M	Poco freq.		

- La maggior parte delle osservazioni è relativa alle Vasche dell'Arnetta a Lonate Pozzolo, Lago Maggiore e Lago di Varese. Numero massimo delle osservazioni nel mese di agosto.
- Interessante numero di individui osservati: 9/07/2013 oltre 180 indd. Vasche dell'Arnetta a Lonate Pozzolo (M. Tomasi/Ornitho).

133	**Piro piro piccolo**	*Actitis hypoleucos*	M W B? Bst	Freq.	B	1967

- Osservazioni durante tutto il periodo dell'anno, più frequentemente nei periodi di aprile-maggio e agosto-settembre.
- Buona presenza di questa specie nella seconda metà di agosto 2018 con gruppi costituiti anche da una decina di individui.
●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 solo segnalazioni di nidificazione probabile localizzate: loc. Monvallina Lago Maggiore e alcuni tratti del fiume Ticino loc. Maddalena, Vizzola Ticino, Tornavento e Turbigaccio (Lonate Pozzolo).
- (Bianchi et al., 1973) "Nidificante lungo le sponde del Ticino ed anche dei suoi piccoli affluenti, il 15/06/1967 incontrammo al Ponte di Oleggio Ticino una coppia che con strida cercava di allontanarci dal tratto di riva boscosa dove certamente aveva i piccoli nascosti fra i sassi e le erbe".

134	**Voltapietre**	*Arenaria interpres*	M Wirr	Rara		

- (Ornitho) le poche osservazioni sono relative al Lago Maggiore, in particolare mesi di agosto settembre e ottobre, poche nel periodo primaverile.
- Interessante segnalazione per il periodo (prima segnalazione documentata di presenza invernale): 1/12/2019 1 ind. Angera (rif. M. Manica/Ornitho)
- (M. Viganò rif.) aprile 2004 1 ind. Germignaga.
- (Bianchi et al., 1973) 20/09/1966 1 ind. in abito autunnale osservato sul Lago Maggiore (F. Realini rif.).

135	**Piovanello maggiore**	*Calidris canutus*	M	Rara		

- Solitamente individui isolati o gruppetti di pochi individui, quasi esclusivamente Lago Maggiore mesi di agosto e settembre.
- (Ornitho) osservazioni: ago set 2016, ago 2015, ago 2012, set 2008, ago 2005, ago 2004, max 4 indd. (oss. vari).
- (Saporetti, 1977a) 1/05/1974 10 indd. foce fiume Tresa Germignaga.
- (Bianchi et al., 1973) definito rarissimo, 4/12/1969 1 ind. catturato a Lisanza Lago Maggiore (collezione Martire).

136	**Piovanello tridattilo**	*Calidris alba*	M	Poco freq.		

- Isolato o anche in gruppi di alcuni individui, normalmente periodi aprile/maggio e agosto/settembre, esclusivamente in alcune zone rivierasche del Lago Maggiore.

137	**Gambecchio comune**	*Calidris minuta*	M Wirr	Poco freq.		

- Le osservazioni sono in gran parte riferite ad alcune località del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, Angera, foce del Tresa a Germignaga), in particolare mesi di agosto e settembre.
- Interessante segnalazione per il periodo: 10/01/2011 8 indd. Sesto Calende (A. Viganò/Ornitho), unica segnalazione invernale nota post 2000.
- (Bianchi et al., 1973) definita specie di doppio passo e invernale, decisamente scarsa, segnalazioni anni: 1963. Nella Collezione Vandoni ed in quella del Civico Museo di Milano esistono esemplari provenienti dal Lago Maggiore.

138	**Gambecchio nano**	*Calidris temminckii*	M	Rara		

- Le poche osservazioni sono in gran parte riferite ad alcune località del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, Angera, foce del Tresa a Germignaga) e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo.
- (Bianchi et al., 1973) definita specie rara di passo, segnalazioni documentate: 9/5/1968 Biandronno alcuni individui di cui 1 catturato e conservato, maggio 1963 1 ind. Fiume Ticino.

139	**Piovanello comune**	*Calidris ferruginea*	M	Rara		

- Scarsamente osservato, solitamente in numero limitato di individui e quasi esclusivamente nei mesi di fine estate, in particolare con condizioni di basso livello idrico del Lago Maggiore (Besozzo, Ispra, Germignaga, Angera).
- Discreta presenza agosto e settembre 2016 in alcune zone rivierasche del Lago Maggiore.
- (Bianchi et al., 1973) un solo dato ma Piana di Magadino Svizzera, nessuna segnalazione per la provincia.

140	**Piovanello pancianera**	*Calidris alpina*	M Wirr	Poco freq.		

- In particolare nel periodo agosto/ottobre con condizioni di basso livello idrico del Lago Maggiore, altre segnalazioni durante la migrazione primaverile.

141	**Combattente**	*Philomachus pugnax*	M	Poco freq.		

- La maggior parte delle osservazioni è relativa ad alcune zone rivierasche del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, foce del Tresa a Germignaga) e alle Vasche dell'Arnetta a Lonate Pozzolo.
- (Bianchi et al., 1973) definito di doppio passo regolare.

142	**Falaropo beccosottile**	*Phalaropus lobatus*	A2 (1)	Molto rara		

- (EBN/an2004) dal 17/10/2004 al 24/10/2004 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (A. Turri, A. Giusti, C. Dell'Acqua et al.).
- (Giglioli, 1907) 4/09/1887 1 ind. catturato sul Lago di Varese e consegnato a E. Bonomi di Milano, successivamente donato al Museo di Storia Naturale di Milano (Bianchi et al., 1973).

143	**Falaropo beccolargo**	*Phalaropus fulicarius*	A2 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) 19-20/05/2019 1 ind. probabile 2° anno di calendario (2cy) foce Tresa Germignaga (F. Saporetti et al.).
- (Bianchi et al., 1973) definito accidentale. Prima quindicina di novembre 1949, 1 ind. catturato a Sesto Calende (donato al Museo di Milano).

	CHARADRIIFORMES	*GLAREOLIDAE*				
144	**Corrione biondo**	*Cursorius cursor*	Ast	Stor.		

- (Foschi U. F. et al., 1996) agosto 1908 1 ind. f. ad. Lago di Varese (collezione ornitologica Arrigoni degli Oddi).
- (Bianchi et al., 1973) 9/11/1880 1 ind. catturato sul Lago di Varese (donato al Museo Civico di Varese), altre segnalazioni non documentate anno 1831.
- (Balsamo-Crivelli, 1844) segnala, senza indicare il numero, qualche cattura ante-1844 nel Varesino.

	CHARADRIIFORMES	*LARIDAE*				
145	**Gabbiano tridattilo**	***Rissa tridactyla***	A8 (2)	Molto rara		

- (Ornitho) 8 e 9/12/2017 1 ind. 1° anno di calendario (1cy) Porto Ceresio (D. Ronconi et al.), 4/09/2012 1 ind. 1° anno di calendario (1cy) Luino (M. Viganò).
- (Guenzani e Zarbo, 2006) Lago Maggiore censimento invernale 1998, 2 indd. osservati.
- (Bianchi et al., 1973) segnalazioni documentate: 2/05/1965 8 indd. loc. Sabbie d'Oro Lago Maggiore, 25/05/1937 1 ind. Lisanza, 15/11/1926 1 ind. Luino, febbraio 1947 1 ind. Lisanza, 13/12/1941 Lago Ceresio.

146	**Gabbiano comune**	***Chroicocephalus ridibundus***	M W	Molto freq.		

- Le massime presenze sono relative ai mesi invernali, i primi individui (solitamente adulti) giungono nei principali laghi della provincia durante il mese di luglio.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 4291 (IWC gennaio 2018), i dati sono sicuramente in difetto considerando che molti indd. lasciano i nostri laghi alle prime luci dell'alba per spostarsi in zone diverse di alimentazione.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, diffuso come svernate con un valore medio indd. censiti di oltre 2000 indd./anno e un max di 4247 indd. nel 2001.

147	**Gabbianello**	***Hydrocoloeus minutus***	M Wirr	Poco freq.		

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al Lago Maggiore e Lago di Varese, in particolare nei periodi aprile/maggio e agosto/settembre.
- Interessante numero di individui osservati: 24/04/2012 > 156 indd. Lago di Varese (A. Vidolini, D. Casola/Ornitho).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, 2 soli indd. censiti sul fiume Ticino nel 2010.
- (Bianchi et al., 1973) definito raro in autunno, più frequente in primavera.

148	**Gabbiano corallino**	***Larus melanocephalus***	M Wirr	Poco freq.		

- La quasi totalità delle osservazioni si riferisce al Lago Maggiore, in particolare alla foce del Tresa, qualche osservazione alle vasche dell'Arnetta a Lonate Pozzolo e Lago di Varese.
- Interessante numero di individui osservati: 14/04/2019 13 indd. Lago di Varese, in volo insieme a migliaia di rondoni (F. Aresi et al. /Ornitho).

149	**Gavina**	***Larus canus***	M W	Freq.		

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al periodo invernale, in particolare Lago Maggiore e Lago di Varese.
- (Ornitho) ssp nominale heinei osservazioni provinciali anni 2019-2020: 11/01/2019 1 ind. loc. Schiranna Lago di Varese, dal 24/01 al 11/02/2019 1 ind. Ranco Lago Maggiore, dal 28/12/2019 al 3/01/2020 1 ind. Ranco Lago Maggiore, 21/02/2020 1 ind. foce Tresa Germignaga (L. Giussani et al.).
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 118 (IWC gennaio 2013).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, terzo laride svernante più diffuso dopo il gabbiano comune e reale. Nel 1997 censiti 109 indd. (di cui circa l'80% sul Lago Maggiore); nel decennio 2001-2010 sul Lago Maggiore registrati in media 41 indd./anno; per Lago di Monate, di Varese e di Lugano dati sempre inferiori ai 20 indd./anno.

150	**Mugnaiaccio**	***Larus marinus***	A2 (2)	Molto rara		

- (EBN/an2006) 2/03/2006 1 ind. ad. Gorla Maggiore (A. Nicoli).
- (EBN/an2005) 8/12/2005 1 ind. imm. Ispra Lago Maggiore (O. Janni, A. Nicoli, R. Garavaglia).

151	**Gabbiano reale nordico**	***Larus argentatus***	M W	Poco freq.		

- La gran parte delle osservazioni sono relative al periodo invernale, quasi esclusivamente Lago di Varese e Lago Maggiore.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 2 (IWC gennaio 2013 e 2017).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, prima segnalazione nel 2006 con 2 indd. Lago Maggiore, 2010 2 indd. Lago Maggiore e 3 indd. Lago di Comabbio.

152	**Gabbiano reale pontico**	*Larus cachinnans*	M W	Poco freq.		

- La gran parte delle osservazioni sono relative al periodo invernale Lago di Varese e Lago Maggiore.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 8 (IWC gennaio 2013).
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, prima e unica segnalazione durante i censimenti IWC nel 2006 1 ind. Lago Maggiore.

153	**Gabbiano reale**	*Larus michahellis*	SM B W	Molto freq.	C	2020

- La stagione invernale è il periodo di maggior presenza della specie.
- Censimenti invernali IWC post 2010: numero massimo indd. censiti 379 (IWC gennaio 2018), i dati sono sicuramente in difetto considerando che molti indd. lasciano i nostri laghi alle prime luci dell'alba per spostarsi in zone diverse di alimentazione.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, nel decennio 2001-2010 si registra una progressione costante del n° di indd. arrivando a un massimo di 327 indd. censiti nel 2008, poi calo del 50% nel 2009 e aumento nel 2010 ai massimi del decennio.

●Note nidificazione:
- Prime nidificazioni in contesto urbano: maggio 2020 nidificazione su una gru usata per la ristrutturazione di un edificio (3 pulli di cui uno solo è riuscito a sopravvivere) in una zona centrale di Varese (B. Mazzon rif.), 20/07/2019 richiami di alcuni pulli provenienti dal tetto di un palazzo in una zona centrale di Varese (P. Casali/BirdAlertVA).
- (Ornitho) maggio 2013, 2 ad. e 1 pullo, su un pontile a Lisanza (F. Saporetti, W. Guenzani et al.).
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 è risultato nidificare con certezza sulle sponde settentrionali del lago Maggiore in corrispondenza delle pareti rocciose verticali nei pressi di Pino (almeno 5 coppie).
- (Viganò, 1997) anno 1997 nidificazione accertata sul Lago Maggiore isolino Partegora Angera, pullo di 4 settimane accompagnato da adulto.

154	**Zafferano**	*Larus fuscus*	M W	Poco freq.		

- Presente quasi esclusivamente nei mesi invernali e di inizio primavera.
- (Saporetti e Carabella, 2012) censimenti invernali IWC 1986-2010, dati scarsi come svernante, 2006 2 indd. Lago Maggiore, 2010 1 ind. Lago di Lugano.

155	**Sterna zampenere**	*Gelochelidon nilotica*	A3 (3)	Molto rara		

- (Ornitho) 1/07/2020 4 indd. Bozza di Besozzo Lago Maggiore (L. Giussani).
- (F. Pianezza rif.) 18/07/2010 2 indd. loc. Arnetta in volo direz. Varese (C. Dell'Acqua, P. Alberti).
- (M. Carabella e F. Pianezza rif.) 3/05/2005 1 ind. in volo Palude Brabbia (zona Agricola Paludi).

156	**Sterna maggiore**	*Hydroprogne caspia*	A7 (7)	Molto rara		

- (Ornitho) 22/07/2020 1 ind. (con anello rosso tarso sx provenienza Svezia e metallico tarso dx) Sabbie d'Oro Ispra (L. Giussani), 14/07/2020 1 ind. Buguggiate Lago di Varese (V. Piola).
- (EBN/BL) 14/04/2019 1 ind. Capolago Lago di Varese (P. e L. Casali et al.).
- (Ornitho) 26/06/2018 1 ind. Capolago Lago di Varese (F. Aresi), dal 7/09/2013 al 12/09/2013 1 ind. juv loc. Bruschera Angera (R. Aletti et al.) con anello giallo zampa dx C99Y inanellato da pullus a Maksamaa (Vaasa) Finlandia l'11/07/2013 da Stefan Sjohlom, 27/07/2002 1 ind. Lago di Comabbio (A. Viganò).
- (M. Viganò rif.) settembre 2003 2 indd. Germignaga.

157	**Beccapesci**	*Thalasseus sandvicensis*	M	Rara		

- (Ornitho) 15/05/2020 2 indd. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti), 22/08/2019 1 ind. Sesto Calende (L. Giussani), 25/07/2019 1 ind. Besozzo (L. Giussani, V. Piola), 4/11/2018 1 ind. foce Tresa Germignaga (O. Brambilla), 27/10/2018 2 indd. Ispra (L. Giussani), 23/08/2017 1 ind. ad. ab. inv. Brebbia (L. Prada et al.), 11/07/2017 1 ind. Foce Tresa Germignaga (M. Bergomi, A. Pentassuglia et al.), 2/06/2015 1 ind. Besozzo (D. Bernasconi), 30/07/2011 3 indd. (2 ad. e 1 juv.) Germignaga (A. Martinoli).
- (M. Viganò rif.) maggio 2005 1 ind. Germignaga, 28/06/2004 1 ind. Germignaga.

158	**Fraticello**	***Sternula albifrons***	Ast1	Stor.		

- (Bianchi et al., 1973) definita specie molto rara. 13/10/1944 1 ind. m. catturato sul Lago Maggiore (donato Museo di Basilea).

159	**Sterna comune**	***Sterna hirundo***	M Bst	Poco freq.	A	1969

- Le poche osservazioni sono relative al periodo della migrazione primaverile e autunnale, in particolare Lago Maggiore, Lago di Varese e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo.
- Interessante numero di individui osservati: 23/06/2020 29 indd. Colmegna Lago Maggiore (F. Saporetti).

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Bianchi et al., 1973) numerose testimonianze di abituale nidificazione lungo il fiume Ticino fino al 1960, successivamente segnalato qualche caso di nidificazione nelle paludi di Angera Lago Maggiore.

160	**Sterna codalunga**	***Sterna paradisaea***	A1 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) 23/09/2016 1 ind. Ispra (L. Bergamaschi, L. Bonomelli et al.).

161	**Mignattino piombato**	***Chlidonias hybrida***	M	Rara		

- Le poche osservazioni si riferiscono quasi esclusivamente al Lago Maggiore e al Lago di Varese, mesi da aprile a settembre con punte massime nel mese di maggio.
- Interessante numero di individui osservati: 11/05/2014 12 indd. Lago Varese (R. Aletti, L. Laddaga /Ornitho).

162	**Mignattino alibianche**	***Chlidonias leucopterus***	M	Rara		

- Le poche recenti osservazioni si riferiscono quasi esclusivamente al Lago Maggiore e al Lago di Varese. Osservazioni periodi aprile/maggio e luglio/settembre.
- (Bianchi et al., 1973) definita specie molto rara.

163	**Mignattino comune**	***Chlidonias niger***	M Bst?	Poco freq.	A	1969?

- La quasi totalità delle osservazioni sono relative al Lago Maggiore e al Lago di Varese, qualcuna alle Vasche dell'Arnetta a Lonate Pozzolo.
- Interessante numero di individui osservati: 20/05/2010 oltre 200 indd. Besozzo Lago Maggiore (P. e L. Casali-EBN/IT).

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Casale et al., 2011) segnalato come nidificante storico in alcune province Lombarde tra cui quella di Varese.
- (Bianchi et al., 1973) negli anni '60 nei mesi di giugno e luglio vengono spesso osservati sul Lago Maggiore da Angera a Lisanza dei giovani imbeccati al volo dai genitori con dei pescolini. Ultima segnalazione documentata anno 1969. (N.d.R. - in riferimento a tale segnalazione la specie viene definita nidificante storica con qualche dubbio poiché, per quanto riguarda gli sternidi, le segnalazioni di indd. giovani imbeccati dagli adulti non possono essere considerate prove di nidificazione certa in riferimento al luogo di osservazione).

	CHARADRIIFORMES	*STERCORARIIDAE*				
164	**Stercorario maggiore**	***Stercorarius skua***	Ast2	Stor.		

- (W. Guenzani rif.) il 4/10/1986 1 ind. ferito da un cacciatore viene recuperato morente sul Lago Maggiore. L'individuo era inanellato e si scopre che il 29/09/1986 era stato trovato debilitato nei pressi di Intragna (Svizzera), consegnato alla "Stazione di cura di Ascona" di R. Hurzeler che, dopo le cure e la posa di un anello, veniva dopo un paio di giorni rilasciato.
- (Zanetti, 1978) 25/09/1976, 1 ind. (f. di 14 mesi con anello Museum London HW 52.707 inanellata da pullus il 15 lug. 1975 a Foula, Shetland, Scozia) catturato sul Lago di Varese e conservato (collez. P. Zanetti).
- (Bianchi et al., 1973) anno 1963 una cattura definita probabile e senza località indicata (non considerata).

165	**Stercorario mezzano**	***Stercorarius pomarinus***	A4 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) 8 e 12/12/2017 1 ind. (lo stesso nelle due date) 1° anno di calendario (1cy) morfismo scuro Lago Maggiore Ranco-Ispra (L. Giussani et al.).
- (Migratori acquatici - anno 1978 n° 4) 3/09/1978 2 indd. loc. Bruschera Angera Lago Maggiore.
- (Migratori acquatici - anno 1978 n° 1) 27/09/1977 1 ind. loc. Bruschera Angera Lago Maggiore, 27/08/1977 1 ind. Bruschera Lago Maggiore.
- (Bianchi et al., 1973) viene segnalata una sola cattura Lago Maggiore ma Belgirate (sponda piemontese non considerata).
- (Monti, 1845) una osservazione generica presso Angera (oss. generica non considerata).

166	**Labbo**	***Stercorarius parasiticus***	A4 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) dal 23/05 al 9/06/2015 1 ind. 3° anno di calendario (3cy) Besozzo-Brebbia (R. Aletti, W. Guenzani et al.). Il soggetto osservato in zona per 18 giorni è stato rinvenuto agonizzante da F. Aresi il giorno 9/06/2015 ed è morto poco dopo. L'esame autoptico, condotto dal Dott. Vet. Luca Visconti, ha accertato che l'animale è morto di cause naturali e che la causa del decesso è attribuibile a un'infezione da funghi (che causa granulomi concentrici sugli organi interni). L'esemplare è stato tassidermizzato e donato dal GIO al Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona.
- (Bianchi et al., 1973) novembre 1965 1 ind. catturato sul Lago Maggiore e conservato (L. Berrini), anno 1965 1 ind. trovato morente a Castiglione Olona e conservato nella raccolta del seminario di Venegono, 4/11/1963 1 ind. juv. m. catturato Lago di Varese (coll. E. Bianchi). Inoltre segnalazione non meglio documentata relativa al decennio 1955-1965 di 4 indd. uccisi sul Lago di Varese (N.d.R. non considerata).

167	**Labbo codalunga**	***Stercorarius longicaudus***	A8 (1)	Molto rara		

- (EBN/an2004) 1/09/2004 1 ind. juv rinvenuto stremato a Gallarate.
- (Bianchi et al., 1973) definito raro, settembre 1954 1 ind. Lago Maggiore (Martorelli, pag.112), 14/11/1949 1 ind. catturato a Lisanza sul Lago Maggiore e donato (collezione L. Favero). Altre segnalazioni tutte relative al Lago Maggiore: ottobre 1949 1 ind., settembre 1949 1 ind. (Martorelli, pag 112), 7/09/1935 1 ind. (Moltoni), 31/08/1930 1 ind. juv., 31/08/1925 1 ind. juv. (Moltoni).

	COLUMBIFORMES	*COLUMBIDAE*

168	**Piccione selvatico**	***Columba livia***	Sst Bst	Stor.	A	1929

- Le informazioni sotto indicate si riferiscono alla specie nominale selvatica, tuttavia "le popolazioni Italiane vivono in gran parte allo stato domestico (Columbia livia var. domestica, piccione di città), soprattutto nelle regioni centro-settentrionali ..." (Brichetti e Fracasso, 2006).
- Specie sedentaria nidificante storica non più contattata dopo il 1968.
- (Bianchi et al., 1973) "Dal 1962 al 1968 abbiamo constatato la presenza in maggio e giugno di alcuni soggetti nel "Vallone del Ceppone" sul monte Campo dei Fiori sopra Luvinate".

●Note nidificazione:

- (Arrigoni, 1929) segnala la presenza di una colonia nidificante sulle sponde del Lago Maggiore.

169	Colombella	*Columba oenas*	M Wirr B	Rara	F	2019

- In leggero aumento le segnalazioni post 2009 (sempre comunque in numero limitato di indd.), più frequentemente osservata nei mesi primaverili e nella parte centro meridionale della provincia.
- (Laddaga e Casale, 2014) 30/09/2013 1 ind. Palude Brabbia (F. Luoni).
- (EBN/BL) 17/10/2010 4 indd. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (A. Nicoli), 5/03/2007 6 indd. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C. Misin, A. Giusto), 21/03/2006 1 ind. Palude Brabbia (L. Marocchi).
- (Bianchi et al., 1973) definita non abbondante, di passo e invernale. Il 26/12/1971 numerosi indd. zona Malpensa, 7/2/1967 50 indd. zona Malpensa, altre segnalazioni anni: 1966, 1964, 1946.

●Note nidificazione:
- (G.I.O.) 15/06/2019 confermata nidificazione di almeno 1 coppia nei pressi di Sesto Calende (W. Guenzani, L. Giussani, R. Aletti); nello stesso luogo a partire dal mese di aprile osservati almeno 4 indd. ad. di cui una coppia certa con soventi e continui comportamenti nuziali.
- (Ornitho) Post 2016 alcuni riscontri di nidificazione probabile, comportamento nuziale, canto, display aereo in alcune località situate nella parte centrale e meridionale della provincia.
- (Casale, 2015) 2010-2014 segnalato qualche dato di "nidificazione probabile" in riferimento alla presenza di qualche coppia anche in un tratto del Fiume Ticino in provincia di Varese.
- (Realini, 1982) viene riportata un'unica notizia di nidificazione in riferimento al sig. Olivio Riva, secondo il quale una quindicina di anni fa (anni '60 secolo scorso) alcune coppie nidificavano regolarmente nella zona di Cantello in buchi di vecchi tronchi di Castagno.
- (Bianchi et al., 1973) agosto 1966 solo un dato di possibile nidificazione in riferimento all'osservazione di alcune colombelle di colorito chiaro in pastura nei pressi della Malpensa.

170	Colombaccio	*Columba palumbus*	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Specie essenzialmente migratrice e sedentaria solo parzialmente, in aumento come nidificante. Numero massimo delle presenze nel periodo primaverile.

171	Tortora selvatica	*Streptopelia turtur*	M B	Poco freq.	D	2005

- Le osservazioni sono tutte relative al periodo primaverile-estivo, in particolare maggio e giugno.

●Note nidificazione:
- Dal 2010 solo dati di nidificazione probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) ricerca 2003/2005, anche se la specie viene censita con classe di abbondanza comune, risulta nidificare con coppie sparse in prevalenza nel settore centro-meridionale e nel fondovalle della parte montuosa della provincia.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) ampiamente diffusa in tutto il territorio con l'esclusione delle estreme zone settentrionali, è legata alle aree pianeggianti e collinari. Non supera generalmente i 500/600 metri, con quota massima ascrivibile ai 720 metri dell'abitato di Vararo.

172	Tortora dal collare	*Streptopelia decaocto*	S B	Molto freq.	C	2020

- Specie quasi esclusivamente legata alle zone urbanizzate.
- (Bianchi et al., 1973) viene segnalata presente sin dal 1945, le colonie più numerose a Gallarate e Busto Arsizio.

	CUCULIFORMES	*CUCULIDAE*

173	Cuculo dal ciuffo	*Clamator glandarius*	A2 (1)	Molto rara		

- (EBN/an2007) 19/04/2007 1 ind. Luino (M. Viganò).
- (Bianchi et al., 1973) 1/10/1968 1 ind. juv ucciso sembra nei pressi di Castellanza e osservato presso un tassidermista di Gallarate (D. Fabris).

174	**Cuculo**	*Cuculus canorus*	M B	Freq.	C	2019

- Il massimo delle osservazioni durante la migrazione primaverile in particolare mesi di aprile e maggio.
●Note nidificazione:
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 viene individuato come uniformemente distribuito su tutto il territorio provinciale con un alto indice di frequenza. La ricerca dei nidi da parassitare rende la specie molto mobile con probabile sovrastima dell'effettiva presenza.

	STRIGIFORMES	*TYTONIDAE*

175	**Barbagianni**	*Tyto alba*	S B? Bst	Rara	B	1982

- Oltre all'esigua popolazione locale, possibili erratismi anche a medio raggio di individui giovani durante il periodo autunnale.
- (Ornitho) apr ago set 2020, dic 2019, giu set 2017, apr mag 2016, set ott 2015, ago 2013, ott nov 2011 max 1 ind. (oss. vari).
- (EBN/BL) luglio 2008 1 ind. Gorla Maggiore (A. Giusto).
- (Viganoni R. rif.) 3/06/2005 2 indd. posati su una strada presso Colmegna.
- (Laddaga e Casale, 2014) seconda decade marzo 1995 1 ind. Palude Brabbia (A. Viganò dati ined.).
- (Bianchi et al., 1973) "sino a dieci anni fa era molto comune nei paesini rurali della provincia, ora in alcune zone è addirittura rarissimo. Resta comunque un uccello comune se si osserva con quale frequenza sconcertante vengono affidati esemplari agli imbalsamatori locali".
●Note nidificazione:
- Specie sedentaria senza dati documentati di nidificazione certa in questo secolo, solo dati probabili.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 limitato il numero di individui osservati nel periodo di nidificazione, mai riscontrate prove di nidificazione certa. Al di fuori del periodo della ricerca l'unica nidificazione accertata e verificata da uno degli autori (W. Guenzani) risale al 1982 e si riferisce ad un nido con piccoli nel centro storico di Gerenzano.
- (Realini, 1982) le rare coppie nidificanti sono localizzate nella parte centro-settentrionale della provincia. Solo casi di nidificazione in pianura.

	STRIGIFORMES	*STRIGIDAE*

176	**Assiolo**	*Otus scops*	M B	Rara	F	2020

- Le recenti osservazioni sono tutte relative ad alcune località della parte centro-meridionale della provincia, periodo primaverile/estivo.
- (Bianchi et al., 1973) "La sua presenza passa quasi inosservata ... presente comunque con regolarità ogni anno, uniformemente distribuito sul territorio provinciale".
●Note nidificazione:
- Luglio 2020: confermate 2 nidificazioni in 2 diverse località situate nella parte meridionale della provincia; i 2 pulli di una delle coppie restano per 3 notti sul balcone di un'abitazione, nutriti dai genitori si involano poi senza problemi (W. Guenzani/Ornitho).
- Nidificazioni di una coppia nei pressi di Angera anni: 2018 2016 2015 2013 2011 2010 (rif. A. Ravasi e confermate dal G.I.O.).
- (Ravasi e Guenzani, 2014) 28/04/2010 Angera (prima nidificazione documentata in provincia), almeno 1 ind. juv. nel nido in cavità di un tronco morto di salice. La nidificazione si è ripetuta anche nel 2011 nella stessa località.
- (Ornitho) giugno 2009 Marnate - dati nidificazione probabile (G. Papale).

177	**Gufo reale**	***Bubo bubo***	S B	Rara	F	2020

- (G.I.O.) anni 2016-2020: dal 17/06/2016 (data prima osservazione) al 31/12/2020 osservati alcuni indd. (adulti e giovani) in cinque diverse località situate nella parte centro-settentrionale della provincia.
- (W. Guenzani rif.) 24/03/2018 1 ind. ad. recuperato morto a Cavaria con Premezzo e consegnato il 27/03/2018 a U.T.R. Insubria VA.
- (Aletti e Carabella, 2015) Varese: 21/01/2014 1 ind. conferito al CRAS di Vanzago (MI) con ala e zampa amputata; somministrata eutanasia.
- (Ornitho) 6/05/2013 trovate due piume a terra inconfondibili per colorazione e dimensioni nei pressi di Lonate Pozzolo (L. Laddaga).
- (G. Danini rif.) 30/10/2011 1 ind. in canto Monte Useria Arcisate.
- (Provincia di Varese, 2012) aprile 2007 1 ind. m. di 2 anni rinvenuto morto a Viggiù, maggio 2009 1 ind. ritrovato debilitato in Valle Olona (Induno Olona) e dopo le cure (presso il C.R.A.S. di Vanzago) rilasciato in luglio nella medesima località.
- (Aebischer, 2008) nel 2006 nei pressi di Laveno 1 ind. juv. marcato con radio satellitare in Canton Ticino nel 2005.
- (W. Guenzani rif.) 1996 1 ind. rinvenuto debilitato a Lozza e poi liberato nel 1997 dal WWF di Vanzago.
- (Bianchi et al., 1973) definita specie rara e di difficile osservazione. Segnalazioni: 1 ind. catturato a ottobre 1956 in località Valle Olona e portato al Museo di Milano.

●Note nidificazione:
- (G.I.O.) anni 2016-2020 nidificazioni confermate in alcune località situate nella parte centro-settentrionale della provincia (Siti A e B):
Anno 2020 - nidificazione per la prima volta in entrambi i siti (Sito A - 1 pullo, B - 2 pulli).
Anno 2019 - nidificazione (Sito A - 2 pulli).
Anno 2018 - nidificazione (Sito B - 4 pulli).
Anno 2017 - nidificazione in una nuova località sempre situata nella parte centro-settentrionale della provincia (Sito B - 3 pulli).
Anno 2016 - prima nidificazione documentata (Sito A - 3 pulli).

178	**Allocco**	***Strix aluco***	S B	Freq.	C	2019

- La specie è sedentaria ma può effettuare spostamenti a corto raggio ed erratismi locali.

●Note nidificazione:
- (Gagliardi et al., 2007) specie boschiva uniformemente distribuita in tutta la provincia, nidifica normalmente nella cavità degli alberi, riscontrata anche una nidificazione al suolo in una spaccatura di un vetusto Salice bianco, non insolito l'uso di nidi artificiali.

179	**Civetta nana**	***Glaucidium passerinum***	Ast	Stor.		

- (Bianchi et al., 1973) "osservati presso un imbalsatore di Gallarate uno o due esemplari di questa specie provenienti nominalmente dalle nostre prealpi".

180	**Civetta**	***Athene noctua***	S B	Freq.	C	2020

- Specie sedentaria con possibili erratismi a corto raggio di soggetti giovani dell'anno.

181	**Civetta capogrosso**	***Aegolius funereus***	Ast	Stor.		

- (Bianchi et al., 1973) viene segnalata la presenza sui nostri monti poiché ogni anno regolarmente rinvenuti soggetti portati ad imbalsamare, probabile catture roccoli dell'alto Varesotto durante gli erratismi autunnali.

182	**Gufo comune**	***Asio otus***	SM B W	Rara	C	2016

- Specie migratrice e sedentaria solo parzialmente in particolare in alcune zone di pianura e collina della provincia.

183	**Gufo di palude**	***Asio flammeus***	M	Rara		

- (Ornitho) 26/09/2020 1 ind. Aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto).
- (BirdAlertVA) 14/03/2020 1 ind. al confine con Ceriano Laghetto (MB) inseguito da una cornacchia grigia si dirige in volo verso Saronno (M. Monfrini).
- (Ornitho) 28/05/2018 1 ind. inizialmente osservato a Cogliate (MB) in una zona confinante con la provincia di Varese, si è poi diretto in volo nel territorio provinciale in direzione Saronno (W. Sassi), 13/05/2018 1 ind. Somma Lombardo (S. Daverio), 13/04/2012 1 ind. Lonate Pozzolo (rif. A. Vidolini), 19/03/2012 1 ind. Casorate Sempione (S. Daverio).
- (C. Dell'Acqua rif.) 14/03/2009 1 ind. osservato da birder belgi nella brughiera di Lonate Pozzolo.
- (EBN/IT) 26/10/2008 1 ind. Lonate Pozzolo (P. Alberti, A. Nicoli).
- (Banca dati G.d.p.) 1/10/2001 1 ind. Tradate (Biasioli rif.).
- (Laddaga e Casale, 2014) 14/11/1996 1 ind. Palude Brabbia (A. Viganò dati ined.).
- (Banca dati G.d.p.) 24/10/1957 1 ind. Saronno (Museo St. Nat. MI), aprile 1950 1 ind. Tradate (Collez. Osteologica Sterni), 5/10/1947 1 ind. Induno O. (Moltoni rif.), 31/03/1947 1 ind. Varese (Moltoni rif.), 10/11/1942 1 ind. Tradate (Moltoni rif.), 20/10/1936 1 ind. Gallarate (Moltoni rif.), 17/10/1931 1 ind. Lisanza (Museo St. Nat. MI), 27/09/1925 1 ind. Comabbio (Museo St. Nat. MI).
- (Bianchi et al., 1973) definito principalmente di passo. Sono segnalate catture non documentate nei dintorni dei laghi o lungo i boschi del Ticino, ed in Palude Brabbia e Bevera.

	CAPRIMULGIFORMES	*CAPRIMULGIDAE*

184	**Succiacapre**	***Caprimulgus europaeus***	M B	Poco freq.	F	2012

- Zone boscose e brughiere, in particolare nelle parte centrale (Valganna, Valcuvia e zone limitrofe) e meridionale della provincia (Tradate, Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino, Samarate) dove si riscontra una densità tra le più elevate a livello europeo.

●Note nidificazione:
- Nido di non facile individuazione.
- (Ornitho) 11/06/2012 1 ind. Lonate Pozzolo, nido contenente uova o piccoli (G. Bogliani).

	APODIFORMES	*APODIDAE*

185	**Rondone maggiore**	***Tachymarptis melba***	M B	Freq.	C	2020

- Presente da marzo a ottobre durante il periodo di nidificazione e di migrazione in alcuni centri urbani, in particolare Varese, Somma Lombardo, Gallarate, Samarate, Vergiate.

●Note nidificazione:
- (Gagliardi et al., 2007) le 11 sezioni in cui è stato censito sono localizzate nel settore centro-meridionale della provincia. Nessuna nidificazione è stata riscontrata sopra i 600 m. di altitudine, l'habitat riproduttivo è limitato a insediamenti urbani medio-grandi con palazzi e vecchie costruzioni, edifici storici, torri e campanili.
- (Bettoni, 1865-1868) segnala nidificazioni anche ad altitudini più elevate rispetto a quelle successivamente riscontrate in "Gagliardi et al., 2007", indicando: "il compianto professore De-Filippi ne vide di nidificanti sul Sacro Monte di Varese".

186	**Rondone comune**	***Apus apus***	M B	Molto freq.	C	2020

- I primi arrivi a fine marzo con punte massime dalla seconda metà di aprile alla prima metà di maggio, la quasi totalità delle partenze nella seconda metà del mese di luglio.

187	**Rondone pallido**	***Apus pallidus***	M Bst	Rara	A	1994

- Numero sempre limitato di osservazioni nel periodo compreso da marzo a ottobre.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Viganò e Schirru, 1995) anno 1994 osservazioni in ore crepuscolari al Battistero S. Vittore di Varese: 2/09/1994 3 coppie, 5/09/1994 3 coppie, 20/09/1994 2 coppie, 28/09/1994 1 coppia, 10/10/1994 uditi pigolii emessi dai giovani provenienti dal foro utilizzato dall'unica coppia rimasta. Ultima segnalazione il 12/10/1994 1 ind. in volo P.za Monte Grappa.

	CORACIIFORMES	*CORACIIDAE*				
188	**Ghiandaia marina**	***Coracias garrulus***	M Bst	Rara	A	anni '60

- (Ornitho) 22/05/2020 1 ind. Bedero Valcuvia (D. Gallotti), 17/08/2017 1 ind. Lonate Pozzolo (M. Pisoni rif. F. Casale), 18 e 19/05/2017 1 ind. f. Lonate Pozzolo (F. Bergo, F. Lorenzini et al.), 26/08/2016 1 ind. Ferno (S. Daverio), 18-22-24/05/2013 1-2 indd. Cardano al Campo (S. Daverio), 9/07/2012 1 ind. Lonate Pozzolo (S. Daverio), 9/05/2012 1 ind. Lonate Pozzolo (S. Daverio), 22-23/05/2011 1 ind. Lonate Pozzolo (F. Casale, R. Moneta).
- (EBN/BL) dal 21/08 al 12/09/2010 1 ind. Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua et al.).
- (EBN/an2005) 30/05/2005 1 ind. Cairate (C. Dell'Acqua).
- (EBN/an2004) 18/05/2004 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua).
- (A. Viganò rif.) maggio primi anni 2000 1 ind. Palude Brabbia.
- (Bianchi et al., 1973) definita di passo regolare, molto scarsa. 9/5/1968 1 ind. osservato posato sui fili di recinzione dell'aereoporto della Malpensa.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Bianchi et al., 1973) definita irregolarmente nidificante. Viene indicata senza una località precisa la segnalazione, effettuata da alcuni guardiacaccia, dell'avvenuta nidificazione nei buchi dei muri di alcuni frutteti.

	CORACIIFORMES	*ALCEDINIDAE*				
189	**Martin pescatore**	***Alcedo atthis***	SM B W	Freq.	C	2020

- Il periodo con il maggior numero di osservazioni è quello autunnale/invernale, dove ai residenti si aggiungono individui svernanti o in migrazione post-riproduttiva.

●Note nidificazione:
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza rara, la necessità di scegliere acque relativamente pulite per la ricerca delle prede abituali ne limita la presenza.

	CORACIIFORMES	*MEROPIDAE*				
190	**Gruccione**	***Merops apiaster***	M B	Poco freq.	C	2020

- Osservato quasi esclusivamente nel periodo aprile-settembre con punte nei mesi di maggio e agosto.

●Note nidificazione:
- Le recenti nidificazioni (post 2009) sono tutte relative a 2 - 3 località situate nella parte sud e nella parte centro-nord della provincia; nel 2019 nella località centro-nord presenti 12 coppie e 10 nidi occupati (M. Tomasi rif.).
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 nidificazione certa in 2 colonie poste in cave nelle sezioni di Lonate Pozzolo e Castiglione Olona.

	BUCEROTIFORMES	*UPUPIDAE*				
191	**Upupa**	***Upupa epops***	M Wirr B	Poco freq.	F	2020

- Quasi esclusivamente presente nel periodo primaverile-estivo, più frequentemente osservata nei mesi di aprile e maggio.
- Interessante segnalazione per il periodo (prima segnalazione documentata di presenza invernale): 27/01/2018 1 ind. Luino (R. Viganoni rif. F. Saporetti/Ornitho).

	PICIFORMES	*PICIDAE*				
192	**Torcicollo**	***Jynx torquilla***	M B	Poco freq.	D	2005

- Le osservazioni più frequenti sono relative ai periodi di aprile-maggio e agosto-settembre.
In notevole declino, anche come nidificante, a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso.
●Note nidificazione:
- Dal 2010 solo dati di nidificazione probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza rara con presenza scarsa e molto localizzata, la popolazione risente del trend negativo a livello italiano e europeo.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) viene individuato come nidificante su tutto il territorio, maggiormente diffuso sia nella parte collinare dove a coltivi alberati si alternano boschi di latifoglie e frutteti, sia nelle aree a margine di piccoli centri abitati. A nord nei fondovalle o nei primi rilievi delle principali valli e nella parte meridionale lungo il corso del Ticino. Può nidificare anche in manufatti, come pali della luce o nidi artificiali.
- (Casale, 2015) negli anni '80 del secolo scorso nel settore varesotto del Parco del Ticino erano presenti 3-5 territori di nidificazione (F. Casale).

193	**Picchio rosso minore**	***Dendrocopos minor***	S B	Freq.	C	2020

- Scarsamente diffuso e principalmente presente nella parte centro-meridionale della provincia, quasi esclusivamente pianura e bassa collina.

194	**Picchio rosso mezzano**	***Dendrocopos medius***	Ast1	Stor.		

- (Vigorita e Reguzzoni, 1987) secondo semestre del 1987, 1 ind. catturato e inanellato nella stazione di inanellamento di Torrascia (Cadegliano Viconago).

195	**Picchio rosso maggiore**	***Dendrocopos major***	S B	Molto freq.	C	2020

- Specie boschiva con buona diffusione su tutto il territorio provinciale, soprattutto nelle aree di alta pianura e di pianura.

196	**Picchio nero**	***Dryocopus martius***	S B	Freq.	C	2020

- Tutti i dati post 2005 confermano una graduale espansione territoriale, con spostamenti ad altitudini più basse raggiungendo il settore centro-meridionale della provincia.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie risulta ancora localizzata nel settore montano tra 400 e 1400 m di quota.
- (Bianchi et al., 1973) "Ai nostri giorni questa specie sembra essere assente dalle prealpi Varesine. Nel periodo dell'ultima guerra mondiale, nel suo dopoguerra e fin verso il 1956, cioè nel massimo dell'evoluzione del "cancro del castagno" , notammo personalmente nei boschi del comprensorio del Campo dei Fiori diversi soggetti in ogni stagione dell'anno compresa l'invernale".
●Note nidificazione:
- (Saporetti F. et al., 2011) durante l'indagine 2008-2012 del Gruppo Insubrico di Ornitologia nel 2009 viene documentata la prima nidificazione nel Parco del Ticino e nel 2010 nei boschi igrofili del Lago di Varese.
- (S. Colaone rif.) nel 2006 accertata la prima nidificazione nel Parco Pineta di Appiano Gentile Tradate.
- (Parnell et al., 1994) dopo le note di "Bianchi et al., 1973", la prima nidificazione nota in provincia risale al 1993 a Montegrino Valtravaglia.

197	**Picchio verde**	***Picus viridis***	S B	Molto freq.	C	2020

- Specie diffusa più o meno abbondantemente su tutto il territorio provinciale, con presenze comparabili a quelle del picchio rosso maggiore. La maggior diffusione nelle aree di pianura e collina.

	FALCONIFORMES	*FALCONIDAE*				
198	**Grillaio**	***Falco naumanni***	A3 (2)	Molto rara		

- (Ornitho) 5/08/2014 1 ind. f. ad. morto per impatto con aereo a Malpensa, riconoscimento confermato da Malfatti Luigi (inanellatore) sulla base di dati morfometrici e immagini di dettaglio del piumaggio e delle zampe (S. Daverio), 9/04/2006 1 ind. Germignaga (M. Viganò).
- (Moltoni, 1949) 7/05/1937 1 ind. catturato nei dintorni Varese.

199	**Gheppio**	*Falco tinnunculus*	SM B W	Freq.	C	2020

- Periodo con il maggior numero di osservazioni quello primaverile, dove ai residenti si possono aggiungere alcuni individui in migrazione.

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la distribuzione appare più sparsa nel settore settentrionale e più omogenea nella parte meridionale. A Nord prevalgono nidificazioni su pareti rocciose mentre nella parte meridionale i nidi vengono collocati su edifici e più raramente su piante riadattando nidi abbandonati di corvidi.

200	**Falco cuculo**	*Falco vespertinus*	M B?	Poco freq.	X	

- Le principali osservazioni sono relatve ai mesi di aprile e maggio.
- Interessante numero di individui osservati: 28/04/2020 14 indd. Aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto/Ornitho).
- (Bianchi et al., 1973) definita specie di doppio passo, abbastanza comune, scarsa nella migrazione autunnale.

201	**Falco della Regina**	*Falco eleonorae*	A2 (2)	Molto rara		

- (Ornitho) 24/05/2020 1 ind. osservato e fotografato nei pressi di Lonate Pozzolo (M. Pisoni), 17/08/2017 1 ind. probabile 2° anno di calendario (2cy) Monte Cuvignone Cittiglio (L. Giussani, A. Pentassuglia, M. Bergomi).

202	**Smeriglio**	*Falco columbarius*	M Wirr	Rara		

- Osservazioni nel periodo da ottobre a aprile, per la quasi totalità nella parte centro-meridionale della provincia.
- (Bianchi et al., 1973) definito di passo, scarso.

203	**Lodolaio**	*Falco subbuteo*	M B	Freq.	C	2019

- Le osservazioni più frequenti sono relative ai periodi di aprile-maggio e agosto-settembre.

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 vengono individuati due distinti gruppi riproduttivi: il primo nel settore centrale della provincia sezioni Lago di Varese e Sumirago e il secondo lungo l'asta del Ticino sezioni Vizzola Ticino e Lonate Pozzolo.
- (Viganò, 1995) segnalata una coppia nidificante in Palude Brabbia almeno dal 1995.
- (Brichetti e Cambi, 1982) la sua nidificazione è attualmente certa e confermata solo per le province di Milano boschi del Ticino e, fino a qualche anno addietro, anche brughiera di Gallarate (Toso, com. pers.).

204	**Sacro**	*Falco cherrug*	A1 (1)	Molto rara		

- (EBN/BL) 31/08/2015 1 ind. con anello rinvenuto morto a Gerenzano (G. Pozzi). Hungarian Bird Ringing Centre conferma: ind. sesso maschile inanellato da pullo il 20/05/2015 a Debrecen, Hajdu-Bihar, Hungary [HG44].

205	**Falco pellegrino**	*Falco peregrinus*	SM B W	Poco freq.	C	2020

- Durante la fase migratoria è possibile che qualche individuo proveniente dal Nord Europa si aggiunga alla popolazione locale.
- (Ornitho) prime osservazioni documentate della ssp calidus: 22/09/2020 1 ind. Brebbia (L. Giussani), 8/10/2019 1 ind. loc. Bruschera Angera (L. Giussani).

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 censite tra le 8 e le 10 coppie territoriali e si segnala un progressivo aumento delle coppie nidificanti.
- (Aresi e Guenzani, 1992) anno 1992 prima nidificazione provinciale accertata.

	PSITTACIFORMES	*PSITTACULIDAE*				
206	**Parrocchetto dal collare**	*Psittacula krameri*	S? Int	Rara		

- Specie introdotta o sfuggita alla cattività. Alcuni individui si sono naturalizzati e nidificano in qualche provincia vicina (MB MI PV). Non risulta aver mai nidificato nel territorio provinciale.
- Qualche rara segnalazione in provincia a partire dall'anno 2010.

	PASSERIFORMES	LANIIDAE				
207	**Averla piccola**	***Lanius collurio***	M B	Poco freq.	C	2019

- Presente quasi esclusivamente nel periodo primaverile estivo, maggio il mese con il maggior numero di osservazioni.
●Note nidificazione:
- Dopo l'ultima ricerca del 2003/2005 si riscontra un notevole declino su tutto il territorio provinciale.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 viene individuata con una distribuzione molto localizzata: a settentrione in particolare in Valcuvia, nella piana di Luino e Germignaga e Valle del Tresa; nella parte centrale collinare dove si registra la maggior concentrazione; nella zona merdionale nelle brughiere vicino al Ticino, nelle zone periferiche di alcuni grossi centri urbani (Busto Arsizio, Saronno) e in alcune zone di coltivi. Rispetto alla precedente ricerca si evidenzia un generale decremento della specie.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) uniformemente distribuita come nidificante in tutto il teritorio provinciale, dai 150 ai 1500 metri, con maggiore diffusione entro i 1100/1200 metri; più localizzata a quote superiori in corrispondenza di radure e alpeggi.

208	**Averla cenerina**	***Lanius minor***	A4 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) 30/05/2004 1 ind. m. Lonate Pozzolo (L. Giussani).
- (Bianchi et al., 1973) definita specie un tempo comune, che ha registrato negli ultimi 10 anni un calo numerico più che preoccupante, viene segnalata regolare presenza sino al 1962. "Giunge a stagione avanzata ma con una notevole regolarità". Segnalazioni documentate: 10/05/1965 1 ind. Cardano al Campo, 17/05/1964 2 indd. Ponte Oleggio, 17/05/1962 1 ind. Cardano al Campo.

209	**Averla maggiore**	***Lanius excubitor***	M W	Poco freq.		

- Osservata quasi esclusivamente nei mesi autunnali e invernali frequentemente nei pressi di alcune zone umide, in particolare Palude Brabbia e Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo, o in zone comunque aperte ai margini di ambienti boschivi.

210	**Averla capirossa**	***Lanius senator***	M Bst	Rara	A	anni '60

- (Ornitho) 4/05/2019 1 ind. Samarate (D. Dall'Osto, P. Monti), 28/05/2016 1 ind. Lonate Pozzolo (F. Bergo, F. Lorenzini), 6-7/05/2016 1 ind. Fagnano Olona (P. Monti et al.), 5/05/2016 1 ind. Lonate Pozzolo (S. Daverio), 16/06/2010 1 ind. Maccagno (R. Lardelli), 26/05/2008 1 ind. nei pressi dell'IPER di Varese (M. Tomasi).
- (Bianchi et al., 1973) "specie meno rara di quanto si credesse. Dopo una occasionale cattura di un maschio nel 1957 a Cardano al Campo non incontrammo più averle capirosse sino al 1964. Da allora, forse anche perché si prestò maggiore attenzione, ne incontrammo in quasi ogni località favorevole".
●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Realini, 1982) segnala come unico caso quello riscontrato dallo stesso autore ai tempi dell'infanzia: coppia che nidificava regolarmente nei pressi di Ispra.
- (Bianchi et al., 1973) segnala che la nidificazione dovrebbe avvenire entro la metà di giugno, poiché alla fine di tale mese è più facile vedere i giovani già ben sviluppati. Un'altra caratteristica indicata è la preferenza di alcuni individui che regolarmente ritornano nel medesimo albero per il nido.

	PASSERIFORMES	ORIOLIDAE				
211	**Rigogolo**	***Oriolus oriolus***	M B	Poco freq.	F	2012

- Le osservazioni più frequenti nei mesi di aprile, maggio e agosto.
●Note nidificazione:
- (Ornitho) 6/07/2012 4 indd. Lonate Pozzolo, adulto che trasporta il cibo per i piccoli durante il suo periodo di nidificazione, prima nidificazione documentata in questo secolo (F. Casale).

	PASSERIFORMES	CORVIDAE				
212	**Ghiandaia**	***Garrulus glandarius***	S B	Molto freq.	C	2020

- Durante il periodo primaverile e autunnale alla popolazione residente si possono aggiungere alcuni individui in spostamento migratorio.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 risulta ampiamente distribuito su tutto il territorio provinciale e risulta il corvide più diffuso dopo la cornacchia grigia.

213	Gazza	*Pica pica*	S B	Molto freq.	C	2020

- Dall'inizio del secolo in continua espansione sul territorio della provincia.

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 risulta una specie piuttosto comune, in particolare nella porzione centrale e meridionale della provincia. Nidifica di preferenza nella porzione pianeggiante e di bassa collina.

214	Nocciolaia	*Nucifraga caryocatactes*	S? M?	Rara		

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa alle zone montuose della provincia (Campo dei Fiori, Cuvignone, Veddasca) e si riferiscono con ogni probabilità a individui provenienti dalla zona Alpina, dove la specie è sedentaria e nidificante, o a migratori irregolari.
- (Bianchi et al., 1973) segnala che è relativamente frequente in autunno nelle pinete e nei noccioleti del Campo dei Fiori, del Piambello, della Martica e del Monte Nudo.
- (Martorelli, 1960) segnala una cattura (data non indicata) nel Varesotto in Valganna a meno di 400 m. di altitudine (collez. Vandoni).

215	Gracchio alpino	*Pyrrhocorax graculus*	Ast2	Stor.		

- Sedentario nidificante sulle Alpi e anche migratore irregolare, le poche osservazioni provinciali del secolo scorso si riferiscono probabilmente a migratori invernali o a fenomeni di erratismo.
- (A. Viganò rif.) 30/12/1993 2 indd. Val Viascoletta Alto Luinese.
- (Bianchi et al., 1973) definito accidentale, 18/12/1970 1 ind. osservato sostare nel Vallone del Parco Rigamonti a Taino.

216	Taccola	*Corvus monedula*	SM B W	Freq.	C	2020

- Alla popolazione residente si aggiungono individui erratici o in migrazione.
- Interessante numero di individui osservati: 19/07/2019 circa 150 indd. in spostamento serale, seguiti da altri gruppetti isolati, osservati nei pressi della Schiranna Lago di Varese (L. Giussani, L. Colombo/ Ornitho).

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 è emerso un sostanziale incremento degli insediamenti rispetto al precedente Atlante, individuati con certezza 7 siti riproduttivi.
- (Realini, 1982) le uniche colonie trovate sono Rocca di Angera e Chiesa di Somma Lombardo, si stimano circa 10 coppie nidificanti.

217	Corvo comune	*Corvus frugilegus*	M W	Poco freq.		

- La totalità delle osservazioni si riferisce a zone di pianura e fondovalle situate nella parte meridionale della provincia, da dicembre a febbraio il periodo di massima presenza.
- Numero massimo di indd. osservati: 28/11/2017 due stormi per un totale di 63 indd. (9 + 54) Rancio Valcuvia (M. Carabella/Ornitho).
- (Bianchi et al., 1973) definita di passo e svernante. "Sono quasi scomparsi quegli spettacolari voli di migratori caratteristici della specie ..... il calo numerico è impressionante ..... alcuni individui si attardano sino alla fine di aprile".

218	Cornacchia nera	*Corvus corone*	M W B	Freq.	F	2014

- Specie presente in particolare come svernante con individui in migrazione o provenienti dai settori alpini dove la specie è residente nidificante.

●Note nidificazione:

- (Ornitho) 7/05/2014 Valle dell'Olona, osservato ad. che trasporta cibo durante il periodo di nidificazione (M. Tomasi), prima nidificazione confermata in questo secolo.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 risulta l'ultima nidificazione certa a Cislago nel 1985.
- (Realini, 1982) l'unica notizia di nidificazione riportata è quella in riferimento al sig. Achille Moretti, secondo il quale avrebbe nidificato nella zona di Caronno Pertusella nel 1978.

219	Cornacchia grigia	*Corvus cornix*	S B	Molto freq.	C	2020

- In espansione come sedentaria sul territorio provinciale, ai residenti durante l'anno si possono aggiungere anche individui svernanti e in migrazione.

220	**Corvo imperiale**	***Corvus corax***	S B	Freq.	C	2020

- Possibili spostamenti della specie anche ad ampio raggio.
- Prevalentemente distribuita nella parte settentrionale della provincia.

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie risulta distribuita prevalentemente nella porzione settentrionale della provincia, anche se non esclusivamente nella parte montuosa del territorio. I siti riproduttivi individuati nel corso dell'indagine sono risultati ubicati sempre su pareti rocciose.

	PASSERIFORMES	*BOMBYCILLIDAE*

221	**Beccofrusone**	***Bombycilla garrulus***	M Wirr	Rara		

- Le osservazioni normalmente si riferiscono ad invasioni che la specie nel periodo invernale in alcuni anni compie verso il Sud Ovest dell'Europa.
- (Ornitho) 18/03/2009 6 indd. Besozzo (L. Prada), 20/02/2009 1 ind. Cremenaga (B. Sommerhalder), 13/01/2009 1 ind. Busto Arsizio (G. Papale), 21/02/2005 >10 indd. Varese (L. Colombo), 23/01/2005 >1 ind. Ternate e 15/01/2005 3 indd. Besozzo (L. Giussani).
- (EBN/an2005) 7/04/2005 50 indd. Castelveccana (A. Boto), 12/03/2005 50 indd. Cremenaga (F. Saporetti).
- (EBN/IT) 28/04/2005 2 indd. Masnago Varese (L. Marocchi).
- (Martorelli, 1960) alla fine di dicembre 1903 segnalata una invasione "rapida e copiosa" attraverso le Prealpi, colli della Brianza, sul territorio svizzero di Lugano e in tutte le province lombarde. In Lombardia segnalate altre invasioni nel 1913-1914 e tra dicembre 1923 e gennaio 1924.

	PASSERIFORMES	*PARIDAE*

222	**Cincia mora**	***Periparus ater***	SM B W	Molto freq.	C	2019

- Numero massimo di presenze nel periodo primaverile e autunnale/invernale, quando agli individui residenti si aggiungono quelli svernanti e in migrazione.

223	**Cincia dal ciuffo**	***Lophophanes cristatus***	SM B W	Freq.	C	2020

- In particolare stazionaria nella parte centro-settentrionale della provincia e in espansione dal settore montano a quello collinare. Ai residenti si aggiungono individui svernanti e in migrazione.

224	**Cincia bigia**	***Poecile palustris***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Numero massimo di presenze nel periodo primaverile e autunnale/invernale, quando agli individui residenti si aggiungono quelli svernanti e in migrazione.

225	**Cincia alpestre**	***Poecile montanus***	S B	Poco freq.	F	2013

- Normalmente osservata nella parte settentrionale della provincia ad altitudini superiori agli 800 m.

●Note nidificazione:

- (Ornitho) 23/05/2013 e 1/07/2013 Sacro Monte di Varese, trasporto materiale e adulti con pulcini - prima nidificazione confermata a livello provinciale in questo secolo. (A. Vidolini).

226	**Cinciarella**	***Cyanistes caeruleus***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Numero massimo di presenze nel periodo primaverile e autunnale/invernale, quando agli individui residenti si aggiungono quelli svernanti e in migrazione.

227	**Cinciallegra**	***Parus major***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Numero massimo di presenze nel periodo primaverile e autunnale/invernale, quando agli individui residenti si aggiungono quelli svernanti e in migrazione.

	PASSERIFORMES	*REMIZIDAE*				
228	**Pendolino**	***Remiz pendulinus***	M W Bst	Poco freq.	A	1979

- Le maggiori presenze sono relative al periodo da ottobre a marzo.
●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Realini, 1982) anni 1978 e 1979, rinvenimento di un nido (R. Marta) fiume Ticino nei pressi della Caproni a Vizzola Ticino.
- (Bianchi et al., 1973) "scarsamente nidificante nella vegetazione di certe lanche impraticabili del Ticino presso Vizzola, in Palude Brabbia verso Inarzo e nel "Bouscasc" in Careggio, Valcuvia".

	PASSERIFORMES	*PANURIDAE*				
229	**Basettino**	***Panurus biarmicus***	A3 (2)	Molto rara		

- (A. Ravasi rif.) 21/06/2003 1 ind. Loc. Bruschera Angera.
- (Ornitho) Febbraio 2001 2 indd. m. e f. stagno Vanetti Palude Brabbia (L. Giussani).
- (W. Guenzani rif.) 1 ind. primavera 1986 Palude Brabbia zona Agricola Paludi.

	PASSERIFORMES	*ALAUDIDAE*				
230	**Tottavilla**	***Lullula arborea***	M Wirr	Rara		

- Poche osservazioni quasi esclusivamente relative ai mesi autunnali.
- Interessante numero di individui osservati: 3/02/2018 21 indd. Somma Lombardo (F. Casale/Ornitho).
- (Bianchi et al., 1973) definita specie regolare di passo ma non numerosa.

231	**Allodola**	***Alauda arvensis***	M W B S?	Poco freq.	D	2005

- Specie essenzialmente migratrice, non si esclude qualche individuo sedentario in particolare nella parte sud orientale della provincia.
●Note nidificazione:
- Dal 2010 solo dati di nidificazione probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 individuati due nuclei riproduttivi distinti: il primo all'estremo nord della provincia, il secondo concentrato nella parte sud-orientale in cui si trovano le sezioni con le maggiori classi di frequenza.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 viene segnalata come uniformemente distribuita nella parte centro-meridionale della provincia, localizzata nella parte settentrionale.
- (Brichetti, 1984) veniva segnalata nidificante nel 1984 nei confini della Palude Brabbia.
- (Casale, 2015) negli anni '70 e '80 del secolo scorso in alcuni ambienti agricoli di 1,95 Km² dell'alta pianura varesotta risultavano presenti 5-7 coppie nidificanti, dagli anni 2000 nello stesso ambiente le coppie nidificanti sono scese a zero (F. Casale).

232	**Cappellaccia**	***Galerida cristata***	M B	Rara	E	2005

- Pochissime le recenti osservazioni post 2009, tutte relative ad alcune zone nei territori comunali di Busto Arsizio e Lonate Pozzolo.
- (G. Papale rif.) 2/11/2007 - 28/03/2005 - 22/01/2005 - 29/11/2004 - 7/06/2004 - 2/04/2004 segnalati alcuni indd. (max 5) nei dintorni di Busto Arsizio.
- (Bianchi et al., 1973) definita di passo, insolitamente rara. "Durante il decennio 1950-60, nei territori di Cardano al Campo, osservammo e catturammo un solo individuo di cappellaccia. Infine il 1/05/1964 nella Baraggia Bustocca potemmo vedere una coppia su un arato".
- (Martorelli, 1960) definita rara in tutta la Lombardia.
●Note nidificazione:
- Dal 2010 nessun dato di nidificazione certa o probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza rara e segnalata unicamente all'interno del territorio comunale di Busto Arsizio.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) diffusa esclusivamente nella parte sud-orientale del territorio in aree fortemente antropizzate comprese entro i 250 metri di quota. Rinvenuta nei comuni di Busto Arsizio (loc. Borsano), Castellanza, Cislago ed Origgio.

233	**Allodola golagialla**	***Eremophila alpestris***	Ast1	Stor.		

- (Bianchi et al., 1973) 6/11/1960, unica segnalazione conosciuta 1 ind. f. catturata nei dintorni di Saronno (comunicaz. prof. E. Moltoni).

234	**Calandrella**	*Calandrella brachydactyla*	A5 (4)	Molto rara		

- (BirdAlertVA) 4/05/2019 1 ind. Brebbia (P. Casali).
- (Ornitho) 14/04/2019 1 ind. Brebbia (L. Nigro, L. Giussani), 27-28/04/2018 2 indd. Brebbia (J. Ferrario et al.), dal 30/04 al 6/05/2017 >2 indd. Brebbia (L. Giussani et al.).
- (Bianchi et al., 1973) 6/05/1965 5 indd. più altri gruppi nei campi arati osservati dagli autori nei dintorni della Malpensa. Viene anche segnalata un'altra osservazione relativa al 1965, ma sponda Novarese del Ticino (non considerata).

	PASSERIFORMES	*HIRUNDINIDAE*

235	**Topino**	*Riparia riparia*	M B	Poco freq.	E	2007

- Le osservazioni più frequenti sono relative al periodo primaverile con punte massime nei mesi di aprile e maggio.
- Interessante numero di individui osservati: 19/04/2020 > 250 indd. Ternate (L. Giussani/Ornitho).

●Note nidificazione:
- Dal 2010 nessun dato di nidificazione certa o probabile.
- (F. Casale rif.) 20/05/2007 circa 15 indd. e 7 nidi occupati fiume Ticino Somma Lombardo.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987: Porto della Torre - colonia nidificante in una cava vicino al Ticino.
- (Bianchi et al., 1973) segnalato nidificante in numerose cave del fiume Ticino.
- (Martorelli, 1960) segnalato comune sul fiume Ticino presso Sesto Calende.

236	**Rondine**	*Hirundo rustica*	M B	Molto freq.	C	2020

- I primi arrivi sono relativi al mese di marzo con punte massime ad aprile, la quasi totalità delle partenze in agosto e settembre. Le osservazioni di ottobre e successive sono quasi tutte riconducibili a individui in migrazione (rare segnalazioni anche nel mese di novembre).
- (Ornitho) 29/12/2011 1 ind. oss. e fotografato nei pressi di Somma Lombardo, probabilmente non in grado di affrontare la migrazione (M. Tomasi).

237	**Rondine montana**	*Ptyonoprogne rupestris*	SM B W	Freq.	C	2020

- Specie migratrice e sedentaria solo parzialmente in particolare nella parte settentrionale della provincia.

238	**Balestruccio**	*Delichon urbicum*	M B	Freq.	C	2020

- Mesi di presenza da marzo a ottobre, punte massime durante la migrazione primaverile.

●Note nidificazione:
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 viene individuato un areale distributivo che interessa gran parte del territorio, ma nel settore settentrionale la presenza della specie non va oltre l'abitato di Maccagno. Nidifica in prevalenza al di sotto dei 400 m., nell'indagine solo 2 segnalazioni sopra i 600 m. di altitudine.

239	**Rondine rossiccia**	*Cecropis daurica*	A9 (9)	Molto rara		

- (EBN/BL) 6/04/2019 1 ind. Bodio Lomnago Lago di Varese (P. e L. Casali).
- (Ornitho) 17/05/2019 1 ind. Luino (F. Saporetti), 25/04/2018 1 ind. Besnate (N. Larroux), 25/04/2017 1 ind. Rancio Valcuvia (M. Bergomi, A. Pentassuglia), 11/05/2016 1 ind. Germignaga (M. Viganò), 2-3/05/2015 1 ind. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti, L. Nigro).
- (Cucè 2010 et al.) anno 2010 1 ind. catturato nella St. Ornitologica Dogana Vizzola Ticino.
- (Ornitho) 9-11-12/09/2003 1 ind. Biandronno (L. Giussani).

	PASSERIFORMES	CETTIIDAE				
240	**Usignolo di fiume**	***Cettia cetti***	SM B W	Freq.	C	2018

- Sedentario nelle zone palustri e ripariali della provincia, i mesi primaverili con l'aggiunta degli individui in migrazione sono quelli di maggior presenza.
●Note nidificazione:
- (Gagliardi et al., 2007) ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza localizzata, distribuita quasi esclusivamente nella fascia centrale della provincia (Palude Brabbia, Lago di Varese, Lago di Comabbio). Discretamente diffusa anche nella palude Bruschera (Angera) Lago Maggiore.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) distribuito prevalentemente nella parte centrale del territorio provinciale, è specie legata sia alle vere e proprie zone umide, sia a microambienti igrofili ancora esistenti lungo fiumi e torrenti, fossati, fontanili e raccolte d'acqua artificiali.

	PASSERIFORMES	AEGITHALIDAE				
241	**Codibugnolo**	***Aegithalos caudatus***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- I mesi estivi il periodo di minor presenza della specie.

	PASSERIFORMES	PHYLLOSCOPIDAE				
242	**Luì grosso**	***Phylloscopus trochilus***	M	Freq.		

- Osservabile negli ambienti boschivi e umidi della provincia durante la migrazione primaverile e autunnale, con punte massime nei mesi di aprile e settembre.

243	**Luì piccolo**	***Phylloscopus collybita***	SM B W	Molto freq.	C	2015

- Specie sedentaria solo parzialmente negli ambienti boschivi ed ecotonali della provincia.
- Raramente segnalata la ssp tristis,dal 2012 presenti max 2 segnalazioni/anno.

244	**Luì bianco**	***Phylloscopus bonelli***	M B	Poco freq.	D	2005

- Principalmente osservato durante la migrazione primaverile nel periodo aprile-giugno.
●Note nidificazione:
- Dal 2010 solo dati di nidificazione probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza rara, presente nel settore centro-settentrionale della provincia in corrispondenza dei sistemi montuosi calcareo-dolomitici situati tra i Pizzoni di Laveno e il monte Orsa.

245	**Luì verde**	***Phylloscopus sibilatrix***	M B? Bst	Poco freq.	B	1986

- Principalmente osservato durante la migrazione primaverile nei mesi di aprile e maggio.
●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 3 tavolette IGM 1:25.000. Nel 1986 nidificazione certa in località Molino di Strona a 246 metri di altitudine.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene individuata come localizzata, con una diffusione sul territorio di coppie isolate e solo in determinati settori montani presenta nuclei con distribuzione più compatta. Nella ricerca riscontrati solo indizi di nidificazione probabile.
- (Realini, 1979) 24/06/1979: nido con uova, monte Sette Termini.

246	**Luì di Radde**	***Phylloscopus schwarzi***	A1 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) 13/10/2013 1 ind. Palude Brabbia, catturato e inanellato da Stefano Costa all'interno della Riserva Integrale - tutte le misure biometriche e la formula alare corrispondono. Corpo robusto, quasi da non sembrare neanche un luì. Tarso massiccio, messo un anello A anzichè il solito X, becco molto largo alla base, sottocoda giallo, timoniere "giovanili" (M. Baietto).

247	**Luì forestiero**	***Phylloscopus inornatus***	A7 (7)	Molto rara		

- (Ornitho) 14/12/2020 1 ind. Sabbie d'Oro Ispra (L. Giussani), 25/09/2018 1 ind. Vergiate (F. Casale), 7/11/2017 1 ind. Palude Brabbia (L. Favretto), 13/11/2015 1 ind. Golasecca (F. Casale), 25/10/2015 1 ind. Somma Lombardo (F. Casale), 6/10/2014 1 ind. inanellato Palude Brabbia (G. Soldato et al.).
- (EBN/an2007) 2/10/2007 1 ind. Palude Brabbia (M. Nicastro, R. Garavaglia et al./I.N.F.S.).

	PASSERIFORMES	*ACROCEPHALIDAE*

248	**Cannareccione**	***Acrocephalus arundinaceus***	M B	Freq.	C	2020

- Osservazioni principalmente da aprile a settembre, con punte a maggio e giugno.

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 individuate tre zone di presenza: quella con la classe di frequenza maggiore comprende Lago di Varese, di Comabbio e Palude Brabbia, le altre due Lago Maggiore nei comuni di Angera, Monvalle e Ispra.

249	**Forapaglie castagnolo**	***Acrocephalus melanopogon***	A4 (3)	Molto rara		

- (Ornitho) 16/11/2014 1 ind. Lonate Pozzolo (A. Nicoli, C. Dell'Acqua et al.), 3/01/2013 1 ind. Ternate (L. Laddaga, A. Martinoli).
- (F.Casale rif.) 4/03/2007 1 ind. loc. Bruschera Angera.
- (Faralli e Casale, 1995) 28/04/1995 1 ind. Palude Brabbia (A. Viganò).
- (Bianchi et al., 1973) definita specie non comune e difficile da osservarsi.

250	**Pagliarolo**	***Acrocephalus paludicola***	A1 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) 30/04/2016 1 ind. Germignaga (M. Viganò et al.).
- (Bianchi et al., 1973) specie citata ma senza prove certe sul territorio della provincia.

251	**Forapaglie comune**	***Acrocephalus schoenobaenus***	M	Poco freq.		

- Specie di non facile individuazione, la quasi totalità delle osservazioni si riferisce ai periodi aprile/maggio e agosto/ottobre.

252	**Cannaiola comune**	***Acrocephalus scirpaceus***	M B	Freq.	C	2020

- Osservazioni da aprile a ottobre, con punte a maggio, giugno e agosto.

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la maggiore frequenza è riscontrata negli estesi canneti del Lago di Varese, di Biandronno e in Palude Brabbia, frequenze intermedie nei canneti del Lago Maggiore in particolare nei pressi di Ranco e Angera.

253	**Cannaiola verdognola**	***Acrocephalus palustris***	M B	Poco freq.	C	2019

- Osservazioni da aprile a settembre, con punte a maggio e giugno. Meno frequente della cannaiola comune, spesso confusa con quest'ultima quando non presenti emissioni canore.

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 le maggiori classi di frequenza si riscontrano nelle zone umide del settore centrale: Palude Bruschera Lago Maggiore, Lago di Comabbio, Lago di Varese e di Biandronno, Palude Brabbia.

254	**Canapino comune**	***Hippolais polyglotta***	M B	Poco freq.	F	2010

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa ai mesi di maggio, giugno e luglio.

●Note nidificazione:

- (Ornitho) 20/06/2010 alcuni indd. Lonate Pozzolo, adulto che trasporta il cibo per i piccoli durante il suo periodo di nidificazione (A. Nicoli), prima nidificazione documentata a livello provinciale in questo secolo.

255	**Canapino maggiore**	***Hippolais icterina***	M	Rara		

- Le poche osservazioni si riferiscono ai mesi di aprile, maggio, agosto e settembre.
●Note nidificazione:
- (Bianchi et al., 1973) definito visitatore estivo nidificante raro. Due maschi in canto nei mesi di maggio 1969 e giugno 1967.
- La specie in questa lista non viene definita "nidificante storica" perché i dati reperiti non confermano con certezza l'avvenuta nidificazione in tempi passati.

	PASSERIFORMES	*LOCUSTELLIDAE*

256	**Forapaglie macchiettato**	***Locustella naevia***	M	Poco freq.		

- Specie di non facile individuazione, le osservazioni si riferiscono ad alcune zone umide in particolare Palude Brabbia e Vasche Arnetta Lonate Pozzolo, periodi aprile/maggio e agosto/ottobre.
- (Laddaga e Casale, 2014) regolare in Palude Brabbia, presenza rilevata quasi esclusivamente tramite l'inanellamento; 9 indd. nel 2007 (Vigorita et al., 2007), 15 indd. nel 2008 (Vigorita et al., 2008), 2 indd. nel 2009 (Vigorita et al., 2009) e 20 indd. nel 2012 (Gustin, 2013).
- (Calvi et al., 2011) nella stazione "Dogana" di Vizzola Ticino dal 2005 al 2009 catturati in totale 18 indd. nella sessione primaverile e 28 indd. in quella autunnale.
- (Boto et al., 2005) inanellati 3 indd. agosto 1991, 1 ind. aprile 1992, 2 indd. agosto 1992, 1 ind. il 12/09/1995.
- (Bianchi et al., 1973) definita specie molto rara nella nostra provincia.
- (Martorelli, 1960) un individuo catturato a Lisanza lago Maggiore il 26/09/1931 ceduto dal dr. Vandoni al Museo di Milano.

257	**Salciaiola**	***Locustella luscinioides***	M B	Rara	D	2005

- Le principali osservazioni sono relative al periodo marzo-giugno, in particolare Palude Brabbia.
●Note nidificazione:
- Dal 2010 solo dati di nidificazione probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza rara nella Palude Brabbia. Nel Lago di Biandronno risulta in calo con una sola coppia presente nel corso dell'indagine.
- (Saporetti, 1998) nel 1997/98 la salciaiola è presente con una densità di 5.5 e 4.4 coppie/10 ettari nel settore meridionale della Palude Brabbia.
- (Brichetti, 1984) Riserva Naturale Palude Brabbia 12-20 coppie censite nel 1984.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) Riserva Naturale Palude Brabbia 15-17 coppie censite nel periodo 1983-1987.
- (Brichetti e Fasola, 1990) nella Riserva Naturale Lago di Biandronno censite 5-10 coppie a metà anni '80.

	PASSERIFORMES	*CISTICOLIDAE*

258	**Beccamoschino**	***Cisticola juncidis***	M B	Rara	E	2003

- Segnalata in passato come sedentaria parziale, rara di passo e documentata come nidificante nel solo anno 2003, la specie è in Italia in lieve espansione di areale ma non sul territorio provinciale.
- (Ornitho) 8-9-10/10/2010 alcuni indd. Lonate Pozzolo (P. Bonazzi), 15/06/2001 1 ind. brughiera Malpensa Lonate Pozzolo (W. Guenzani, L. Giussani).
- (Bird Control Italy s.r.l., 2012) osservazioni nel maggio 2008 durante il monitoraggio effettuato da luglio 2007 a giugno 2008 all'Aeroporto di Malpensa.
- (G. Papale rif.) 15/10/2007 1 ind. Palude Brabbia.
- (Bianchi et al., 1973) definito molto raro di passo.
●Note nidificazione:
- Dal 2010 nessun dato di nidificazione certa o probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la prima e unica nidificazione è stata registrata nel corso del primo anno di indagine nella parte alta della provincia (sezione di Luino).

	PASSERIFORMES	*SYLVIIDAE*

259	**Capinera**	***Sylvia atricapilla***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Numero massimo di presenze nel periodo migratorio primaverile (superiore a quello autunnale), punte massime aprile e maggio.

260	**Beccafico**	*Sylvia borin*	M B	Poco freq.	F	2011

- Osservazioni nei mesi primaverili/estivi, punte massime agosto/settembre.
●Note nidificazione:
- (Ornitho) 10/07/2011 3 indd. Val Veddasca, adulto che trasporta il cibo per i piccoli durante il suo periodo di nidificazione, prima nidificazione confermata a livello provinciale post 2000 (F. Saporetti).
- (Bianchi et al., 1973) ritiene probabile che la specie nidifichi regolarmente in zone collinari-montane, viene segnalato qualche dato per la Valmarchirolo.

261	**Bigia padovana**	*Sylvia nisoria*	A1 (1)	Molto rara		

- (Ornitho) 9/10/2010 1 ind. Palude Brabbia (A. Boto).
- (Bianchi et al., 1973) definita rara di passo, forse anche nidificante. "I dati conosciuti si riferiscono alle catture effettuate nell'Uccellanda della Beverina (Besozzo), che inanellò per conto dell'osservatorio del Garda dal 1932 al 1939" (dati non reperiti).

262	**Bigiarella**	*Sylvia curruca*	M	Poco freq.		

- Osservazioni in particolare nei mesi di aprile, maggio, agosto e settembre.

263	**Bigia grossa occidentale**	*Sylvia hortensis*	A? (2)	Molto rara		

- (Casale, 2015) 5/06/2011 1 ind. in canto Somma Lombardo (F. Casale).
- (EBN/BL) 15/09/2005 1 ind. Germignaga (M. Viganò).
- (Bianchi et al., 1973) definita poco comune di passo. 24/8/1959 1 ind. Morosolo. In alcune uccellande della provincia 46 catture note in 7 anni, quasi tutti individui isolati.

264	**Sterpazzola**	*Sylvia communis*	M B	Poco freq.	C	2014

- Le principali osservazioni sono relative ai periodi aprile-maggio e agosto-settembre.
●Note nidificazione:
- (Gagliardi et al., 2007) ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza rara. Presente una piccola popolazione in progressivo decremento distribuita sul territorio provinciale in tre nuclei isolati tra loro (nucleo settentrionale montuoso insediato esclusivamente sul lato orografico destro della Val Veddasca, nucleo centrale sezioni prevalenti di Sumirago e Carnago, nucleo sud-occidentale in particolare brughiera a sud della Mapensa).
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983-1987 viene individuata una distribuzione provinciale frammentata derivante dalla relativa specializzazione nella scelta dell'habitat riproduttivo, presente sia nelle aree pianeggianti che in quelle collinari o montane dove risulta maggiormente diffusa. Si stimano oltre 100 coppie nitificanti.

265	**Magnanina comune**	*Sylvia undata*	A4 (4)	Molto rara		

- (BirdAlertVA-Ornitho) dal 13/12/2020 al 31/12/2020 1 ind. Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua, D. Dall'Osto et al.).
- (Ornitho) dal 13 al 22/01/2017 >1 ind. m. ad. Lonate Pozzolo (F. Bergo, F. Lorenzini et al.), 25/02/2016 1 ind. Lonate Pozzolo (G. Chiatante).
- (EBN/BL) 4/11/2007 1 ind. brughiera Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua).

266	**Sterpazzolina comune**	*Sylvia cantillans*	M B? Bst	Rara	B	1978

- Poche le segnalazioni note, solitamente indd. isolati osservati nel periodo primaverile.
- (A. Boto rif.) 7/04/2006 1 ind. f. juv. catturata alla Stazione Inanellamento Palude Brabbia Ternate.
- (EBN/BL) 26/03/2006 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua).
- (M. Viganò rif.) 20/04/2005 1 ind. Germignaga.
●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (Realini, 1979) luglio 1978 Forcora (Veddasca). Viene segnalato l'osservazione di alcuni indd. juv che avevano lasciato il nido da una quindicina di giorni.

267	**Sterpazzolina di Moltoni**	***Sylvia subalpina***	A2 (2)	Molto rara		

- (Ornitho) 6/05/2020 1 ind. (foto e registrazione vocale) Cuveglio (M. Carabella), 27-28/04/2018 >1 ind. (osservazione e registrazione vocale) Lonate Pozzolo (P. Bonazzi).

268	**Occhiocotto**	***Sylvia melanocephala***	A3 (2)	Molto rara		

- (Ornitho) 27-28/03/2020 1 ind. f. Ternate (L. Giussani), 4/05/2018 1 ind. catturato nella Staz. Ornit. Dogana Vizzola Ticino (rif. P. Bonazzi).
- (Bianchi et al., 1973) definito accidentale, 15/11/1898 1 ind. f. ad. Varese (coll. Arrigoni degli Oddi) (cfr. Ornis, vol. IX, 1898, p. 212) (citazione prof. Moltoni 1959).

269	**Panuro di Webb**	***Sinosuthora webbiana***	S B Int	Freq.	C	2020

- Specie introdotta in seguito ad un rilascio di diverse decine di individui nei pressi del Lago di Varese nell'anno 1995, dal secondo decennio di questo secolo sta allargando il proprio areale.
- (Boto et al., 2009) anno 2009 si stima una consistenza provinciale di 3500-5000 individui.

●Note nidificazione:

- Ha iniziato a riprodursi in natura a partire dagli ultimi anni del secolo scorso.

	PASSERIFORMES	*REGULIDAE*

270	**Fiorrancino**	***Regulus ignicapilla***	SM B W	Freq.	C	2020

- Specie migratrice e sedentaria solo parzialmente in particolare nella parte centro-settentrionale della provincia, massimo numero di osservazioni nei mesi primaverili.

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene definita con distribuzione relativamente uniforme, con una maggior diffusione nel settore centro-settentrionale della provincia.
- (Casale, 2015) nel 2013 censite 7 coppie nel centro abitato di Somma lombardo, per una densità di 2,2 coppie/kmq (F. Casale).

271	**Regolo**	***Regulus regulus***	SM B W	Freq.	C	2017

- Il numero massimo delle osservazioni è relativo al periodo novembre-gennaio.

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza localizzata, distribuita uniformemente nel settore montuoso settentrionale e nella parte centro orientale della provincia, assente nel settore meridionale.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 risulta presente esclusivamente nella parte settentrionale della provincia, la stima è da 11 a 100 coppie presenti.

	PASSERIFORMES	*TROGLODYTIDAE*

272	**Scricciolo**	***Troglodytes troglodytes***	SM B W	Molto freq.	C	2017

- Numero massimo di presenze nel periodo autunnale-invernale.

	PASSERIFORMES	*SITTIDAE*

273	**Picchio muratore**	***Sitta europaea***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Specie forestale presente tutto l'anno e abbastanza uniformemente distribuita sul territorio provinciale.

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie risulta abbastanza uniformemente distribuita, in particolare nel settore centrale della provincia. Solo al di sopra dei 1000 metri di altitudine la presenza è decisamente rara.

	PASSERIFORMES	TICHODROMIDAE				
274	**Picchio muraiolo**	***Tichodroma muraria***	M W	Rara		

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al periodo novembre/febbraio, sempre in numero limitato di individui su alcune pareti rocciose della parte centro settentrionale della provincia.
- (Fornasari et al., 1992) da un'analisi delle tavolette IGM citate nei censimenti svernanti effettuati 1986/87-1990/91 risulta una osservazione nell'Alto Luinese e sul Monte S. Martino (M. Carabella).
- (Viganoni, 1977) 7/01/1977 1 ind. parete rocciosa Maccagno, 29/12/1973 1 ind. parete rocciosa Maccagno.

	PASSERIFORMES	CERTHIIDAE				
275	**Rampichino alpestre**	***Certhia familiaris***	SM B W	Poco freq.	C	2015

- Specie prevalentemente sedentaria, possibile presenza di qualche individuo in migrazione. Solitamente osservato nelle zone montuose della nostra provincia ad altitudini superiori ai 700 m., qualche individuo anche ad altezze inferiori.

276	**Rampichino comune**	***Certhia brachydactyla***	SM B W	Freq.	C	2018

- Specie prevalentemente sedentaria, erratismi verticali in particolare nella stagione invernale e possibile presenza di qualche individuo in migrazione. Negli habitat adatti risulta abbastanza uniformemente diffuso su tutto il territorio provinciale.

	PASSERIFORMES	STURNIDAE				
277	**Storno roseo**	***Pastor roseus***	A10 (6)	Molto rara		

- (Ornitho) 3/06/2020 1 ind. in transito Brebbia (L. Giussani), 29/05/2020 > 1 ind. in transito Brebbia (L. Giussani), 28-29/05/2020 sino a 11 indd. Luino (M. Viganò, M. Bergomi et al.), 28/05/2020 > 11 indd. Cislago (N. Larroux), 28/05/2020 1 ind. Rancio Valcuvia (M. Bergomi), dal 30/05 al 2/06/2018 sino a 3 indd. oss. a Luino nella stessa località (F. Saporetti et al.).
- (Moltoni, 1969) maggio 1968 1 ind. preso vivo a Ispra, 22/12/1964 1 ind. f. catturato nei dintorni di Varese, 3/06/1945 gruppo di 15-16 indd. osservati nei pressi dell'abitato di Cellina lago Maggiore "tra questi 1 ind. m. ad. ucciso da D. Costantini e successivamente donato da G. Gallelli al Museo Civico di Milano".
- (Bianchi et al., 1973) definito accidentale, 1959 1 ind. catturato da Borri Rino in Val Marchirolo.

278	**Storno**	***Sturnus vulgaris***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Le maggiori presenze si riscontrano durante il periodo primaverile.

	PASSERIFORMES	TURDIDAE				
279	**Tordo dorato**	***Zoothera dauma***	Ast1	Stor.		

- (Bianchi et al., 1973) 26/10/1966 1 ind. catturato nella uccellanda dell'avv. Steno Baj a Cantello, poi donato al Museo di Storia Naturale di Milano.

280	**Merlo dal collare**	*Turdus torquatus*	M Bst	Rara	A	1978

- (Life Ticino Biosource/L. Giussani) Registrazione notturna: 17-18/10/2020 1 ind. Tornavento, 24-25/10/2020 1 ind. Tornavento.
- (Ornitho) 6 e 7/11/2017 2 indd. ssp torquatus Brebbia (L. Giussani et al.), 3/04/2016 >1 ind. Veddasca (L. Colombo, L. Giussani, L. Nigro), 26/05/2012 1 ind. Dumenza (M. Carabella, F. Pianezza), 10/04/2012 1 ind. Somma Lombardo (S. Daverio), 8-10/10/2010 1 ind. Malpensa Ferno (A. Vidolini).
- (Realini, 1978) 28/06/1978 nido con piccoli (Veddasca).
- (Bianchi et al., 1973) definito molto raro in pianura, dove compare talvolta nel tardo ottobre. Ott. 1961 1 ind. ucciso a Montegrino Valtravaglia, 18/10/31 1 ind. m. e 1 ind. f. Varesotto (note pers. prof. E. Moltoni).

●Note nidificazione:

- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Realini, 1978) 28/06/1978 rinvenimento nido con piccoli nei pressi della Forcora (Veddasca). Prima e unica nidificazione accertata.

281	**Merlo**	*Turdus merula*	SM B W	Molto freq.	C	2020

- La specie più osservata in provincia di Varese e con una distribuzione abbastanza omogenea su tutto il territorio provinciale.

282	**Cesena fosca**	*Turdus eunomus*	Ast2	Stor.		

- (Bianchi et al., 1973) due segnalazioni nei pressi della colonia S. Paolo di Marchirolo: fine dicembre 1937 5 indd., 30/12/1952 2 indd. (2 soggetti catturati).

283	**Cesena**	*Turdus pilaris*	M W	Poco freq.		

- Periodo di maggior presenza da novembre a marzo, con punte massime nei mesi di dicembre e gennaio.
- Specie tipicamente gregaria, si sposta in gruppi sia in pianura che in montagna. Si ciba volentieri di cachi lasciati sugli alberi.

284	**Tordo sassello**	*Turdus iliacus*	M W Bst	Poco freq.	A	1960

- Specie piuttosto gregaria, si sposta a gruppi sia in pianura che in montagna, marzo novembre e dicembre i mesi con il maggior numero di osservazioni.

●Note nidificazione:

- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Bianchi et al., 1973) vengono segnalati due casi: la prima nidificazione provinciale conosciuta risalente all'agosto del 1944 sul Monte Orsa (E. Conti e L. Olgiati) e giugno 1960 in località "Pianazzo Fontana Rossa" sul versante nord del Campo dei Fori (A. Barbieri).

285	**Tordo bottaccio**	*Turdus philomelus*	M W B S?	Freq.	C	2020

- Possibile qualche individuo sedentario nel settore collinare e montano della provincia, marzo aprile e ottobre i mesi con il maggior numero di osservazioni.

286	**Tordela**	*Turdus viscivorus*	M Wirr B S?	Poco freq.	C	2017

- Possibile qualche individuo sedentario nella parte settentrionale montana della provincia.

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza "rara", presente nel settore montano della provincia, alta Val Veddasca, Monte Sette Termini, rilievi della Valganna e marginalmente monte Colonna. In alta Val Veddasca alcune coppie occupano la fascia ecotonale formata dal limite superiore della faggeta con il pascolo montano.

	PASSERIFORMES	*MUSCICAPIDAE*				
287	**Pigliamosche**	*Muscicapa striata*	M B	Freq.	C	2020

- Osservazioni da aprile a ottobre con punte massime nei mesi di maggio e giugno.

288	**Pettirosso**	*Erithacus rubecula*	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Periodo di maggior presenza nei mesi autunnali e invernali.

289	**Pettazzurro**	*Luscinia svecica*	M	Rara		

- Osservazioni solitamente nel periodo di fine estate e inizio autunno, in particolare Palude Brabbia e nella vegetazione rivierasca del Lago Maggiore (Ispra, Brebbia, Monvalle).
- (Bianchi et al., 1973) definita specie scarsa ma costante. "Capita quasi ogni anno più facilmente in settembre che in primavera, nelle località palustri ricche di folta vegetazione, di salici e ontani".

290	**Usignolo maggiore**	*Luscinia luscinia*	A2 (1)	Molto rara		

- (Boto et al., 2005) 17/09/2004 1 ind. 1° anno di calendario (1cy) catturato alla Stazione di Inanellamento della Palude Brabbia (Ternate).
- (Fornasari, 2003) 1 ind. catturato nell'autunno 2000 nella Staz. Ornitologica Brughiera del Dosso Somma lombardo.

291	**Usignolo**	*Luscinia megarhynchos*	M B	Freq.	C	2011

- Numero massimo delle osservazioni mesi di aprile e maggio, scarsamente presente nella parte settentrionale della provincia. In declino a partire dall'ultimo decennio dello scorso secolo.
- (Bianchi et al., 1973) viene definito estivante, comunissimo e negli anno '70 in ulteriore espansione.

292	**Balia nera**	*Ficedula hypoleuca*	M	Freq.		

- Osservabile durante la migrazione nelle zone di pianura e collina costituite da boschi di latifoglie e giardini, più numerosa nella fase migratoria post-riproduttiva con punte massime nei di mesi di aprile, agosto e settembre.

293	**Balia dal collare**	*Ficedula albicollis*	A8 (8)	Molto rara		

- (Ornitho) 27/04/2019 1 ind. loc. Bruschera Angera (G. Olioso), 7/05/2017 1 ind. m. ad. Bruschera Angera (G.I.O.), 25-26-27/04/2017 3 indd. m. ad. + m. 2° anno + f. ad. Germignaga (M. Viganò et al.), 19/04/2016 2 indd. m. ad. + f. ad. Inarzo
(R. Hummel), 9/05/2013 1 ind. Ternate (L. Laddaga), 15/04/2012 1 ind. m. ad. Bodio Lomnago
(L. Prada).
- (EBN/BL) 28/09/2008 1 ind. Morosolo (P. e L. Casali).
- (Regione Lombardia, 2008) 22/04/2008, 1 ind. catturato nella Staz. Ornitologica Dogana Vizzola Ticino (E. Vallinotto, A. Magnani).
- (Bianchi et al., 1973) "nonostante le ricerche fatte presso le uccellande non venne mai trovata".

294	**Balia caucasica**	*Ficedula semitorquata*	A1 (1)	Molto rara		

- (Gustin, 2015) 23/08/2014 1 ind. inanellato Palude Brabbia.

295	**Pigliamosche pettirosso**	*Ficedula parva*	A4 (3)	Molto rara		

- (Ornitho) 21/03/2015 1 ind. Germignaga (F. Saporetti).
- (LIPU "ali" dic. 2014) 4-5/10/2014 1 ind. Palude Brabbia osservato durante l'edizione dell'Eurobirdwatch.
- (EBN/an2003) 15/11/2003 1 ind. m. Oasi LIPU Palude Brabbia (F. Boggiani).
- (Moltoni E., 1958) anno 1864 1 ind. catturato a Somma Lombardo entrato a far parte della collezione del Museo di Storia Naturale di Milano con il n° 2978.

296	**Codirosso spazzacamino**	*Phoenicurus ochruros*	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Primavera e autunno il periodo di maggior presenza della specie.

297	**Codirosso comune**	*Phoenicurus phoenicurus*	M B	Freq.	C	2020

- Osservazioni da fine marzo a inizio ottobre, con punte a aprile e maggio.

298	**Codirossone**	*Monticola saxatilis*	M B	Rara	F	2017

- (Ornitho/G.I.O.) 12 e 18/07/2020 > 2 indd. Veddasca (D. Zaro), nel periodo primaverile-estivo anni 2016 e 2017 alcune osservazioni nella parte centro-settentrionale della provincia (oss. vari), 10/05/2012 1 ind. Veddasca (A. Gagliardi), 16/04/2012 1 ind. Lonate Pozzolo (S. Daverio), 9-22-23/05/2010 1-2 indd. Veddasca (F. Saporetti, M. Tomasi).
- (S. Guzzetti rif.) anno 1984 nei pressi di Vararo: 21/04 1 ind. m. ad., 30/04 1 ind. m. ad. in canto.
- (Bianchi et al., 1973) definita specie comune, mai abbondante, stazionaria, nidificante, di passo ed estivante.

●Note nidificazione:

- (G.I.O.) Anno 2017 - prima conferma nidificazione certa post 1987: Alta Veddasca 11/06/2017 m. ad. con imbeccata (M. Viganò, A. Pentassuglia, M. Bergomi), 18/06/2017 m. ad. con imbeccata (L. Nigro), 22/07/2017 f. ad. imbecca un juv. già uscito dal nido (L. Giussani, R. Aletti).
- (S. Guzzetti rif.) 22/06/1986 osservato nei pressi di Vararo 1 ind. ad. con imbeccata.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 4 tavolette IGM 1:25.000 della parte settentrionale della provincia. Settore Val Veddasca, Pizzoni di Laveno, Campo dei Fiori e cave di Arcisate, Besano e Viggiù.
- (Bianchi et al., 1973) viene indicato come discretamente nidificante nella zona di S. Caterina del Sasso, sui Pizzoni di Laveno 3-4 coppie annualmente. Nidificava in passato al "Sasso Galletto", ai "Caldè", S.Antonio, Cuvignone, al "Battistone", a Vararo lungo le pareti rocciose, Monte Nudo, Monti di Montegrino, sui monti di Maccagno e della Val Veddasca, qualche coppia sui monti di Boarezzo, della Valganna e a nord del Campo dei Fiori. Progressivamente diminuito negli ultimi 20 anni, vengono stimate circa 10 coppie nidificanti in totale (generalmente effettua 2 covate).

299	**Passero solitario**	*Monticola solitarius*	M Wirr B S?	Rara	F	2017

- Alcune recenti osservazioni (post 2013) non escludono la possibile presenza di qualche individuo sedentario nella parte centro-settentrionale della provincia.
- (Ornitho) gen/feb e ott/dic 2020 4-5 segnalazioni in 3 diverse località (oss. vari), gen 2019 1 ind. Ternate (L. Giussani), gen/lug 2018 4 segnalazioni in 3 diverse località (oss. vari), apr/dic 2017 2-3 indd. alta provincia (oss. vari), apr/dic 2016 1-2 indd. parte centro-settentrionale della provincia (oss. vari), apr/giu 2015 2 indd. alta provincia (W. Guenzani et al.), mag/giug 2014 2 indd. alta provincia (M. Carabella, F. Pianezza et al.).
- (A.Viganò rif.) anno 1994 1 ind. Varese, torre Basilica San. Vittore.
- (Bianchi et al., 1973) definita specie sedentaria sparsa un po' ovunque nell'Alto Varesotto.

●Note nidificazione:

- (Ornitho) giugno 2017 nidificazione di una coppia in alta provincia (C. Parnell, R. Aletti), maggio 2014 nidificazione di una coppia in alta provincia (M. Carabella, F. Pianezza et al.), anni 2015 e 2016 solo dati di nidificazione probabile.
- (Realini, 1978) 24/06/1978, nido con piccoli Val Veddasca.
- (Bianchi et al., 1973) "Ne vediamo ogni anno una coppia su una parete a picco del S. Martino, due coppie in aprile-maggio al Sasso Galletto ed ai Parèe sotto il Monte della Croce verso Vararo, nidifica inoltre abbastanza spesso sulle pareti rocciose lungo la strada tra Maccagno e Pino, trovata la coppia perfino col nido nel muraglione di sostegno della ferrovia Laveno-Pino-Gottardo".

300	**Stiaccino**	*Saxicola rubetra*	M B	Poco freq.	E	2005

- Le principali osservazioni sono relative ai periodi aprile-maggio e agosto-settembre.

●Note nidificazione:

- Dal 2010 nessun dato di nidificazione certa o probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza "rara", con presenza localizzata in alcune aree montane settentrionali del territorio. I nuovi dati confermano un trend negativo, nelle poche aree dove risulta ancora presente sembra avere densità minori rispetto al passato.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983-1987 viene individuata una ditribuzione limitata a poche aree montane al di sopra dei 900 metri, si stima un numero di coppie probabilmente inferiore alla decina.

301	**Saltimpalo**	*Saxicola rubicola*	SM B W	Poco freq.	D	2005

- Specie essenzialmente migratrice, non si esclude qualche individuo sedentario in alcune zone centrali e meridionali della provincia, marzo e ottobre i mesi con il maggior numero di osservazioni.
●Note nidificazione:
- Dal 2010 solo dati di nidificazione probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie viene censita con classe di abbondanza localizzata, diffusione omogenea nei settori centrali e meridionali della provincia, livello di diffusione più alto nella sezione di Saronno. L'habitat di nidificazione è costituito principalmente dalla campagna rurale tradizionale (agroecosistemi, vegetazione erbacea e arbustiva).

302	**Culbianco**	*Oenanthe oenanthe*	M Bst	Poco freq.	A	1987

- Punte massime delle osservazioni mesi di aprile, maggio e settembre.
●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 rilevata un'unica nidificazione sul Monte Paglione (Val Veddasca), in prossimità del confine svizzero.
- (Realini, 1982) "Segnalato per la prima volta come nidificante nella nostra provincia da C. Croci, secondo il quale sul Forcora nidifica qualche coppia ogni anno".

303	**Monachella**	*Oenanthe hispanica*	A? (1) Bst	Molto rara	A	anni '60

- (Ornitho) 17/04/2016 1 ind. f. Ferno (S. Daverio).
- (Bianchi et al., 1973) definita di passo, poco abbondante e non uniformemete distribuita nel territorio della provincia. Più facile osservarla durante il passo primaverile, scarsa in autunno. Osservata dagli autori solo 2 volte a maggio (anno non precisato) nei pressi della Malpensa.
●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Bianchi et al., 1973) definita in diminuzione notevole come nidificante. Rare coppie nidificanti negli anfratti rocciosi della Valganna, del S. Martino, dei Pizzoni di Laveno e del Monte Nudo.

PASSERIFORMES	*CINCLIDAE*

304	**Merlo acquaiolo**	*Cinclus cinclus*	SM B W	Freq.	C	2019

- Presente in particolare nella parte settentrionale della provincia nei pressi di corsi d'acqua a media pendenza, limpidi, poco profondi e con greti rocciosi, le maggiori presenze sono relative al periodo autunnale/invernale.

PASSERIFORMES	*PASSERIDAE*

305	**Passera oltremontana**	*Passer domesticus*	S? M?	Rara		

- Poche le segnalazioni provinciali conosciute, alcune attribuite alla specie Passer domesticus sono molto probabilmente da considerare come ibridi domesticus x italiae. Di contro, qualche segnalazione di ibrido domesticus x italiae potrebbe invece essere riconducibile alla specie Passer domesticus.
Non si possono inoltre escludere fenomeni di erratismo o di inizio di espansione territoriale da parte di qualche individuo proveniente da popolazioni stanziali situate a Nord delle Alpi.
In attesa di ulteriori verifiche e approfondimenti viene riportata solo l'ultima segnalazione conosciuta: 10/10/2016 1 ind. m. Germignaga (A. Corso/ornitho).

306	**Passera d'Italia**	*Passer italiae*	S B	Molto freq.	C	2020

- Specie gregaria abbastanza uniformemente distribuita sul tutto il territorio della provincia, in declino generalizzato a livello provinciale ma anche a livello europeo.

307	**Passera mattugia**	*Passer montanus*	SM B W	Freq.	C	2020

- I periodi invernale e primaverile sono quelli di maggior presenza della specie.

308	**Passera lagia**	*Petronia petronia*	Ast1	Stor.		

- Sedentaria e nidificante sulle Alpi occidentali. Le poche osservazioni provinciali del secolo scorso si riferiscono probabilmente a fenomeni di erratismo.
- (Bianchi et al., 1973) definita rarissima di passo, 17/11/1963 2 indd. catturati nel roccolo Ranchet di Besnate - Gallarate. Presente anche segnalazione non meglio documentata di 2 indd. trovati a Busto Arsizio in un negozio di cacciagione nel novembre 1963 (non considerata).

309	**Fringuello alpino**	*Montifringilla nivalis*	A3 (2)	Molto rara		

- Specie sedentaria nidificante sulle Alpi e migratore irregolare. Le poche osservazioni provinciali si riferiscono probabilmente a migratori invernali o a fenomeni di erratismo.
- (Ornitho) 5/01/2018 1 ind. Ranco (L. Giussani, W. Guenzani), 28/12/2017 1 ind. Sasso Galletto Castelveccana (L. Giussani).
- (Bianchi et al., 1973) definito rarissimo, invernale. 12-13 gen. 1963 4 indd. osservati in loc. Bocchette del Cuvignone (m. 1000) (Martinoli). Altre segnalazioni non documentate anni: 1946, 1945.

	PASSERIFORMES	*ESTRILDIDAE*				
310	**Bengalino comune**	*Amandava amandava*	M? Int	Rara		

- Specie introdotta o fuggita alla cattività. Ultimamente alcuni individui si sono naturalizzati al di fuori dei confini provinciali, anche se non sembra in province limitrofe. L'unica segnalazione provinciale conosciuta è riconducibile quasi certamente ad un indiviuo aufugo.
- (Ornitho) 20/10/2002 1 ind. Palude Brabbia (L. Colombo).

	PASSERIFORMES	*PRUNELLIDAE*				
311	**Sordone**	*Prunella collaris*	M W Bst	Poco freq.	A	anni '60

- La quasi totalità delle osservazioni si riferisce al massiccio del Campo dei Fiori/Sacro Monte; pochissime segnalazioni in altre zone montane della provincia.
- Interessante numero di individui osservati: 5/01/2020 > 55 indd. Veddasca nei pressi del confine Svizzero tra il Paglione e il Sasso Corbaro (L. Giussani, N. Larroux, M. Viganò/Ornitho).
- (Bianchi et al., 1973) molto raro in pianura, sui nostri monti ad altitudini e località adatte non deve essere raro.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Bianchi et al., 1973) viene segnalato come nidificante sulle nostre prealpi.

312	**Passera scopaiola**	*Prunella modularis*	M W B? Bst	Freq.	B	1987

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa al periodo da ottobre a marzo, con punte massime nei mesi di dicembre e gennaio.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è risultata presente esclusivamente nella parte montana con una piccola popolazione e con indice frequenza basso. Nel periodo di ricerca solo dati di nidificazione probabile.
- (Brichetti e Fasola, 1990) ha nidificato nella regione alpina dal Varesotto alla provincia di Brescia (R. Lardelli).
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 3 tavolette IGM 1:25.000 nel settore montano della provincia.
- (Realini, 1988a) 12/07/1980 nido su abete rosso Monte Sette Termini, 24/06/1978 juv. che ha appena lasciato il nido Forcora.

	PASSERIFORMES	MOTACILLIDAE				
313	**Cutrettola**	***Motacilla flava***	M B	Freq.	F	2019

- Punte massime delle osservazioni mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.
●Note nidificazione:
- (A. Viganò rif.) 9/06/2019 osservato individuo adulto che imbeccava dei giovani nei pressi di Origgio, prima nidificazione confermata in questo secolo.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) molto scarsa come nidificante, l'unica nidificazione probabile si riferisce ad un maschio in canto su un letamaio con la presenza della femmina nelle vicinanze (coppia presente da aprile a giugno).
- (Bianchi et al., 1973) indicata come unica ssp nidificante la ssp cinerocapilla. Nei decenni scorsi era presente una colonia allo sbocco del canale Brabbia (ult. riscontro nidif. 9/07/1964 ad. con imbeccata), colonie ormai scomparse esistevano sul Lago Maggiore.

314	**Cutrettola testagialla orientale**	***Motacilla citreola***	A2 (2)	Molto rara		

- (Ornitho) 1-2/10/2013 1 ind. 1° anno di calendario (1cy) Ispra (L. Giussani et al.).
- (EBN/BL) 22/04/2008 1 ind. m. in abito riproduttivo loc. Vasconi Arnetta Lonate Pozzolo (A. Nicoli).

315	**Ballerina gialla**	***Motacilla cinerea***	SM B W	Freq.	C	2020

- Numero massimo di presenze nel periodo primaverile e autunnale/invernale, quando agli individui residenti si aggiungono quelli svernanti e in migrazione.

316	**Ballerina bianca**	***Motacilla alba***	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Numero massimo di presenze nel periodo primaverile e autunnale/invernale, quando agli individui residenti si aggiungono quelli svernanti e in migrazione.

317	**Calandro maggiore**	***Anthus richardi***	A3 (2)	Molto rara		

- (Ornitho) 17/12/2020 1 ind. inizialmente osservato a Ceriano Laghetto (MB) in una zona confinante con la provincia di Varese si sposta poi anche nel territorio provinciale nei dintorni di Saronno (VA) (W. Sassi), 14/10/2015 1 ind. Ternate (L. Giussani).
- (Monti, 1845) settembre 1843 un individuo preso a Travedona. Viene indicata alche una segnalazione senza data di una cattura avvenuta nelle brughiere di Varese (rif. Prof. Balsamo Crivelli).

318	**Calandro**	***Anthus campestris***	M B?	Rara	X	

- Mesi di maggior presenza aprile e maggio, sempre in numero limitato di individui.
- Interessante numero di individui osservati: 5/05/2020 > 9 indd. Brebbia (L. Giussani/Ornitho).
- Interessante presenza per il periodo: 1/11/2018 1 ind. Brebbia (L. Giussani/Ornitho).
- (Bianchi et al., 1973) "lo osservammo la prima volta il 22/04/1965 alla fattoria Caproni (Malpensa), si trattava di un gruppetto di 5 individui attivissimi sul terreno spoglio; da allora ci interessammo a questa specie e la incontrammo un po' ovunque fosse l'ambiente adatto".
●Note nidificazione:
- (Casale, 2015) nella ricerca 2010-2014 solo dati di nidificazione probabile, rinvenuta presenza di 1-2 coppie nel periodo riproduttivo negli ambienti di brughiera localizzati nel comune di Lonate Pozzolo.
- (Cambi in Brichetti e Fasola, 1990) in riferimento alla ricerca 1983-1987 è stata considerata nidificante "certa" nel testo della pubblicazione e nidificante "probabile" nella carta di distribuzione.
Da ulteriori verifiche è risultata corretta l'indicazione della nidificazione "probabile".
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983-1987 solo dati di nidificazione probabile sul Monte Paglione in località Alpe di Monterecchio.

319	**Pispola**	***Anthus pratensis***	M W	Freq.		

- Quasi sempre osservata in zone aperte di pianura (campi e prati), dove solitamente si sposta a piccoli gruppi, la quasi totalità delle osservazioni è relativa al periodo da ottobre a aprile.

320	**Prispolone**	***Anthus trivialis***	M B	Poco freq.	C	2020

- Osservazioni da aprile a ottobre con punte massime nei mesi di aprile e settembre.

321	**Pispola golarossa**	*Anthus cervinus*	M	Rara		

- Le poche osservazioni sono per buona parte relative ai mesi di aprile e maggio.

322	**Spioncello**	*Anthus spinoletta*	M W	Freq.		

- La gran parte delle osservazioni si riferisce a zone di pianura aperte; la specie si sposta solitamente a piccoli gruppi e predilige le aree circostanti le zone umide, nei mesi di dicembre e gennaio il numero massimo delle osservazioni.

	PASSERIFORMES	*FRINGILLIDAE*

323	**Fringuello**	*Fringilla coelebs*	SM B W	Molto freq.	C	2020

- Il numero più elevato di osservazioni è riscontrabile nel periodo invernale e durante la migrazione primaverile.

●Note nidificazione:

- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 viene individuato come l'uccello più comune nidificante in provincia.

324	**Peppola**	*Fringilla montifringilla*	M W	Freq.		

- Specie normalmente presente nel periodo invernale, di solito a quote inferiori ai 500 m. in gruppi costituiti anche da diverse decine di individui.
- Interessante numero di individui osservati: 14/01/2020 circa 1500 indd. Brebbia (L. Giussani /Ornitho).

325	**Frosone**	*Coccothraustes coccothraustes*	M W B	Freq.	C	2019

- Osservazioni nel periodo invernale e durante la migrazione primaverile e autunnale, scarse nel periodo estivo.
- Interessante numero di individui osservati: 12/04/2018 oltre 65 indd. nei pressi di Daverio (C. Parnell/Ornitho).

●Note nidificazione:

- (Casale, 2015) nel periodo 2010-2014 in riferimento alla ricerca nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, rilevata la presenza in periodo riproduttivo nei comuni di Sesto Calende, Lonate Pozzolo e Besnate.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 è stata censita una piccola popolazione nelle sezioni di Lavena Ponte Tresa, con un dato di nidificazione certa, e Valganna.
- (Bianchi et al., 1973) viene segnalata la nidificazione di qualche coppia, anche in alcune zone di pianura: Busto Arsizio 1958 e 1962, Varese nel 1960 nel parco dei giardini pubblici.

326	**Ciuffolotto**	*Pyrrhula pyrrhula*	M W B? Bst	Poco freq.	B	1987

- Specie essenzialmente migratrice, non si esclude qualche individuo sedentario in particolare nella parte centro-settentrionale della provincia, sempre in numero limitato di individui e quasi esclusivamente nel periodo di fine autunno e inverno.
- (Ornitho) ssp nominale pyrrhula: da gennaio a marzo 2020 > 7 segnalazioni, dicembre 2019 4 segnalazioni, gennaio 2018 un paio di segnalazioni, dalla fine di novembre a tutto dicembre 2017 una decina di segnalazioni (oss. vari).

●Note nidificazione:

- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 3 tavolette IGM 1:25.000 nella parte settentrionale della provincia.
- (Bianchi et al., 1973) definisce la specie come regolarmente nidificante sui rilievi prealpini ad altezze comprese tra i 600 e gli 800 m. di quota, sempre in ambiente di conifere.

327	**Ciuffolotto scarlatto**	*Carpodacus erythrinus*	A1 (1)	Molto rara		

- (Gustin, 2015) 22/08/2014 1 ind. inanellato Palude Brabbia.

328	**Verdone**	*Chloris chloris*	SM B W	Freq.	C	2020

- Specie in particolare migratrice, le maggiori presenze si riscontrano nei mesi invernali e di inizio primavera. In forte declino dagli ultimi anni dello scorso secolo e in progressivo inurbamento.
- Interessante numero di individui osservati: 9/02/2020 presenti da alcuni giorni > 340 indd. Luino (M. Vaghi/Ornitho).

329	**Fanello**	*Linaria cannabina*	M W B? Bst	Poco freq.	B	1978

- Osservazioni nel periodo invernale e durante la migrazione primaverile e autunnale, quasi totalmente assenti nel periodo estivo.
●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (Ornitho) primo dato di nidificazione probabile post 2000: coppia presente nel suo habitat e nel suo periodo di nidificazione, 27/04/2019 2 indd. m. f. Arsago Seprio (G. Soldato).
- (Realini, 1978) 19/06/1978 nido con piccoli in Forcora (Veddasca). Sempre in Forcora nel 1978 stimate 3 coppie nidificanti.

330	**Organetto**	*Acanthis flammea*	M Wirr Bst	Rara	A	1978

- La nomenclatura adottata è quella attribuita in (Brichetti e Fracasso, 2015) dove le due ssp (flammea e cabaret) non risultano separate.
Gli individui osservati in provincia provengono dall'area alpina dove la ssp cabaret è sedentaria e nidificante, oppure individui in spostamento migratorio.
- (Ornitho) dove non indicato le segnalazioni si riferiscono alla ssp cabaret:
4/01/2020 1 ind. Monte Colonna Porto Valtravaglia (M. Viganò), anno 2018 5 segnalazioni gennaio-aprile in 5 diverse località della provincia (oss. vari), 19/12/2017 1 ind. Cadrezzate (L. Giussani), 26/11/2013 2 indd. Varese (S. Baratelli), 2/02/2003 1 ind. Ternate
(L. Giussani).
- (Ornitho) 1/03/2009 1 ind. ssp flammea Brebbia (A. Boto).
- (Realini, 1978) anno 1978 alcune coppie segnalate in Forcora (Veddasca).
- (Bianchi et al., 1973) definisce la specie: di passo, molto rara la ssp nominale flammea e scarsa di passo e probabilmente invernale la ssp cabaret. Segnalazioni relative a diversi individui anni: 1965, 1946, 1945.
- (Giglioli, 1889, 1890) a Castellanza, Gallarate, nella mia uccellanda se ne presero 6 nel 1830, e 20 dal 7 al 9 novembre 1882 (Brambilla).
●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Realini, 1978) anno 1978 nido con piccoli di una settimana in Forcora (Veddasca), sempre nel 1978 in Forcora stimate 5 coppie nidificanti.

331	**Crociere**	*Loxia curvirostra*	M Wirr B? Bst S	Poco freq.	B	1987

- Specie essenzialmente migratrice, non si esclude la possibile localizzata presenza di qualche individuo sedentario.
●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 unica segnalazione di nidificazione certa a Montegrino Valtravaglia.
- (Bianchi et al., 1973) "la nidificazione avviene regolarmente su tutti i rilievi del Luinese".

332	**Crociere fasciato**	*Loxia leucoptera*	Ast2	Stor.		

- (Bianchi et al., 1973) definito di passo irregolare, molto raro. Il giorno 8 o 10 settembre 1963 4 indd. catturati presso il roccolo Ranchet di Besnate (Gallarate).
- (Martorelli, 1960) estate 1911 1 individuo maschio adulto catturato in un roccolo del Varesotto e donato da Emilio Ponti al Museo di Milano.

333	**Cardellino**	*Carduelis carduelis*	SM B W	Molto freq.	C	2020

- La stagione estiva risulta essere il periodo di minor presenza della specie nel territorio provinciale.

334	**Venturone alpino**	*Carduelis citrinella*	M W Bst	Rara	A	1978

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa alla parte montana della provincia, in particolare Veddasca.
- Interessante numero di individui osservati: 25/02/2012 >45 indd. Dumenza (F. Saporetti/Ornitho).
●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Realini, 1978) anno 1978 stimata mezza dozzina di coppie nidificanti in Forcora Val Veddasca
(C. Croci).

335	**Verzellino**	***Serinus serinus***	M Wirr B S?	Freq.	C	2020

- Le maggiori osservazioni sono relative al periodo primaverile, quando agli individui che si fermano a nidificare e a estivare si aggiungono quelli in migrazione. Non si esclude la presenza di qualche individuo sedentario.

336	**Lucherino**	***Spinus spinus***	M W Bst	Molto freq.	A	1978

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa ai mesi autunnali e invernali.
●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Realini, 1978) segnala qualche rara coppia nidificante sul Campo dei Fiori e in Forcora.
- (Bianchi et al., 1973) viene definito regolarmente nidificante ad una altitudine compresa tra i 500 e 900 metri (Val Meggia, Campo dei Fiori, Valmarchirolo, Val Veddasca).

PASSERIFORMES	*EMBERIZIDAE*

337	**Strillozzo**	***Emberiza calandra***	M B Wirr	Rara	F	2011

- Le poche osservazioni sono quasi tutte relative al periodo primaverile.
- Interessante segnalazione per il periodo (prima segnalazione documentata di presenza invernale): 11/12 e 24/12/2020 due osservazioni relative allo stesso individuo Cassano Valcuvia (M. Bergomi, M. Viganò/Ornitho).
●Note nidificazione:
- (Ornitho) 24/05/2011 segnalazione con cod. atlante di "nidificazione certa" relativa a 3 indd. di cui 2 juv. a Lonate Pozzolo (A. Vidolini).
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è risultata presente con una piccola popolazione localizzata nell'angolo Sud-Ovest della provincia e nelle residue brughiere di Lonate Pozzolo. Nel periodo di ricerca solo dati di nidificazione probabile.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 un solo dato di nidificazione probabile: anno 1987 1 ind. in canto per alcuni mesi nel territorio di Daverio/Casale Litta.
- (Bianchi et al., 1977) nidifica con regolarità nelle brughiere e nei coltivi pianeggianti, in particolare Malpensa e Baraggia di Busto Arsizio. Nella piana di Luino e della Valmarchirolo viene segnalato in forte diminuzione sia come nidificante che come migratore.

338	**Zigolo giallo**	***Emberiza citrinella***	M W B	Poco freq.	F	2018

- Specie in costante decremento già a partire dagli anni '60 del secolo scorso, sia come presenze durante il periodo migratorio/svernamento che come coppie nidificanti.
●Note nidificazione:
- Dal 2010 alcuni dati documentati di nidificazione certa.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 solo dati di nidificazione probabile, rispetto alla precedente indagine (1983/1987) la specie risulta scomparsa dalle brughiere parzialmente alberate del settore Sud-occidentale della provincia.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 nidificazione certa in 3 tavolette IGM 1:25.000. Due distinti areali riproduttivi, compresi a nord in Val Veddasca ed a sud nell'area di Gorla minore, Cislago, Gerenzano, e radure della pineta di Tradate.

339	**Zigolo golarossa**	***Emberiza leucocephalos***	A5 (5)	Molto rara		

- (Ornitho) 3/12/2020 1 ind. f. Azzio (M. Carabella, R. Pianezza), 23/11/2020 1 ind. f. Cassano Valcuvia (M. Bergomi), dal 27/01 al 12/02/2018 >2 indd. Tradate (J. Ferrario, M. Galuppi et al.), 4/02/2018 1 ind. Lonate Pozzolo (D. Dall'osto), dal 14/12/2004 al 19/12/2004 2-3 indd. Biandronno (L. Giussani).

340	**Zigolo muciatto**	***Emberiza cia***	SM B W	Freq.	C	2020

- Specie essenzialmente migratrice ed erratica nel periodo invernale quando si sposta ad altitudini più basse, sedentaria solo parzialmente in particolare nella zona montana della provincia.
Le maggiori presenze sono relative al periodo dello svernamento.

341	**Ortolano**	*Emberiza hortulana*	M Bst	Rara	A	1987

- La quasi totalità delle osservazioni è relativa ai periodi aprile/maggio e agosto/settembre.
- (Vigorita et al. 2009) 2009, 1 ind. catturato nella stazione di inanellamento Cascina Meschio Varese.
- (EBN/IT) 6/05/2006 3 indd. Germignaga (P. Casali et al.)
- (EBN/BL) 10/09/2005 1 ind. Germignaga (M. Viganò).
- (F. Casale rif.) 25/04/1980 1 ind. Somma Lombardo.
- (Bianchi et al., 1973) definito estivo, comune in un habitat ristretto.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nessun dato di nidificazione probabile o certa nel secolo attuale.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987 rilevata una popolazione nidificante di 12/18 coppie a Gorla minore, Cislago, Lonate Pozzolo.
- (Bianchi et al., 1973) segnalato come nidificante ma in diminuzione su molti monti del Varesotto.

342	**Zigolo nero**	*Emberiza cirlus*	M Wirr B	Rara	F	2019

- Specie scarsamente presente sia durante le fasi migratorie che lo svernamento, le principali osservazioni sono relative al periodo primaverile.
- (Bianchi et al., 1973) definito scarso di doppio passo e invernale.

●Note nidificazione:
- Primo dato documentato di nidificazione certa: 26/06/2019 coppia con 2 giovani, osservata imbeccata da parte degli adulti, Clivio (M. Tomasi rif./Ornitho).

343	**Zigolo minore**	*Emberiza pusilla*	A6 (4)	Molto rara		

- (Ornitho) 19/10/2018 1 ind. Ternate "registrazione notturna" (Trektellen/L. Giussani), 19/10/2018 1 ind. Luino (F. Saporetti).
- (Mellone & Sighele, 2006) 25/04/2005 1 ind. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua, A. Turri, EBN).
- (EBN/an2004) 15/02/2004 1 ind. Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua, A. Turri).
- (W. Guenzani rif.) primavera 2000, 1 ind. osservato loc. Schiranna Lago di Varese.
- (Casale, 2015) 9/04/2000 1 ind. Vizzola Ticino (F. Casale, C. Cavallaro)
- (Bianchi et al., 1973) definito molto scarso di passo autunnale. Più volte trovati presso uccellatori individui che si presume catturati in zona. Il Ghidini lo definisce di passo quasi regolare nella regione dei laghi (Avicula. XI, pag. 32, 111/112; RIO, 1912, 36).

344	**Zigolo capinero**	*Emberiza melanocephala*	A3 (3)	Molto rara		

- (Ornitho) 21/05/2020 1 ind. f. Brebbia (F. Aresi, L. Giussani), 16/05/2020 1 ind. m. Brebbia (L. Giussani et al.), 22/05/2011 1 ind. Lonate Pozzolo (S. Daverio).

345	**Migliarino di palude**	*Emberiza schoeniclus*	M W B? Bst	Freq.	B	1987

- Le principali osservazioni sono relative al periodo da ottobre a marzo, dalla seconda metà di aprile il numero diminuisce e sino a tutto il mese di settembre i pochi dati sono relativi a qualche individuo estivante e forse nidificante.

●Note nidificazione:
- Specie nidificante storica, nel secolo attuale solo qualche dato di nidificazione probabile.
- (Gagliardi et al., 2007) nella ricerca 2003/2005 la specie è stata censita con basse classi di frequenza nei laghi di Biandronno, di Varese, di Comabbio e nella Palude Brabbia. Solo in località Bruschera sul Lago Maggiore è stata riscontrata una frequenza maggiore. Nel periodo di ricerca solo dati di nidificazione probabile.
- (Guenzani e Saporetti, 1988) nella ricerca 1983/1987, una buona popolazione si riproduce in Palude Brabbia e coppie sparse occupano zone palustri minori, come la località Baraggia sul Bevera, la valle Bagnoli ed un' area a Mezzana superiore (Somma Lombardo).

	PASSERIFORMES	*CALCARIDAE*				
346	**Zigolo della Lapponia**	*Calcarius lapponicus*	A2 (2)	Molto rara		

- (A. Boto rif.) ottobre 2007 1 ind. e novembre 2003 1 ind., entrambi catturati nei pressi di Brebbia e rinvenuti presso una collezione privata.
- (Bianchi et al., 1973) anno 1903 una cattura sopra Lago Maggiore ma provincia di Novara (non considerato).

347	**Zigolo delle nevi**	*Plectrophenax nivalis*	A5 (4)	Molto rara		
- (Ornitho) 2/12/2017 1 ind. Monvallina Besozzo (L. Prada), 24/01/2015 1 ind. Lozza (S. Baratelli et al.), 20/11/2013 2 indd. Somma L. (S. Daverio), 16/12/2012 2 indd. Casorate S. (S. Daverio). - (Bianchi et al., 1973) definito rarissimo di passo e invernale. 2/12/1963 catturati 3 indd. presso Busto Arsizio (Castiglioni).						

ELENCO SPECIE ESCLUSE - (anche se alcune specie sono state in passato considerate da alcuni autori)

Aquila di mare	*Haliaeetus albicilla*
Citata da (Bianchi et al., 1973) ma senza prove certe.	
Berta maggiore	*Calonectris diomedea*
Citata da (Bianchi et al., 1973) ma senza prove certe.	
Calandra	*Melanocorypha calandra*
Citata da (Bianchi et al., 1973) ma senza prove certe.	
Fanello nordico	*Linaria flavirostris*
Citatata da (Bianchi et al., 1973) una cattura ma non certa.	
Gallina prataiola	*Tetrax tetrax*
Citate da (Bianchi et al., 1973) alcune catture Lago Maggiore ma piana di Magadino (Svizzera).	
Gambecchio frullino	*Limicola falcinellus*
Citata da (Bianchi et al., 1973) una sola cattura Lago Maggiore ma Arona (sponda piemontese).	
Lanario	*Falco biarmicus*
Citata da (Bianchi et al., 1973) una sola cattura Lago Maggiore piana di Magadino (Svizzera)	
Marzaiola americana	*Anas discors*
Specie Nordamericana appartenente alle cat. A D1 E3 di possibile provenienza selvatica, rilasciata o sfuggita alla cattività, rara o accidentale allo stato naturale (Baccetti et al., 2014). A livello nazionale solo 5 segnalazioni accettate (aggiornamento 2015). Non inserita pur appartendo "anche" a cat. A poiché gli unici dati provinciali sono relativi a individui di origine sicuramente non selvatica. - (Ornitho) 12/03/2018 1 ind. Gavirate (L. Favretto), 19 e 21/04/2017 1 ind. m. ad. facilmente avvicinabile Lago Varese e Palude Brabbia (G. Zanetti, A. Viganò et al.)	
Oca delle nevi	*Anser caerulescens*
(Ornitho) dal 10/01/2016 al 14/02/2016 1 ind. di sicura provenienza domestica con anello arancione AIFA0 386 16 osservato a Germignaga e Cazzago Brabbia (oss. vari).	
Oca Lombardella minore	*Anser erythropus*
Citata da (Bianchi et al., 1973) una unica osservazione Lago Maggiore ma Locarno (Svizzera).	
Parrocchetto monaco	*Myiopsitta monachus*
- (Ornitho) una sola segnalazione il 21/05/2020, quasi certamente aufugo. In attesa di ulteriori conferme al momento non considerato.	

Pellicano riccio	*Pelecanus crispus*	
- Tutti gli individui segnalati sono quasi certamente di origine aufuga, in tutti gli anni delle osservazioni ci sono stati episodi di fuga dalla cattività di alcuni individui nei pressi delle località sotto riportate (specie non considerata come accidentale provinciale). A livello nazionale solo 11 segnalazioni accettate (aggiornamento 2015). Non inserita pur appartendo "anche" a cat. A poiché gli unici dati provinciali sono relativi a individui di origine non selvatica. - (Ornitho) 14/08/2015 1 ind. Fiume Ticino Somma Lombardo (I. Gabasio), 2/08/2014 2 indd. Angera Lago Maggiore (L. Andena), da ottobre 2003 a febbraio 2005 1 ind. Lonate Pozzolo quasi certamente lo stesso individuo nei 3 anni (L. Giussani). - (Longoni et al., 2010) Gennaio 2010, 2 indd. Lago Maggiore tratto 5 tra Ispra e Sesto Calende (censimento IWC).		
Picchio tridattilo	*Picoides tridactylus*	
Citata una segnalazione da (Brichetti, 1988 - Garavaglia e Coll., 2000) ma non reperiti riscontri certi.		
Sterpazzola della Sardegna	*Sylvia conspicillata*	
Citata da (Bianchi et al., 1973) e (Brichetti, 1988 - Garavaglia e Coll., 2000) una osservazione relativa al 27/09/1945 Lago Maggiore ma Piana di Magadino Canton Ticino (Svizzera).		
Storno nero	*Sturnus unicolor*	
Citata da (Bianchi et al., 1973) e (Brichetti, 1988 - Garavaglia e Coll., 2000) una cattura di un ind. m. il 19/11/1933 Lago Maggiore ma Piana di Magadino Canton Ticino (Svizzera).		
Tordo golanera	*Turdus atrogularis*	
Citata da (Bianchi et al., 1973) un individuo conservato al Seminario di Gorla, provenienza probabile dintorni Seminario ma non certa.		
Zigolo boschereccio	*Emberiza rustica*	
Citata da (Bianchi et al., 1973) ma senza prove certe.		

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano tutte le persone citate nella LISTA o che in generale hanno contribuito con i loro dati, con particolare riferimento agli osservatori del portale ornitho.it, EBN Italia e EBN Birdin' Lombardia.

In modo particolare per la collaborazione fornita:

Marco Bergomi, Boto Alberto, Brambini Gabriele, Bressan Paola, Carabella Monica, Casale Fabio, Casali Paolo, Casola Daniela, Colaone Silvio, Colombo Lorenzo, Dall'Osto Davide, Danini Gianluca, Daverio Simona, Dell'Acqua Cesare, Di Francesco Monica, Gagliardi Alessandra, Giussani Enrico, Giussani Luca, Guenzani Walter, Gustin Marco, Laddaga Lorenzo, Lardelli Roberto, Larroux Nicola, Luoni Federica, Marocchi Laura, Martinoli Alessio, Monti Paolo, Papale Gabriele, Pianezza Federico, Piola Vittorio, Pisoni Mario, Ravasi Alvinio, Ravasio Barbara, Saporetti Fabio, Sassi Walter, Turri Antonello, Vidolini Andrea, Viganò Andrea, Viganò Michele, Zarbo Tonino, Zaro Davide.

BIBLIOGRAFIA

Aebischer A., 2008 – Dispersione dei giovani e mortalità del Gufo reale *Bubo bubo* in Svizzera. Ficedula n° 40.

Aletti R., 2019 – Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2018. Gruppo Insubrico di Ornitologia. https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/

Aletti R., Carabella M., (a cura di) 2015 – Check – list degli uccelli della provincia di Varese – Lista completa commentata e illustrata, Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

Aresi F., Guenzani W., 1992 - Prima nidificazione di Pellegrino, *Falco peregrinus*, in provincia di Varese. Riv. Ital. Orn. 62 (3-4): 179.

Arrigoni degli Oddi E. 1929 – Ornitologia Italiana. Milano, Hoepli.

Baccetti N., Fracasso G., Gotti C. 2014 – Lista CISO-COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie "di servizio" (cat. D, E, X). Avocetta 38: 1-21 (2014).

Balsamo-Crivelli G., 1844. Uccelli finora osservati in Lombardia. In Cattaneo C.: Notizie naturali e civili sulla Lombardia. Bernardoni, Milano: 355-385.

Bettoni E., 1865-1868 – Storia Naturale degli uccelli che nidificano in Lombardia Vol. I e II. Milano coi tipi del Pio Istituto del Patronato 1865-1868.

Bianchi E., 1962 - Note ed osservazioni sull'avifauna acquatica del lago di Varese. Rivista Italiana di Ornitologia, anno XXXII n. 4, Milano.

Bianchi E., 1963 – Considerazioni sulla nidificazione della Beccaccia in provincia di Varese. Riv. Ital. Orn. 33: 124-145

Bianchi E., Martire L., Bianchi A. 1973 - Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia) Estratto da Riv. Ital. Orn. Editrice Succ. Fusi, Pavia.

Belfanti C., 1935 – Passo di palmipedi e affini nel bacino del basso Verbano nell'annata 1933-34, estr. da Rivista Italiana di Ornitologia.

Bird Control Italy s.r.l. 2012 – Dipartimento di Biologia-Università di Pisa, apr. 2012. AEROPORTO DI MILANO MALPENSA - NUOVO "MASTER PLAN AEROPORTUALE" Procedura di V.I.A. – INTEGRAZIONI VOLONTARIE – APPROFONDIMENTI AMBIENTALI – ALLEGATO 4 – RICERCA NATURALISTICA AMBIENTALE (estratto per Master Plan Malpensa) – Aprile 2012.

Bordignon L. (red.), 2005 – La cicogna nera in Italia – Parco naturale del monte Fenera. Tipolitografia di Borgosesia s.a.s., Borgosesia (VC).

Boto A., Galimberti A., Bonser R., 2009 – The parrotbills in Lombardia, Italy. Birdig World 22: 471-474.

Boto A., Pianezza F., Scandolara C., 2005 - Quindici anni di inanellamento. Riserva Naturale Palude Brabbia - Bollettino della Stazione Ornitologica. Provincia di Varese Edizioni.

Brichetti P., 1984 - Riserve Naturali "Palude Brabbia" "Lago di Biandronno" "Lago di Ganna": situazione avifaunistica e proposte di gestione. Rel. tecn. non pubblicata. Provincia di Varese.

Brichetti P., 1987 – Atlante degli uccelli delle Alpi italiane. Ecologia, vita e distribuzione dell'avifauna del più importante sistema montuoso d' Europa. Editoriale Ramperto.

Brichetti P., Fasola M. (red.) 1990 - Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia 1983–1987. Editoriale Ramperto, Brescia.

Brichetti P., Fracasso G. 2015 - Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Rivista Italiana di Ornitologia – Research in Ornithology, 85 (1): 31-50, 2015.

Brichetti P., 1988 - Garavaglia R. & Coll., 2000 – Check list Lombardia (WWW.ebnitalia.it consultato il 3/12/2016).

Brichetti P., Cambi D. 1983 - L'Avifauna della Lombardia. "Natura Bresciana" Ann. Mus. Civ. St. Nat. – Brescia, pp. 235-242.

Brichetti P., Cambi D. 1982 - L'Avifauna della Lombardia. "Natura Bresciana" Ann. Mus. Civ. St. Nat. – Brescia, pp. 159-172.

Brichetti P., Cambi D. 1980 - L'Avifauna della Lombardia. "Natura Bresciana" Ann. Mus. Civ. St. Nat. – Brescia, pp. 211-234.

Calvi G., Buvoli L., Tonetti J., Bonazzi P., 2011. La migrazione degli uccelli nella Valle del Ticino. Dieci anni di inanellamento. Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Carabella M., Aletti R., Casola D., Colombo L., Parnell C., Pianezza F., Saporetti F., Viganò M., 2018. Storia naturale dei picchi in provincia di Varese. Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 3/2018, pp. 232.

Casale F., 2015. Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Parco Lombardo della Valle del Ticino e Fondazione Lombardia per l'Ambiente.

Casale F., Brambilla M., Falco R., Bogliani G., 2011. Atlante delle zone di Protezione speciale della Lombardia. Fondazione Lombarda per l'Ambiente e Regione Lombardia, Milano.

Casale F., Brambilla M., 2009. Averla piccola. Ecologia e conservazione. Fondazione Lombardia per l'Ambiente e Regione Lombardia, Milano.

Clarizio G., Martegani P., Maruzza D., Soldarini M., 1991 – Nidificazione della Moretta tabaccata *Aythya nyroca* nella Riserva Naturale Regionale Palude Brabbia (Varese). Riv. Ita. Orn. 61: 133-134.

Colombo L., Viganò A., Bressan P., Giusto A., 2019 – Contributo alla conoscenza della biologia riproduttiva del Biancone *Circaetus gallicus* in provincia di Varese. Picus 45 (88): 75 – 81, 2019.

Colombo L., M. Manica, L. Giussani, 2020 – Roost di Nibbio bruno (*Milvus migrans*) in Provincia di Varese: osservazioni preliminari (2019-2020), considerazioni e possibili sviluppi di indagine. Bollettino Ornitologico Lombardo online Vol. 2 n. 2-2020: 139-154. https://gazzettadelbol.blogspot.com

Cucè L., Tonetti J., Pirovano A. (a cura di), 2010 - Osservatori ornitologici 2010. Volume XXXIV. Regione Lombardia.

Faralli U., Casale F., 1995 – Oasi e Centri LIPU News Anno 2, n° 1. LIPU, Parma.

Fasola M., Brichetti P., 1984 - Proposte per una terminologia ornitologica. *Avocetta* 8: 119 - 125

Ferrari M., 1980. Avvistamento di poiana calzata, *Buteo buteo lagopus.* Rivista Italiana di Ornitologia, A. 50, N. 1 maggio 1980 Museo Civico di Storia Naturale - Milano.

Fornasari L., Bottoni L., Massa R., Fasola M., Brichetti P., Vigorita V. (a cura di), 1992. Atlante degli uccelli svernanti in Lombardia. Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano.

Fornasari L., 2003. La migrazione degli uccelli nella Valle del Ticino e l'impatto di Malpensa. Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Foschi U.F., B. Cignini, F. Bulgarini, M. Lipperi, M. Melletti, T. Pizzari, M. Visentin, 1996 – *Catalogo della collezione ornitologica "Arrigoni degli Oddi" del Museo Civico di Zoologia di Roma.* Ric. Biol. Selvaggina, 97: 1-311.

Fracasso G., Baccetti N., Serra L. (2009). La Lista CISO-COI degli uccelli italiani – parte prima: liste A, B e C. Avocetta, 33: 5-24.

Gagliardi A., Guenzani W., Preatoni D. G., Saporetti F., Tosi G. 2007 (a cura di). Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincia di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Provincia di Varese; Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona; Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese: 295 pp.

Giglioli H. E., 1889, 1890. Avifauna italica. Avifaune locali. Primo resoconto dei risultati dell'inchiesta ornitologica in Italia. Parte prima. Successori Le Monnier, Firenze.

Giglioli H. E., 1907. Avifauna italica. Nuovo elenco sistematico delle specie di uccelli stazionarie, di passaggio o di accidentale comparsa in Italia. Secondo resoconto dei risultati dell'inchiesta ornitologica in Italia. Firenze Stab. Tipografico S. Giuseppe.

Guenzani W. & Saporetti F. 1988. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Varese (Lombardia) 1983 - 1987. Edizioni LATIVA.

Guenzani W., Zarbo T., 2006 - I primi 20 anni di censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Varese (www.gruppoinsubrico.it; accesso al 12 ottobre 2011).

Gustin M., 2014. Rapporto finale sull'attività di inanellamento scientifico 2013 nella Riserva Naturale Palude Brabbia. Rel. Tecn. Non pubblicata, pp. 57.

Gustin M., 2015. Rapporto finale sull'attività di inanellamento scientifico 2014 nella Riserva Naturale Palude Brabbia. Rel. Tecn. Non pubblicata, pp. 63.

Laddaga L., Casale F., 2014 - Avifauna della Riserva Naturale Regionale e Oasi LIPU Palude Brabbia (Varese, Lombardia). Rivista piemontese di Storia Naturale, 35, 2014: 319-366.

LIPU "Ali" dic. 2014 – La rivista del socio LIPU, dicembre 2014, anno 49 n° 4. Graphicscalve S.p.A. Bergamo.

Longoni V., Vigorita V., Cucè L., Fasola M., 2007. Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2007. Regione Lombardia, Milano.

Longoni V., Vigorita V., Cucè L., Fasola M., 2008. Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2008. Regione Lombardia, Milano.

Longoni V., Vigorita V., Cucè L., Fasola M., 2009. Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2009. Regione Lombardia, Milano.

Longoni V., Vigorita V., Cucè L., Fasola M., 2010 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2010. Regione Lombardia, Milano.

Luoni F. e Scandolara C., 2008 - Monitoraggio di specie ornitiche sensibili ai cambiamenti ambientali nella Riserva Naturale Palude Brabbia nel corso dell'anno 2008 – Relazione tecnica non pubblicata.

Maroni V., Boto A., 1993 – Aironi in Palude Brabbia. LIPU, Sezioni Varesine. Relazione tecnica non pubblicata.

Martorelli G., 1960. Gli uccelli d' Italia (terza edizione riveduta ed aggiornata da E. Moltoni e C. Vandoni). Rizzoli, Milano.

Mastrorilli M., Bressan P., 2011. Il gufo di palude. Grafiche Cesina, Piacenza pp. 208.

Mellone U. & Sighele M., 2006. Resoconto Ornitologico Italiano – Anno 2005. Avocetta, 31: 81-86.

Moltoni E., 1949. Alcuni dati sul peso e sulla longevità degli uccelli rapaci italiani. Rivista Italiana di Ornitologia, anno XIX n. 3, Milano.

Moltoni E., 1952. Comparsa di Oubara asiatica – *Chlamydotis macqueeni* (Gray) – in Lombardia. Rivista Italiana di Ornitologia, anno XXII n. 1, Milano.

Moltoni E., 1958. Le catture del Pigliamosche pettirosso in Italia. R.I.O., anno 1928 n. 3-4. Pagg. 232 - 233.

Moltoni E., 1968. Notizie sull'Otarda – *Otis tarda*, (L.) – in Italia. Rivista Italiana di Ornitologia, anno XXXVIII n. 3, Milano.

Moltoni E., 1969. Lo Storno roseo - *Pastor roseus* (L.) - in Italia. Rivista Italiana di Ornitologia, anno XXXIX n. 2, Milano.

Monti M., 1845 – Ornitologia Comense - Catalogo e notizie compendiose degli uccelli di stazione e di passaggio nella città provincia e diocesi di Como e loro Comasca sinonimia. Ed. F.lli Ostinelli.

Parnell C., Parnell A. e Guenzani W., 1994. Prima nidificazione di Picchio nero, *Dryocopus martius*, in Provincia di Varese. Riv. Ital. Orn. 64: 80-81.

Provincia di Varese, 2012. Revisione/rielaborazione del Piano Faunistico-venatorio del territorio della Provincia di Varese. Assessorato alle politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica – Commercio, Varese.

Quaglia G., 1884 – Laghi e Torbiere del Circondario di Varese Provincia di Como. Cenni Cronologici con tavole idrografiche e di oggetti preistorici. Varese Tipografia Macchi e Brusa 1884.

Ravasi A., Guenzani W, 2014. Rivista Italiana di Ornitologia, DOI: 10.4081/rio.2014.229 - Prima nidificazione accertata di assiolo *Otus scops* in provincia di Varese.

Realini G., 1977 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Quaderno 1: uccelli delle zone umide. A cura del comitato Provinciale della Caccia di Varese.

Realini G., 1978 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Quaderno 2: uccelli della montagna. A cura dell'Amministrazione Provinciale di Varese.

Realini G., 1979 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Quaderno 3: uccelli della pianura e della collina. A cura dell'Amministrazione Provinciale di Varese.

Realini G., 1982 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Regione Lombardia - Settore Agricoltura, foreste, servizio caccia e pesca. Grafiche Alma Milano.

Realini G., 1984 - Gli uccelli nidificanti in Lombardia (zone umide). Edizioni Alma.

Realini G., 1988a - Gli uccelli nidificanti in Lombardia (monti). Edizioni Valli.

Realini G., 1988b - Gli uccelli nidificanti in Lombardia (monti) Volume II Le rilevazioni. Edizioni Valli.

Realini G., 1994 - Gli uccelli nidificanti in Lombardia (pianura e collina). Edizioni R.G.F.

Regione Lombardia Agricoltura, vol. XXXII - anno 2008, Osservatori ornitologici – Relazioni annuali sull'inanellamento a scopo scientifico per lo studio degli uccelli in regione Lombardia.

Regione Lombardia Agricoltura, vol. XXXII - anno 2009, Osservatori ornitologici - Relazioni annuali sull'inanellamento a scopo scientifico per lo studio degli uccelli in regione Lombardia.

Riva A., 1860 – Schizzo Ornitologico delle Province di Como e di Sondrio e del Canton Ticino. Lugano Tipografia Veladini e comp. 1860.

Rubolini D., Fasola M., Vigorita V. & Cucè L., 2003 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. International Waterbird Census. Resoconto 2003. Regione Lombardia, Milano.

Rubolini D., Vigorita V., Cucè L., Fasola M., 2004. Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. International Waterbird Census. Resoconto 2004. Regione Lombardia, Milano.

Rubolini D., Pellittieri Rosa D., Vigorita V., Cucè L., Fasola M., 2005. Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. International Waterbird Census. Resoconto 2005. Regione Lombardia, Milano.

Rubolini D., Longoni V., Vigorita V., Cucè L. & Fasola M. 2006 - Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. International Waterbird Census Resoconto 2006. Regione Lombardia, Milano.

Saporetti F., 1977a. Osservazioni ornitologiche alla foce della Tresa. Boll. Orn. Lombardo, 1:7-11.

Saporetti F., 1997b - Il monitoraggio dei passeriformi di canneto nella riserva naturale Regionale Palude Brabbia. Progetti Life Brabbia 1997/1998. Rel. Tec. non pubblicata.

Saporetti F., 1998 – Il valore ornitologico della R. N. R. Palude Brabbia in relazione all'avifauna nidificante. Relazione tecnica non pubblicata.

Saporetti F., 2001 – L'avifauna nidificante nelle zone umide della provincia di Varese: status delle specie e grado di conservazione dei biotopi. Boll. Soc. Tic. Sci. Nat. 89: 41-50.

Saporetti F. e Carabella M. (a cura di), 2012. Uccelli Acquatici Svernanti, 25 anni di dati in Provincia di Varese. Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 1/2012.

Saporetti F., Guenzani W., Pavan P., 1994. Densità, habitat e successo riproduttivo dei rapaci diurni nidificanti in un'area prealpina dell'Italia settentrionale. Riv. ital Orn. 63 (2): 145-173.

Soave G. & Rizzi D., 1997. Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco Alto Milanese (Lombardia) 1992-1995. Consorzio Parco Alto Milanese.

Svensson L., Mullarney K., Zetterstrom D. 2013. Guida degli uccelli D'Europa Nord Africa e Vicino Oriente, Ricca Editore.

Tosi G., Zilio A. (eds.), 2002. Conoscenza delle risorse ambientali della provincia di Varese – Progetto SIT-Fauna. Provincia di Varese, Settore politiche per l'agricoltura e Gestione Faunistica.

Viganoni G., 1977. Il picchio muraiolo (*Tichodroma muraria*) in provincia di Varese. Bollettino Ornitologico Lombardo 1: 13-15.

Viganò A., 1997. Nidificazione del Gabbiano reale, *Larus cachinnans*, sul Lago Maggiore (Lombardia). Riv. ital. Orn. 67 (2): 205-206.

Viganò A., 1995-1996-1997-1998-1999-2000b-2001 – Andamento per decadi dei contatti con l'avifauna della Riserva Naturale Regionale Palude Brabbia. Relazioni tecniche non pubblicate.

Viganò A., Schirru L., 1995. Nidificazione di rondone pallido, *Apus pallidus*, nella città di Varese. Riv.Ital. Orn., 65.

Vigorita V. e Reguzzoni P. (a cura di), 1987. Osservatori Ornitologici. Relazione annuale sull'inanellamento per lo studio delle migrazioni degli uccelli nella Regione Lombardia. Vol. XI. Regione Lombardia, Milano.

Vigorita V., Rubolini D., Cucè L., Fasola M., 2002. Censimento Annuale degli Uccelli acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2002. Regione Lombardia, Milano.

Vigorita V., Cucè L. e Tonetti J., 2007. Osservatori ornitologici – Volume XXXI. Regione Lombardia, Agricoltura.

Vigorita V., Cucè L. e Tonetti J., 2008. Osservatori ornitologici – Volume XXXII. Regione Lombardia, Agricoltura.

Vigorita V., Cucè L. e Tonetti J., 2009. Osservatori ornitologici – Volume XXXIII. Regione Lombardia, Agricoltura.

Zanetti P., 1978. Stercorario maggiore inanellato catturato sul lago di Varese. Estratto dalla Rivista Italiana di Ornitologia anno XLVIII, Serie II.

Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014.

ANNUARI E MAILING LIST EBN ITALIA

(EBN/an2003) - (oss. in lista) in Annuario 2003 (red. L. Ruggieri). Edizioni EBN Italia.

(EBN/an2004) - (oss. in lista) in Annuario 2004 (red. L. Ruggieri). Edizioni EBN Italia.

(EBN/an2005) - (oss. in lista) in Annuario 2005 (red. L. Ruggieri). Edizioni EBN Italia.

(EBN/an2006) - (oss. in lista) in Ruggieri L. & Sighele M. (red.), 2007: Annuario 2006. EBN Italia, Verona. pp. 48.

(EBN/an2007) - (oss. in lista) in Ruggieri L. & Sighele M. (red.), 2008: Annuario 2007. EBN Italia, Verona. pp. 48.

(EBN/an2008) - (oss. in lista) in Ruggieri L. & Nicoli A. (red.), 2009: Annuario 2008. EBN Italia, Verona. pp. 44.

(EBN/an2009) - (oss. in lista) in Annuario 2009 (red. A. Nicoli, E. Di Masso, G. La Grua). Quaderni di Birdwatching n° 3/2010.

(EBN/an2010) - (oss. in lista) in Annuario 2010 (red. A. Nicoli, E. Di Masso, G. La Grua). Quaderni di Birdwatching n° 6/2011.

(EBN/an2011) - (oss. in lista) in Annuario 2011 (red. A. Nicoli, E. Di Masso, G. La Grua). Quaderni di Birdwatching n° 9/2012.

(EBN/an2012) - (oss. in lista) in Annuario 2012 (red. A. Nicoli, E. Di Masso, G. La Grua). Quaderni di Birdwatching n° 12/2013.

(EBN/an2013) - (oss. in lista) in Annuario 2013 (red. A. Nicoli, E. Di Masso, G. La Grua). Quaderni di Birdwatching n° 15/2014.

(EBN/an2014) - (oss. in lista) in Annuario 2014 (red. A. Nicoli, E. Di Masso, G. La Grua). Quaderni di Birdwatching n° 18/2015.

(EBN/IT) Osservazione ricavata dalla mailing list dell'associazione EBN Italia, il Birdwatching Italiano

(EBN/BL) Osservazione ricavata dalla mailing list del nodo EBN Lombardia occidentale Birdin' Lombardia relativo all'associazione EBN Italia

ALTRE FONTI (Piattaforme, Ricerche e Progetti)

(Ornitho) Informazioni tratte da www.ornitho.it portale comune d'informazione di ornitologi e birdwatcher italiani e di molte associazioni ornitologiche nazionali e regionali (ultima consultazione 31/03/2021)

(IWC) EcoEto Laboratorio di Eco-Etologia Università di Pavia dip. Scienze della Terra e dell'Ambiente - Dati IWC Lombardia (censimenti invernali acquatici).
http://ecoeto.unipv.it/attivita/censimenti-acquatici

(Banca dati G.d.p.) Banca dati del Gufo di palude aggiornata al 31/12/2017 (Bressan P., Mastrorilli M.).

(G.I.O.) Gruppo Insubrico di Ornitologia - Ricerche e comunicazioni effettuate dai soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia.

(Trektellen/L. Giussani) Stazione monitoraggio "nocturnal flight calls" - Luca Giussani Ternate (VA) https://www.trektellen.nl/site/info/2210

(Migratori acquatici) Rivista trimestrale a cura dell'A.C.M.A. – Direttore responsabile: Gianfranco Realini

(BirdAlertVA) Gruppo whatsapp - Osservazione uccelli rari e poco frequenti in provincia di Varese – Amministratore: Luca Giussani.

(Life Ticino Biosource) Progetto Life Ticino Biosource © Parco Lombardo della Valle del Ticino – Luca Giussani (analisi).