Il Succiacapre nella regione insubrica

Fabio Saporetti* e Fabio Casale**

** Gruppo insubrico di ornitologia, c/o Museo di Storia Naturale dell'Insubria di Clivio e Induno Olona*

*** Fondazione Lombardia per l'Ambiente*



Poco distante dal Ticino, in una vallata sul massicco del Campo dei Fiori in Provincia di Varese, c'è una importante popolazione di Succiacapre con densità di quattro maschi in canto al km^2.

Tra gli approfondimenti di questo progetto è stato importante anche contestualizzare la popolazione ticinese di Succiacapre nel suo contesto biogeografico. La nostra popolazione infatti è interconnessa con le popolazioni limitrofe stanziate anche al di là dei nostri confini politici, e quindi importanti nell'ottica della conservazione dei succiacapre "ticinesi". Come per altri progetti di conservazione, ad esempio quello della Civetta, ci si è concentrati in particolare sull'Insubria, regione storicamente abitata dagli Insubri, un'antica popolazione di origine celtica. Al giorno d'oggi i confini di quest'area vengono fatti corrispondere grossomodo, oltre al Canton Ticino, anche ad alcune province del Nord Italia, in particolare le Province di Como, Lecco, Novara, Varese e Verbano-Cusio-Ossola.

Il Succiacapre in Provincia di Varese

Il Succiacapre in Lombardia ha una distribuzione diffusa ma discontinua, limitata ai siti riproduttivi idonei generalmente collocati tra i 250 e i 1000 m, arrivando al limite altimetrico superiore di 1300 m; alcune recenti segnalazioni, in provincia di Bergamo, indicano quote ancora superiori attorno ai 1700 m. Le zone a maggior diffusione sono costituite dagli ecotoni forestali dell'Oltrepò Pavese, dai versanti meridionali delle Prealpi, dalle residue brughiere dell'alta pianura lombarda, e dalle zone perifluviali adatte dei fiumi Adda, Ticino, Brembo, Serio e Po. La popolazione regionale è stimata tra 500 e 1500 coppie.

Nel corso degli ultimi anni il Gruppo Insubrico di Ornitologia ha condotto alcune indagini riguardanti questa specie: la prima, svolta nel




Fig. 5. Distribuzione del Succiacapre nell'area insubrica e zone limitrofe al di fuori del Ticino; i dati italiani delle province di Varese, Sondrio, Como, Lecco, Verbania, Novara, Biella, Vercelli, sono mostrati in quadrati verdi di 10x10 km di lato (fonte www.ornitho.it). In alcuni siti i succiacapre italiani distano meno di un km dal confine con il Ticino e sono quindi importanti anche per la conservazione della popolazione svizzera.



L'area sul massiccio del Campo dei Fiori si è originata in seguito a incendi degli anni '70. Un altro grande incendio dall'estensione di oltre 300 ha ha riguardato la stessa zona nell'inverno del 2019.

biennio 2001-2002, relativa alla distribuzione e abbondanza delle specie dei cosiddetti ambienti aperti focalizzata alle brughiere della Lombardia occidentale, e la seconda, nel 2010, concernente la presenza del Succiacapre nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ubicato nelle Province di Varese e Como. Altri dati sono stati raccolti nel periodo 2003-2005 in occasione dell'elaborazione del nuovo atlante provinciale degli uccelli nidificanti.

In Provincia di Varese il Succiacapre è concentrato prevalentemente nella parte sud-occidentale del territorio, nelle residue brughiere che circondano l'aeroporto di Malpensa e l'asta del Ticino; nelle aree collinari e pianeggianti a sud del Lago di Varese la presenza del Succiacapre ricalca quella della parte settentrionale della Provincia, con una distribuzione discontinua, limitata alla residue parcelle di habitat adatto disperse nell'estesa matrice forestale che caratterizza questo settore del territorio.

Nell'indagine del 2001-2002 era stato appurato come la popolazione di Succiacapre avesse ancora buone densità nell'area del Parco Lombardo della Valle del Ticino, sia lungo gli incolti erbacei, sia nei prati magri a lato del fiume e in misura maggiore nelle aree di brughiera ubicate nel comune di Lonate Pozzolo. Nei tre km^2 campione ubicati in quest'area erano state ottenute densità variabili tra 8 e 12 maschi in canto, valore maggiore rispetto alle altre zone lombarde indagate (Parco del Campo dei Fiori, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Parco della Brughiera Briantea e Parco delle Groane). L'habitat, costituito in prevalenza da vaste formazioni a *Calluna vulgaris* e *Molinia caerulea* con sparsa copertura arbustiva e arborea, rappresenta una situazione ottimale per la specie, sia per le dimensioni dell'ambiente che per le risorse trofiche, attorno ad una quota di 200 m. Nel Parco del Campo dei Fiori era stata rilevata un'area potenzialmente favorevole, ubicata a 800 m sul versante est del Monte Martica. L'area di brughiera originatasi in seguito al passaggio di incendi verificatisi negli anni '70 sulle pendici boscose, inframmezzata ad affioramenti rocciosi, ospitava anche in questo caso una discreta popolazione, con una densità di quattro maschi in canto per km^2. Attualmente questo settore montano è soggetto a progressivo rimboschimento e non sono previsti interventi diretti da parte del Parco, effettuati in altri settori per contrastare l'avanzata del bosco, dedicati alla conservazione dei prati magri, habitat altrettanto favorevole all'insediamento del Succiacapre. L'ultimo settore indagato nel biennio in Provincia di Varese (Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate) aveva rivelato densità medio-basse (massimo di tre maschi in canto per km^2), con solo alcune zone ormai corrispondenti alle esigenze ecologiche della specie, a causa della inarrestabile espansione della copertura forestale: alcune radure ubicate prevalentemente lungo la linea ad alta tensione a 380kV che attraversa in senso longitudinale il Parco. La presenza di questa servitù energetica, sottoposta a regolare contenimento della vegetazione arborea sottostante mediante taglio raso, si è rivelata un ambiente favorevole al mantenimento della popolazione del Succiacapre. In collaborazione con l'Università degli Studi dell'Insubria, l'Ente Parco ha intrapreso un progetto sperimentale su un'area di 17'000 m^2 per la riconversione a brughiera della vegetazione forestale. Nel 2009 è stata condotta un'analisi delle preferenze ambientali della specie, mentre nel 2010 il Gruppo Insubrico di Ornitologia, nell'ambito di uno studio sull'avifauna della Pineta Pedemontana di Appiano Gentile, sito di interesse comunitario, ha effettuato un censimento nelle zone rilevate



V. Di Michele

La Genziana mettimborsa *Gentiana pneumonanthe*, i cui semi germinano dopo il passaggio del fuoco, specie minacciata presente nel Campo dei Fiori. A questa specie è associata anche la presenza della rara farfalla *Maculinea alcon*.



F. Casale

Brughiera alberata a 800 m, nel settore meridionale del Parco Nazionale della Val Grande.

nel 2001-2002 per controllare la stabilità della popolazione. I risultati di entrambi gli studi, oltre a concordare sulla distribuzione territoriale della specie, legata ormai alle aree aperte esistenti al di sotto dell'elettrodotto, ha confermato la stabilità della piccola popolazione nidificante nel Parco.

Il limite altimetrico della specie in Provincia è stato trovato in Val Veddasca, con presenze localizzate nelle residue radure, caratterizzate da copertura erbacea intercalata a piccoli affioramenti rocciosi con rada copertura arborea costituita prevalentemente da betulle, tra i 1100 e i 1200 m dei monti Borgna e Cadrigna. È possibile che la specie sia insediata con coppie territoriali sparse anche nelle residue radure della parte montana centro-orientale, in corrispondenza di pareti rocciose o cave dismesse.

Il Succiacapre nel Parco Nazionale della Val Grande (Verbano Cusio Ossola, Piemonte)

Nel Parco Nazionale della Val Grande e nelle aree limitrofe il Succiacapre è nidificante dai 200 m del greto del fiume Toce a Vogogna ai 1290 m del Monte Bavarione. La sua presenza in periodo riproduttivo risulta numericamente più significativa nel settore meridionale dell'area protetta, lungo il versante esposto a sud compreso tra Vogogna e Mergozzo, in ambienti di brughiera alberata e di boschi radi di latifoglie. Specifiche attività di monitoraggio sono state condotte nel corso delle stagioni riproduttive 2009, 2013, 2014 e 2017 e hanno portato a censire 8-10 territori nel Parco e 5-7 nelle aree limitrofe. La densità più elevata è stata riscontrata a monte di Colloro, in ambiente di brughiera alberata, con un massimo di sei territori il 16 luglio 2009 e il 25 giugno 2014. Nel 2017 la specie non è stata rilevata nei siti Monte Carza, Monte Morissolino e



F. Casale (2)

Lande alpine a Ginestra dei carbonai e Brugo a 1300 m, nel settore orientale del Parco Nazionale della Val Grande.

Cresta della Ciresa, dove erano stati complessivamente censiti tre territori nel 2014. In base ai dati disponibili, nel 2009-2018 è stimabile che la popolazione nidificante di Succiacapre del Parco e aree limitrofe sia di 15-20 maschi territoriali, in apparente declino o scomparsa in aree sub-ottimali.



Il Succiacapre può nidificare anche nei greti dei fiumi di notevole ampiezza, come in questo caso nel fiume Toce, in Piemonte. Non sono conosciute nidificazioni in questo ambiente in Ticino.