PRIMA NIDIFICAZIONE DI VOLPOCA (*TADORNA TADORNA*) in LOMBARDIA: UN CASO ACCERTATO IN PROVINCIA DI VARESE

Roberto Aletti*[1], Fabio Saporetti[1], Giuseppe Taverna[2]

*roalet@gmail.com

[1]*Gruppo Insubrico di Ornitologia, c/o Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona, Via Manzoni 21050, Clivio (VA); www.gruppoinsubrico.com*
[2]*LIPU, fotografo naturalista www.juzaphoto.com/p/giuseppetaverna; gt49@libero.it*

Parole chiave: Lombardia, nidificazione, Varese, volpoca

Abstract

In 2022 two pairs of Common Shelduck nested successfully at the "Vasche di Lonate Pozzolo, Varese" representing the first proven case of breeding for the species in the Lombardy region. The artificial nesting habitat consists of large holding tanks which collect the water from the river Arno, on the boundary of the provinces of Varese and Milan.

La volpoca (*Tadorna tadorna*, Linnaeus, 1758), ordine Anseriformi e famiglia Anatidi, è specie monotipica a corologia eurocentroasiatica-mediterranea (Brichetti & Fracasso, 2003-2015). In Europa sono presenti due distinte popolazioni: la prima nell'Europa nord-occidentale, lungo le coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico, l'altra con distribuzione meridionale, interessa il Mediterraneo arrivando sino alla Turchia e all'Asia Minore (Spina & Volponi, 2008). A livello continentale la specie nell'ultimo decennio mostra un notevole ampliamento di areale legato alle acque interne, siano esse bacini naturali o artificiali, come mostra la carta distributiva del nuovo Atlante europeo degli uccelli nidificanti (Keller *et al.,* 2020), estendendo la stabile presenza associata prevalentemente alle acque costiere, e alle limitrofe zone umide, rilevata nel secolo precedente (Hagemeijer *et al*., 1997). Nella Lista Rossa europea è classificata nella categoria "LC – Least Concern o a Minor Preoccupazione", con una stima della popolazione di individui maturi compresa tra un minimo di 104.000 e un massimo di 154.000, con un trend definito stabile (BirdLife International, 2021). In Italia la volpoca è nidificante e svernante, con popolazioni sedentarie e migratrici (Brichetti & Fracasso, 2015a), ed è considerata vulnerabile (VU - Vulnerabile) secondo la Lista Rossa italiana (Gustin *et al.,* 2019). La popolazione nidificante nel periodo 2010-2016, con presenze in circa 45 siti di 9 regioni, era stimata in 440-500 coppie, ma questo numero risulta probabilmente sovrastimato considerando la presenza di un numero non definito di coppie non nidificanti (Brichetti & Fracasso, 2018). Le precedenti stime nazionali riferite alla nidificazione sono di 10-15 coppie nel 1983, 146-194 nel 1999 e di circa 300 nel periodo 2005-2007 (Brichetti & Fracasso, 2003-2015), con un trend, anche in questo caso, in crescita. L'attuale distribuzione (fonte: www.ornitho.it, accesso il 06_09_2022) vede la specie concentrata nelle zone umide costiere dell'alto Adriatico, con isolati casi di nidificazioni lungo le coste tirreniche, in Puglia e nelle due isole maggiori. In Italia nord-occidentale la specie, nell'ultimo decennio, ha nidificato con coppie isolate in Piemonte, sia allo stagno del Centro Cicogne di Racconigi tra il 2017 ed il 2021 (osservatori: Calcagno L., Citino G., Ferraioli F., Giacone E., Musso C.), sia in alcune aree del vercellese, nel 2017 (osservatori: Di Rienzo A., Pozzan D.), nel 2018 (osservatore: Della Toffola M.), nel 2020 (osservatore: Zanotto S.) e nel 2022 (osservatore: Di Rienzo A.; fonte: www.ornitho.it, accesso il 06_09_2022). Per quanto riguarda la regione Lombardia al dicembre 2021 non risultano dati di nidificazione certa o probabile, come confermato nell'ultimo aggiornamento della

check-list regionale (Aletti *et al*., 2022), in cui la specie viene definita migratrice e svernante regolare (non nidificante). In provincia di Varese la specie è considerata un migratore e svernante irregolare (Aletti, 2021), comunque poco frequente, con presenze concentrate per la quasi totalità in 2 siti: alle vasche di laminazione del torrente Arno, in comune di Lonate Pozzolo, e sul lago Maggiore sia nella ZPS "Canneti del lago Maggiore" che alla foce del fiume Tresa. Le vasche di laminazione di Lonate Pozzolo sono entrate in esercizio nel 2001: in precedenza il torrente Arno spagliava tra boschi e campi al confine tra le province di Varese e Milano, creando ampie zone di impaludamento caratterizzate da elevato carico organico e inquinante, prima della messa in funzione del depuratore di S. Antonino Ticino (Comune di Lonate Pozzolo, 2013). Quest'area, comunemente denominata "vasconi", con una superficie totale di circa 30 ha costituita da 3 vasche a dispersione controllata, nel 2019 è stata oggetto del progetto LIFE "Ticino Biosource" che ha portato alla posa all'interno di una delle vasche di 103 isole galleggianti (99 con vegetazione e 4 senza) realizzate con delle zattere artificiali. Con il monitoraggio svolto nel periodo 2017-2020, è stato possibile accertare la nidificazione di alcune specie di interesse conservazionistico, quali: moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), moriglione (*Aythya ferina*), moretta (*Aythya fuligula*) e cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*) (FLA 2019; Casale, 2021).

Ed è in questo ambiente che nel 2022 è stata documentata la prima nidificazione della volpoca in provincia e, di conseguenza, nel territorio regionale: il 20 maggio uno di noi (GT, **Figura 1**) osservava e documentava in una delle vasche la presenza della coppia nidificante seguita da 12 pulcini di pochi giorni. Il 28 giugno erano ancora presenti 11 pulcini della prima coppia, con una età di circa un mese, a cui si aggiungeva una nuova coppia accompagnata da 4 pulcini. A livello provinciale il numero delle osservazioni di questa specie è aumentato negli ultimi 10 anni, passando da una media annuale di 9 segnalazioni nel quinquennio 2012-2015 alle 22 del quinquennio 2016-2021, con il massimo delle osservazioni nei mesi di marzo-aprile (fonte: www.ornitho.it, accesso il 06_09_2022). L'ampliamento dell'areale a livello continentale, in particolare legato alle acque interne, l'aumentato numero delle segnalazioni anche su scala nazionale e gli interventi di conservazione e tutela delle specie acquatiche effettuati alle vasche di laminazione di Lonate Pozzolo lasciano ben sperare che altre nidificazioni di questa specie possano ripetersi in questo ambiente anche in futuro.



Figura 1 - Adulto accompagnato da 5 pulcini, vasche di laminazione del torrente Arno – 20 maggio 2022. © Giuseppe Taverna



Figura 2 - 11 dei 12 pulcini osservati il 23 maggio 2022. © Giuseppe Taverna




Figura 3 - Seconda coppia nidificante alle vasche di laminazione del torrente Arno – 28 giugno 2022. © Giuseppe Taverna

BIBLIOGRAFIA

ALETTI R., 2021. Lista degli uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2020. (Gruppo Insubrico di Ornitologia – Clivio VA) pp 77.

ALETTI R., BRICHETTI P., GARGIONI A., GRATTINI N., 2022. Check-list degli uccelli della Lombardia aggiornata al dicembre 2021. BOL Bollettino Ornitologico Lombardo *online* 4/1: 3-32.

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2021. European Red List of Birds. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2003-2013. Ornitologia Italiana. Voll. 1-8. Oasi Alberto Perdisa Editore, Bologna.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2015. Ornitologia Italiana. Vol. 9. Edizioni Belvedere, Latina.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2015a. - Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Riv. ital. Orn. – Research in Ornithology, 85 (1): 31-50.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2018. The Birds of Italy. Volume 1. Anatidae-Alcidae. Edizioni Belvedere, Latina (Italy), "*historia naturae*" (6).

CASALE F. (a cura di), 2021. Buone pratiche di gestione della biodiversità nel Parco del Ticino e in Europa. Parco Lombardo della Valle del Ticino e Fondazione Lombardia per l'Ambiente.

COMUNE DI LONATE POZZOLO (PROVINCIA DI VARESE). Aggiornamento maggio 2013. Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e secondo i criteri della D.G.R. n. IX/2616/11.

FLA – FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE, 2019. Life Ticino BIOSOURCE (LIFE15 NAT/IT/000989).
"ENHANCING BIODIVERSITY BY RESTORING SOURCE AREAS FOR PRIORITY AND OTHER SPECIES OF COMMUNITY INTEREST IN TICINO PARK"

GUSTIN M., NARDELLI R., BRICHETTI P., BATTISTONI A., RONDININI C., TEOFILI C. (compilatori). 2019. Lista Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia 2019. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma.

HAGEMAIJER E.J.M AND BLAIR M. J. (Editors). 1997. *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance.* T & A D Poyser, London.

KELLER V., HERRANDO S., VOŘIŠEK P., FRANCH M., KIPSON M., MILANESI P., MARTÍ D., ANTON M., KLVAŇOVÁ A., KALYAKIN M. V., BAUER H.-G. & FOPPEN R.P.B. (2020). European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

SPINA F. & VOLPONI S., 2008. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 1. Non Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia CSR-Roma. 800 pp.