NIDIFICAZIONE DELLA COLOMBELLA (*COLUMBA OENAS*) IN PROVINCIA DI VARESE

Walter Guenzani[1], Roberto Aletti[1], Luca Giussani[1]

[1]GIO, Gruppo Insubrico di Ornitologia, c/o Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona, Via Manzoni 21, 21050 Clivio (VA); gruppoinsubricoornitologia@gmail.com

Parole chiave: colombella, nidificazione, provincia di Varese

Abstract

In 2019, in an area included within Sesto Calende and Angera municipalities, the first nesting of the Stock Dove (*Columba oenas*) in this century was ascertained in the province of Varese. On June 15th, in addition to four adults, at least one young with a dark beak and no green reflections on the neck has been observed.

Nel 2019, in una zona compresa nei comuni di Sesto Calende e Angera, è stata accertata la prima nidificazione in questo secolo della colombella (*Columba oenas*) in provincia di Varese. Il 15 di marzo uno di noi (Giussani) rivela la presenza di un maschio in canto a cui, poco dopo, si avvicina un altro individuo, probabilmente una femmina. Le osservazioni di due individui continuano per tutto il mese di marzo e quello di aprile, sempre relative a due individui con comportamenti territoriali (volo nuziale, effusioni reciproche, canto). Il 9 maggio gli individui sono quattro (tutti adulti), con due maschi cantori in contemporanea e altri due silenziosi (probabilmente due femmine); anche durante questo mese si osservano le due coppie impegnate in comportamenti nuziali. Finalmente il 15 di giugno oltre ai quattro adulti osserviamo (Aletti, Guenzani) almeno un giovane dell'anno, riconosciuto grazie ad alcune caratteristiche tra cui il becco scuro e l'assenza di riflessi verdi del collo. L'area è inserita in un bosco maturo (**Foto 1**), di cui una parte ricade all'interno di una zona privata con alberi di alto fusto spesso avvolti da edera e alberi morti ancora in piedi, taluni dei quali con cavità più o meno grandi realizzate da diverse specie di Picidi. Le essenze botaniche principali sono: platano, pioppo bianco, pino strobo, salice bianco, robinia, varie specie di Prunus, tiglio e betulla. Il terreno è ricoperto da uno strato arbustivo, in molti punti molto compatto, per lo più costituito da rovi, ma anche da macchie di nocciolo.

In provincia di Varese le segnalazioni riguardanti la colombella sono in leggero aumento nell'ultimo decennio. È specie migratrice, svernate irregolare e nidificante, più frequentemente osservata (anche se abbastanza raramente e in numero limitato di individui) nei mesi primaverili nella parte centro meridionale della provincia (Aletti e Carabella 2015; Aletti 2020). I dati in bibliografia relativi alla nidificazione della colombella in provincia di Varese sono scarsi: una sola segnalazione di nidificazione certa negli anni '60 del secolo scorso relativa ad alcune coppie che nidificavano regolarmente nella zona di Cantello, in buchi di vecchi tronchi di castagno, portando a termine dalle due alle tre covate ad intervalli di circa 40 giorni (Riva in Realini 1982) e un dato di possibile nidificazione nell'agosto 1966 nei pressi della Malpensa (Bianchi *et al*. 1973). Nessuna segnalazione è riportata nei due Atlanti provinciali (Guenzani & Saporetti 1988; Gagliardi *et al*. 2007). Negli ultimi anni compare qualche dato di nidificazione probabile: alcune segnalazioni di presenza di qualche coppia nella parte meridionale della Provincia all'interno del Parco del fiume Ticino (Casale 2015) e di comportamento nuziale (parata con display aereo) nel 2017, sempre nella zona meridionale il



Foto 1: bosco disetaneo in cui è stata rinvenuta la colombella nidificante © Luca Giussani

1° giugno (Aletti *et al.* in Ornitho.it, accesso il 15/09/2020) e nella stessa zona il 15/5/2018 (Ferrario *et al.* in Ornitho.it, accesso il 15/09/2020). Ampliando la consultazione bibliografica a lavori di più ampio respiro territoriale le segnalazioni sono piuttosto generiche, riguardanti zone geografiche limitrofe alla provincia di Varese. Nell'Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia (Brichetti e Fasola 1990) vengono citate 4/5 segnalazioni di nidificazione nel pavese e nel lodigiano, nel libro sugli uccelli nidificanti in provincia di Novara (Bordignon 2004) si parla di 1-10 coppie nidificanti e anche nella più recente pubblicazione, sempre riguardante gli uccelli nel novarese, si stimano 20-30 coppie nidificanti (Casale *et al*. 2017).

Nell'Atlante degli uccelli nidificanti in Svizzera (Knaus *et al*. 2018) si citano alcune presenze in Canton Ticino ed infine, in Ornitologia Italiana (Brichetti e Fracasso 2006), gli autori citano una nidificazione generica nella Pianura Padana Occidentale. La zona dove è avvenuta la nidificazione riportata in questa nota è stata frequentata da alcuni di noi per diversi anni perché vi ha nidificato il picchio nero (Saporetti *et al.* 2016): la presenza della colombella in ambienti dove nidifica il picchio nero, con la possibilità dell'utilizzo delle sue cavità, viene testimoniata da parecchi autori (Bordignon 2004; Casale 2015; Hagemeijer *et al*. 1997; Knaus *et al.* 2018).

La crescita in questo ultimo decennio delle segnalazioni della colombella in provincia di Varese, il recente aumento delle coppie nidificanti in alcune province limitrofe e l'espansione delle aree occupate in pianura dal picchio nero, lasciano sperare in un possibile futuro aumento delle coppie nidificanti.



Foto 2: colombella al 15/03/2019 nella zona in cui è stata accertata la nidificazione © Luca Giussani

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia Milo Manica per la collaborazione.

BIBLIOGRAFIA

ALETTI R., CARABELLA M., (a cura di) 2015. Check – list degli uccelli della provincia di Varese – Lista completa commentata e illustrata, Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

ALETTI R., 2020. Lista degli uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2019. https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/

BIANCHI E., MARTIRE L., BIANCHI A., 1973. Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia). Estratto da Riv. Ital. Orn. Editrice Succ. Fusi, Pavia.

BORDIGNON L., 2004. Gli uccelli della Provincia di Novara. Provincia di Novara, Tipolitografia di Borgosesia, Borgosesia.

BRICHETTI P., FASOLA M., 1990. Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia 1983 – 1987. Editoriale Ramperto, Brescia.

BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2006. Ornitologia italiana. Vol. 3 – Stercorariidae-Caprimulgidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.

CASALE F., 2015. Atlante degli uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Parco Lombardo della Valle del Ticino e Fondazione Lombardia per l'Ambiente.

CASALE F., RIGAMONTI E., RICCI M., BERGAMASCHI L., CENNAMO R., GARANZINI A., MOSTINI L., RE A., TONINELLI V., FASOLA M., 2017. Gli uccelli della provincia di Novara (Piemonte, Italia): distribuzione, abbondanza e stato di conservazione. Rivista Italiana di Ornitologia – Research in Ornithology, 87 (1): 3-79, 2017. DOI: 10.4081/rio.2017.336.

GAGLIARDI A., GUENZANI W., PREATONI D.G., SAPORETTI F., TOSI G., 2007 (a cura di). Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincia di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Provincia di Varese; Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona; Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese: 295 pp.

GUENZANI W., SAPORETTI F., 1988. Atlante degli Uccelli Nidificanti in provincia di Varese (Lombardia) 1983-1987. Lega Italiana Protezione Uccelli, sezioni varesine. Edizioni Lativa.

HAGEMEIJER W., BLAIR M., 1997. The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & A D Poyser, London.

KNAUS P., ANTONIAZZA S., WECHSLER J., GUELAT M., KERY N., STREBEL & T. SATTLER 2018. Atlante degli uccelli nidificanti in Svizzera 2013-2016. Distribuzione ed evoluzione degli effettivi degli uccelli in Svizzera e nel Liechtenstein. Stazione ornitologica svizzera, Sempach. 648 pp.

REALINI G., 1982. Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Regione Lombardia – Settore Agricoltura, foreste, servizio caccia e pesca. Grafiche Alma Milano.

SAPORETTI F., COLAONE S., GUENZANI W., ZARBO T., 2016. Nest-site characteristics and breeding biology of the Black Woodpecker in north-western Lombardy. Riv. Ital. Orn. – Research in Ornithology, 96 (1): 39-48.