PRIMO TENTATIVO DI NIDIFICAZIONE DI NIBBIO REALE (*MILVUS MILVUS*) IN PROVINCIA DI VARESE

Monica Carabella[1], Federico Pianezza[2], Luciana D'Orazio[1], Fabio Saporetti[1], Marco Vaghi[1]

[1]*Gruppo Insubrico di Ornitologia, c/o Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona, Via Manzoni*

[2]*Comunità Montana Valli del Verbano*

[1]monica.carabella@edibios.com

Parole chiave: Nibbio reale, provincia di Varese, tentativo di nidificazione

Abstract

The main breeding area of Red Kite in Italy lies in the central and southern sector of the Country: in the northern part the species is rather commonly wintering and migrating; in this century only two breeding records are known for northern Italy, both in 2018 (Piedmont and Trentino Alto Adige Regions). Since 2016 the spring observations of the species in Lombardy Region starts to increase: in the nearby Switzerland the breeding population is growing and in 2022 was verified the very first nesting in Canton Ticino. In our study area, in April 2022, we have observed a territorial pair with courtship, coupling and branches transporting but, from the second half of April, the pair disappeared and we did not find any structure comparable with a nest. The temporary territory was located nearby to a loose colony of Black Kite and, apparently, have not been interested by anthropic disturbance.

Il nibbio reale è una specie attualmente in espansione nella parte centro-settentrionale dell'Europa, mostrando al contempo una riduzione inalcuni settori meridionali (Portogallo, Spagna, Sardegna e Sicilia), probabilmente in risposta al riscaldamento climatico in corso (Keller *et al*., 2020). Sebbene il grado di minaccia nella Lista Rossa Europea del 2015 fosse ancora NT (*Near Threathened* o Quasi Minacciato; BirdLife International, 2015), l'ultima edizione del documento lo classifica come LC (*Least Concern* o a Minore Preoccupazione) in virtù dell'osservato incremento della popolazione (BirdLife International, 2021).

UN AREALE IN ESPANSIONE

In Svizzera l'ampliamento dell'areale distributivo è in corso in modo continuo e regolare dai primi anni '90 (Schmid *et al*., 1998), unitamente all'aumento di densità delle coppie nidificanti (Knaus *et al.*, 2018); la tendenza nel corso del decennio 2012-2021 si conferma sempre positiva (Knaus *et al.,* 2022). È del 2022 la notizia dell'avvenuta nidificazione della specie anche in Canton Ticino (www.ficedula.ch/nibbio-reale, accesso il 25/07/2022), dopo alcuni anni di incremento delle osservazioni di individui svernanti ed estivanti.

In Italia il nibbio reale è presente come nidificante con areali disgiunti nella parte centro-meridionale della penisola e nelle due isole maggiori (Cauli e Genero, 2017), insieme a una popolazione presente nelle Marche e in Toscana

derivante da un programma di reintroduzione: in quest'ultima regione il ripopolamento, grazie al supporto di alcuni progetti LIFE condotti dal 2007 al 2014 (https://www.capovaccaio.it/cms/index.php/il-centro-rapaci-minacciati; accesso il 29/07/22), ha permesso di reintrodurre oltre 100 giovani esemplari provenienti dalla Corsica e dal Canton Friburgo, Svizzera (Ceccolini *et al.,* 2013).

Per l'Italia settentrionale sono note solo due nidificazioni: la prima in Pianura Padana, in provincia di Torino nel 2016, ha portato all'involo di due giovani (Marotto e Bergamo, 2018), e l'altra in Trentino Alto Adige (provincia di Bolzano) nel 2018 con l'involo di tre giovani (Comploi, 2019).

SITUAZIONE IN LOMBARDIA

In Lombardia, cumulando i dati per le 12 province, le segnalazioni inserite nel portale ornitho per gli ultimi 14 anni (periodo 2009-2022), considerando tutti i mesi dell'anno, mostrano una crescita costante, particolarmente accentuata dal 2016 al 2017 (fonte: www.ornitho.it; accesso il 15/02/23; **Figura 1**); i dati sono concentrati per lo più nelle province alpine e prealpine, ma anche nel Milanese, Lodigiano e Pavese.




Figura 1 – I punti rossi indicano il numero di dati lombardi per anno (periodo 2009 -2022) inseriti nel portale ornitho.it; sono stati cumulati i dati delle 12 province. I punti blu indicano il numero di dati relativi alla provincia di Varese. Ad entrambe le serie è sovraimposta la linea di smooth.

In provincia di Varese la specie è considerata nidificante certa storica, pur con qualche dubbio (Aletti, 2021), tra gli anni '60 e '70 del 1900 (Bianchi *et al.,* 1973; Realini, 1982); nel periodo 2009-2022 le osservazioni si riferiscono

prevalentemente alla migrazione primaverile, tra marzo e maggio (fonte: www.ornitho.it; accesso il 15/02/2023 mentre per la migrazione autunnale, tra settembre e ottobre, le segnalazioni sono più sporadiche. Non mancano però anche dati invernali.

PROVINCIA DI VARESE, NOVITÀ 2022

Nel 2022, in una ampia vallata prealpina del settore centro-settentrionale della provincia, le osservazioni di alcuni individui, iniziate dopo la metà del mese di marzo si sono fatte più frequenti a partire dai primi di aprile, fino a concretizzarsi con l'osservazione di una coppia con trasporto di materiale per il nido nella prima decade di aprile (**Figura 2**). A partire da quella settimana, quindi, gli autori si sono coordinati per compiere osservazioni prolungate (a distanza di sicurezza), cumulando 36 ore di controllo nelle varie fasce orarie della giornata (i dati sono stati inseriti come "protetti" su ornitho.it). Da uno di questi controlli, il 10 aprile 2022 dalle 9.37 alle 11.44, la nota su ornitho.it si riferisce all'osservazione di quattro individui e descrive: «Due in coppia che sta nidificando nelle fronde di abeti, in trasporto materiale, almeno 11 volte nel tempo del rilievo (stecchi, anche lunghi 60-80 cm) e paglia. Passaggio di materiale tra individui posati sull'abete. Altri due individui in transito, alti, prendono termica e si allontanano verso NE.». Il transito di altri individui nell'area denota che la migrazione primaverile era ancora in corso.



Figura 2 - Nibbio reale con trasporto di materiale per il nido il 09/04/22. © Marco Vaghi

Nella zona monitorata esiste una colonia lassa di nibbio bruno, con almeno quattro coppie nidificanti, con cui la coppia di reali ha avuto frequenti interazioni interspecifiche.

Nel periodo 8-11 aprile la coppia ha continuato a portare rami, anche di grosse dimensioni (**Figura 3**), in un Abete rosso (*Picea abies*) facente parte di una piccola macchia di una quindicina di piante di dimensioni medio-grandi in mezzo al bosco di latifoglie; il 16 aprile è stato osservato l'accoppiamento, avvenuto su una pianta secca entro 100 metri dall'Abete rosso in cui si focalizzava l'attività della coppia (**Figura 4**). La nidificazione su conifera è una caratteristica riscontrata di preferenza anche per le nidificazioni oltralpe di nibbio reale, specie che si riproduce più precocemente del nibbio bruno e che, costruendo il nido su piante sempreverdi, si trova in una situazione più protetta rispetto alla costruzione su latifoglie, che a quell'epoca non hanno ancora le foglie (www.ficedula.ch/nibbio-reale).

Nonostante il controllo prolungato e sistematico dell'area fino al 14/05/2022, non si è avuto più alcun segno di presenza dei due individui (ultima osservazione il 16/04). Infine, un successivo controllo ravvicinato del sito con la presunta ubicazione del nido (14/05/2022) non ha portato al rilievo di alcuna piattaforma, neanche abbozzata, un fatto che ci ha particolarmente sorpresi, visto il notevole apporto di materiale da costruzione di cui siamo stati testimoni.

Il sito oggetto della tentata nidificazione e l'area interessata dalla colonia di nibbio bruno rientrano all'interno di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC), il cui formulario standard non riporta la presenza del nibbio reale.

L'area è localizzata su un versante montano esposto a sud-est, con bosco di latifoglie meso-termofile, poco al di sopra dei 350 metri di quota, alle spalle di un piccolo centro abitato del fondovalle: quest'ultimo è caratterizzato da un'alternanza di parcelle forestali, prati, coltivi prevalentemente a mais, con rada urbanizzazione, che sono consueto terreno di caccia dei nibbi bruni locali; diversi nidi di questi ultimi – almeno quattro quelli accertati – si trovano entro circa 200 di metri dal sito della coppia di reali.

Interessante è anche riportare una serie di dati riguardanti il nibbio reale in provincia di Como, sempre relativi al 2022. Da comunicazione personale di William Coleman (documentata da diverse fotografie), risulta che il 15/05 un individuo è stato osservato e fotografato con del materiale per la costruzione del nido nel becco (paglia e altro materiale "morbido", non stecchi o rametti) a quota di fondovalle nell'area dell'Alto Lario, senza tuttavia ulteriori indizi sul sito di nidificazione. Dai dati caricati su ornitho.it risulta anche che, nella stessa zona, da maggio al 28 agosto è stato ripetutamente segnalato un individuo da diversi osservatori, e in una occasione sono stati osservati due individui insieme (10/05). Enrico Viganò (com. pers.) conferma che il nibbio reale è presenza costante in tutti mesi nell'area dell'Alto Lario.



Figura 3 - Nibbio reale con trasporto di materiale per il nido il 10/04/22. © Marco Vaghi



Figura 4 – La macchia di Abeti rossi in bosco misto in cui la coppia ha sostato e ha trasportato rami e paglia con assiduità, 08/04/22. © Monica Carabella

CONCLUSIONI: IPOTESI E PROSSIMI CONTROLLI

La popolazione nidificante europea è in espansione (Keller *et al.*, 2020), in particolare quella elvetica oltralpe è in ottima salute, con 2800-3500 coppie (Knaus *et al.*, 2018), e nel Canton Ticino, con cui la nostra provincia ha continuità territoriale, si cominciano a registrare nidificazioni recenti (www.ficedula.ch/nibbio-reale): ebbene, la vallata prealpina delle nostre osservazioni di tentata riproduzione si trova proprio al margine meridionale di questo areale in espansione. È quindi possibile che qualche individuo migratore – magari immaturi inesperti – possa tentare una nidificazione, che si conclude con un insuccesso.

Non sappiamo quali possano essere le cause che hanno portato all'abbandono del sito, che non era apparentemente soggetto a disturbo antropico. La riproduzione della specie avviene solitamente a partire dal terzo anno di calendario (Schwitter, 2020), ma è possibile anche al secondo anno di calendario in condizioni di ampia disponibilità trofica (Evans *et al.*, 2008).

Tra l'altro, anche nella stagione riproduttiva precedente (2021) le osservazioni della specie nell'area si erano prolungate ben fino al 25 giugno (nostri dati, ornitho.it), fatto insolito che ci aveva alquanto stupiti e messo in allerta. Tuttavia, non si erano rilevate altre attività che potessero far pensare a una nidificazione.

Infine, ci chiediamo se nella scelta di questo territorio inedito i due individui della coppia potrebbero essere stati incoraggiati dalla presenza di una popolazione stabile e abbondante di nibbio bruno.

Possiamo concludere che il controllo ancora più capillare e assiduo del nibbio reale nelle vallate prealpine e alpine – non solo in Lombardia – sarà importante per accertare eventuali nuove nidificazioni nel Nord Italia.

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo Enrico Viganò e William Coleman per le informazioni fornite.

BIBLIOGRAFIA

ALETTI R., 2021. Lista degli uccelli della Provincia di Varese aggiornata al 2020. Gruppo Insubrico di Ornitologia, Clivio (VA), 77 p. https://gruppoinsubrico.files.wordpress.com/2021/05/pdf-clva-2020-1.pdf

BIANCHI E., MARTIRE L., BIANCHI A., 1973. Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia). Estratto da Rivista Italiana di Ornitologia. Editrice Succ. Fusi, Pavia

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015. European Bird List of Birds. Luxembourg: Publications Office for Official Publications of the European Communities.

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2021. European Bird List of Birds. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

BIRDLIFE INTERNATIONAL (2022) Species factsheet: *Milvus milvus*. Downloaded from http://www.birdlife.org on 25/07/2022

CECCOLINI G., CENERINI A., BAINI M., FALCHI V., PASSALACQUA L. e VIGNALI S., 2013. Reintroduzione del Nibbio reale in Toscana Meridionale. In: Atti Secondo Convegno Italiano Rapaci Diurni e Notturni. Treviso, 12-13 ottobre 2012.

COMPLOI E., 2019. Greifvogelzugüber Südtirol 2018. AVK - Nachrichten. Mittelungen der ArbeitsgemeinSchaft für Vogelkunde und Vogelschutz - Südtirol, 72: 13 – 15.

EVANS I.M., CORDERO P.J., PARKIN T.D., 2008. Successful breeding at one year of age by Red Kite *Milvus milvus* in southern England. Ibis 140 (1): 53-57.

KELLER V., HERRANDO S., VOŘIŠEK P., FRANCH M., KIPSON M., MILANESI P., MARTÍ D., ANTON M., KLVAŇOVÁ A., KALYAKIN M. V., BAUER H.-G. e FOPPEN R.P.B. (2020). European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona

KNAUS P., ANTONIAZZA S., WECHSLER S., GUELAT J., KERY M., STREBEL N. eSATTLER T., 2018 – Swiss Breeding Bird Atlas 2013-2016. Distribution and population trends of birds in Switzerland and Liechtenstein. *Swiss Ornithological Institute*, Sempach, 648 p.

KNAUS P., SATTLER T., SCHMID H., STREBEL N. e VOLET B., 2022. Situazione dell'avifauna in Svizzera: rapporto 2022. Stazione Ornitologica Svizzera, Sempach.

MAROTTO P. & BERGAMO A., 2018. Accertata la nidificazione di Nibbio reale (*Milvus milvus*) nella Pianura Padana occidentale. Rivista Italiana di Ornitologia - Research in Ornithology, 88(2): 50-52.

MEZZAVILLA & SCARTON F. (a cura di). Associazione Faunisti Veneti, Quaderni Faunistici n.3: 312pp.

REALINI G., 1982. Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Regione Lombardia - Settore Agricoltura, foreste, servizio caccia e pesca. Grafiche Alma Milano.

SCHMID H., LUDER R., NAEF-DAENZER B., GRAF R. e ZBINDEN N., 1998. Schweizer Brutvogelatlas. Verbreitung der Brütvogel in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1993-1996. Schweizerische Vogelwarte. Sempach.

SCHWITTER P., 2020. Determinants of stopover sites of migrating Swiss Red Kites (*Milvus milvus*). Master Thesis, University of Zurich, Department of Geography.