




"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."

Chimica Organica Magistrale

Docente

Paolo Melchiorre

Appunti di lezione

Redattore:

Alessandro Suprani

alessandro.suprani@studio.unibo.it

Laurea Magistrale in Chimica Industriale

Anno Accademico 2024/2025

Indice

I	Teoria	1
1	Chimica Fisica Organica	1
1.1	Termodinamica	1
1.2	Cinetica	2
1.3	Distinzione tra Reazioni SN1 e SN2	3
1.4	Postulato di Hammond	3
1.5	Reaction Order and Rate Laws	6
1.6	Linear Free Energy Relationship (LFER)	7
1.6.1	Diagramma di Hammett	7
1.7	Isotopic Labelling	8
1.8	Crossover Experiments	8
1.9	Kinetic Isotope Effect (KIE)	9
1.10	Intrappolamento degli Intermedi	10
1.11	Stereochimica	10
2	Sintesi asimmetrica	10
2.1	Terminologia fondamentale	10
2.2	Chiralità senza centro stereogenico	11
2.3	Relazioni topiche	12
2.3.1	Relazioni tra i gruppi	12
2.3.2	Relazioni tra le facce	13
2.4	Prochiralità	14
3	Cicloaddizioni	16
3.1	Gli Attori della Reazione	16
3.2	Stereochimica	17
3.3	La Regola Endo	18
3.4	Descrizione degli Orbitali di Frontiera	19
3.5	Il Solvente	19
3.6	Regioselettività	19
3.7	Catalizzatori	19
3.8	Reazioni di Diels-Alder asimmetriche: ausiliari chirali	20
3.9	Modi suprafacciali e antarafacciali	20
II	NMR	24
1	Introduzione alla Spettroscopia a Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)	24
1.1	Spin Nucleare o Momento Angolare Quantizzato	24
2	Approccio Classico	25
2.1	Il Campo Magnetico	25
3	Regole di Selezione per l'NMR	25
3.1	Previsione del Momento Angolare Nucleare	25
3.2	Sensibilità dell'NMR	26
3.2.1	Tecniche NMR	26
3.3	Fattori Importanti nello Studio di uno Spettro NMR	27
3.3.1	Chemical Shift	27
3.3.2	Il range del chemical shift	29
3.3.3	Integrazione	30
3.3.4	Costanti di accoppiamento	31
3.4	Notazione di Pople	32
3.4.1	Sistema AX2	32
3.4.2	Sistema AX3	33
3.5	Regole di accoppiamento	34
3.6	Disaccoppiamento omonucleare	35
3.7	Sistemi aromatici	35

4	Spettri Carbonio 13	36
4.1	Distorsionless Enhancement by Polarization Transfer (DEPT)	37
4.2	Nuclear Overhauser Effect (NOE)	37
5	NMR 2D	39
5.1	CORrelation SpectroscopY (COSY)	39

Parte I

Teoria

1 Chimica Fisica Organica


Quando ci si avvicina ad una reazione è importante conoscerne i meccanismi. Nelle reazioni organiche sia fattori cinetici che termodinamici partecipano alla formazione dei prodotti e vanno quindi analizzati e studiati.

La **termodinamica** si occupa dei cambiamenti energetici in una reazione e stabilisce se una reazione è energeticamente favorevole o sfavorevole. Ci aiuta a comprendere la stabilità di reagenti, intermedi e prodotti analizzando fattori come l'entalpia (calore) e l'entropia (disordine).

La termodinamica fornisce informazioni sul **perché** una reazione avviene, indicando se una reazione avverrà spontaneamente in base alla variazione dell'energia libera (**energia libera di Gibbs**).

La **cinetica** si concentra sulla velocità della reazione, compresi i meccanismi di reazione e gli intermedi coinvolti. Ci aiuta a comprendere come le reazioni procedono, l'ordine dei passaggi e l'influenza di fattori come la concentrazione dei reagenti e la temperatura sulla velocità di reazione.

La cinetica fornisce informazioni sul **come** una reazione avviene, aiutandoci a capire il percorso della reazione.



1.1 Termodinamica

Per comprendere la termodinamica della nostra reazione, è fondamentale introdurre il concetto di **Energia Libera di Gibbs**. Questa grandezza si esprime come:

$$\Delta G^{\circ} = -RT \ln K \quad (1)$$

dove ΔG° , l'energia libera di Gibbs standard, rappresenta la differenza di energia tra due stati. Conoscendo questa differenza di energia, possiamo determinare la composizione dell'equilibrio, cioè la quantità di ciascun componente presente, oppure calcolare la differenza di energia a partire dalla composizione dell'equilibrio.

Il valore di ΔG ci fornisce informazioni sulla **posizione dell'equilibrio**:

$\Delta G < 0$ (Reazione **esoergonica**, il prodotto è favorito)

$\Delta G > 0$ (Reazione **endoergonica**, il reagente è favorito)

$\Delta G = 0$ (La costante di equilibrio è 1, nessuno dei componenti è favorito)

Possiamo manipolare l'equilibrio della reazione secondo le nostre esigenze: se vogliamo ottenere più prodotto, possiamo aumentare la quantità di reagente oppure rimuovere uno dei prodotti. Ciò è in linea con il **principio di Le Chatelier**, che afferma che ogni sistema tende a reagire a una perturbazione esterna riducendone gli effetti.

Reagenti ad alta energia possono comunque esistere per altri fattori, in particolare quello **Entropico**, che può essere visto come una misura del disordine del sistema. Un insieme di composti ha entropia più alta di un composto puro, e quindi tutte le specie saranno presenti contemporaneamente per massimizzare l'entropia. Altro fattore importante da considerare è il fattore **Entalpico**. L'**entalpia** H è una misura del calore, e la variazione di entalpia, ΔH , in una reazione chimica corrisponde al calore rilasciato o assorbito durante quella reazione.

Le reazioni che rilasciano calore sono dette **esotermiche** e hanno un ΔH negativo; le reazioni che assorbono calore sono dette **endotermiche** e hanno un ΔH positivo.

Poiché rompere i legami richiede energia e formare nuovi legami libera energia, la variazione di entalpia fornisce un'indicazione se i prodotti abbiano legami più stabili rispetto ai materiali di partenza.

$$\Delta H = \sum H_{\text{legami rotti}} - \sum H_{\text{legami formati}}$$

L'energia libera di Gibbs, l'entalpia e l'entropia sono legate dalla seguente equazione:

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \Delta H < 0 & \quad (\text{Esotermico}) \\ \Delta H > 0 & \quad (\text{Endotermico}) \\ \Delta G < 0 & \quad (\text{Esoergonico}) \\ \Delta G > 0 & \quad (\text{Endoergonico}) \end{aligned}$$

Combinando le equazioni 1 e 2, otteniamo:

$$\ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

Da questa espressione si deduce che è il termine **entalpico** a determinare come la costante di equilibrio K varia in funzione della temperatura. In particolare:

- In una reazione **esotermica**, un aumento della temperatura comporta una diminuzione di K .
- In una reazione **endotermica**, un aumento della temperatura comporta un aumento di K .

1.2 Cinetica

La **cinetica** studia la velocità con cui avvengono le reazioni. Un reagente è definito **cineticamente stabile** quando, pur essendo i prodotti termodinamicamente più stabili, la **barriera energetica** per la trasformazione è troppo elevata affinché la reazione possa avvenire spontaneamente. Per superare questa barriera, è necessaria una certa quantità di energia, che può essere fornita, ad esempio, sotto forma di calore (aumento della temperatura).

Il **complesso attivato** o stato di transizione (**TS**) viene indicato con una doppia parentesi quadra e una doppia daga †. Se nella reazione è presente un **intermedio**, questo deve essere rappresentato sul grafico energia/coordinata di reazione, evidenziando che ogni intermedio ha la sua specifica barriera energetica. Ogni "sub-reazione" all'interno del processo complessivo ha i suoi propri parametri cinetici e termodinamici. Transition State e intermedio **NON** sono sinonimi

- Il **Transition State** è la forma a energia massima che le molecole devono attraversare per passare dai reagenti ai prodotti. **NON** può essere isolato in nessun modo.
- L' **Intermedio di reazione** rappresenta un punto stabile che esiste per un periodo finito (anche se spesso breve). Gli intermedi hanno una vita finita e, in teoria, possono essere isolati.

Tra i modelli utilizzati per descrivere la velocità di reazione, spicca l'equazione di **Arrhenius**:

$$K = Ae^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (3)$$

dove K è la costante di velocità, A è il fattore pre-esponenziale, E_a è l'energia di attivazione, R è la costante dei gas e T la temperatura assoluta.

Un altro importante strumento è l'**equazione cinetica**, che esprime la dipendenza della velocità di reazione dalla concentrazione dei reagenti:

$$\text{Velocità} = K[A]^m[B]^n[C]^p \quad (4)$$

dove m , n , e p sono gli ordini parziali di reazione per ciascun reagente.

La **velocità di reazione** è determinata dal **rate-limiting step**, ovvero il passaggio che richiede la quantità di energia più alta all'interno del meccanismo di reazione. È questo step a rappresentare il "collo di bottiglia" cinetico che regola la velocità complessiva della reazione.




Figura 1: Diagramma delle energie della riduzione di 3,3-dimetilbutan-2-one da parte di NaBH_4 , cerchiato in rosso si trova il rate-limiting step.

1.3 Distinzione tra Reazioni SN1 e SN2

Per determinare se una reazione sia di tipo **SN2** o **SN1**, possiamo utilizzare diverse tecniche di analisi. Una delle metodologie è l'analisi stereochimica.

Le reazioni **SN2** sono stereospecifiche; pertanto, in queste reazioni, si verifica sempre un'inversione del centro chirale. Questo può essere osservato mediante l'arricchimento di un enantiomero del reagente, verificando che il prodotto ottenuto sia l'altro enantiomero (ad esempio, da R a S o viceversa).

Un altro metodo da considerare è la costante di equilibrio (K). In una reazione **SN2**, la costante dipende da entrambi i reagenti, mentre nella reazione **SN1**, la costante non presenta la stessa dipendenza.

È inoltre possibile utilizzare un sostituito differente. Nella reazione **SN2**, la reazione avviene in un solo step e quindi ci sarà un attacco non preferenziale. Al contrario, nella reazione **SN1**, l'intermedio risulta poco legato al reagente originario poiché il nuovo sostituito è più reattivo (scelto appositamente per questa caratteristica). Questo è particolarmente rilevante quando il **rate limiting step** è il primo step in quanto l'inserimento dei reagenti risulta più semplice.

1.4 Postulato di Hammond


Come sappiamo, lo stato di transizione non può essere isolato e studiato direttamente, essendo una specie estremamente instabile. Tuttavia, la sua struttura è cruciale per capire il meccanismo di una reazione chimica. Il postulato di Hammond ci offre un'indicazione molto utile a questo proposito:

La struttura dello stato di transizione assomiglia di più a quella dei prodotti nelle reazioni endotermiche, mentre è più simile ai reagenti nelle reazioni esotermiche.


Per chiarire meglio questo concetto, consideriamo un esempio specifico:




In questa reazione, il nucleofilo I^- è lo stesso del gruppo uscente. Di conseguenza, reagenti e prodotti avranno la stessa energia, e la reazione sarà termoneutrale. Questo significa che lo stato di transizione si troverà esattamente a metà strada tra reagenti e prodotti. Dato che stiamo parlando di una reazione $\text{S}_{\text{N}}2$, il nucleofilo attacca il carbonio dal lato opposto rispetto al gruppo uscente, causando un'inversione della configurazione chirale. Ci aspettiamo dunque che lo stato di transizione abbia una struttura come quella illustrata qui:




In questo caso, il carbonio nello stato di transizione assume una configurazione a bipyramide trigonale. Le cariche sui due atomi di iodio si distribuiscono equamente, poiché si tratta dello stesso atomo, posizionato simmetricamente rispetto al carbonio.




Ora passiamo a un caso diverso:



In questa reazione fortemente esotermica, l'energia dei reagenti è molto più alta rispetto a quella dei prodotti. Per questo, secondo il postulato di Hammond, lo stato di transizione avrà una struttura che assomiglia maggiormente a quella dei reagenti, un cosiddetto **early transition state**.




Infine, analizziamo una reazione endotermica, dove lo stato di transizione è più simile ai prodotti:




In questo caso, la distanza tra il carbonio e il gruppo mesile è molto più corta rispetto a quella che separa il carbonio dal bromo. Di fatto, nel transition state, l'inversione del carbonio è quasi completata. La carica si localizza principalmente sul bromo piuttosto che sul gruppo mesile, indicando una struttura di stato di transizione che è ormai molto vicina ai prodotti.

Proviamo ora ad usare il postulato di Hammond per interpretare il meccanismo di una reazione. La reazione in esame è la seguente:



Dato il coinvolgimento di un carbonio secondario nella reazione, è lecito chiedersi se la reazione decorrerà secondo una $\text{S}_\text{N}1$ o una $\text{S}_\text{N}2$. Analizziamo i due casi utilizzando il postulato di Hammond:

SN1




Il primo step, che è quello determinante la velocità della reazione (rate limiting step), è endotermico, come si nota dalla maggiore energia rispetto ai reagenti iniziali: ci aspettiamo quindi che il TS1 avrà una struttura più simile al prodotto. Si può osservare che, nel TS1, il legame C-OTs è praticamente rotto, con una parziale carica positiva sul carbonio e una sul tosilato. Il postulato di Hammond afferma anche che **la specie o gruppo funzionale che stabilizza maggiormente il composto più vicino in energia allo stato di transizione stabilizzerà anche lo stato di transizione stesso**. Questo implica che l'energia dell'intermedio e del TS si abbassa.

Il secondo step della reazione è esotermico, e dal postulato di Hammond ricaviamo che il secondo stato di transizione avrà una struttura molto simile ai reagenti.

SN2

La S_N2 è una sostituzione bimolecolare, di conseguenza nella struttura dello stato di transizione appariranno sia il nucleofilo che il gruppo uscente. La reazione è esotermica e ci aspettiamo quindi uno stato di transizione precoce (early transition state), che sarà più simile ai reagenti. La carica sarà principalmente localizzata sul nucleofilo, che sta attaccando e iniziando a formare il legame con il carbonio. Inoltre, diversamente dalla S_N1 , non si formano cariche positive poiché non è presente l'intermedio carbocationico.



Essendo il TS precoce, l'inversione della configurazione del carbonio non è ancora avvenuta completamente, ma ci troviamo solo all'inizio di questo cambiamento. Nel caso della S_N2 , la presenza di un gruppo metossi in posizione para sul fenile non ha un effetto rilevante, poiché non stabilizza alcunché, contrariamente alla S_N1 , dove contribuisce alla stabilizzazione del carbocatione.

Già per sistemi semplici è difficile prevedere se la reazione sarà S_N1 o S_N2 , abbiamo quindi bisogno di strumenti migliori

1.5 Reaction Order and Rate Laws

Consideriamo una reazione $A + B + C \rightarrow P$. La velocità di reazione sarà data da:

$$\text{rate} = k \cdot [A]^x \cdot [B]^y \cdot [C]^z$$


Chiaramente, la velocità di reazione diminuisce man mano che la reazione procede, dato che le concentrazioni dei reagenti si riducono.

Se una reazione è del primo ordine, c'è una dipendenza 1-1 tra reagente e prodotto. Se una reazione è del secondo ordine, c'è una dipendenza 1-2 tra reagente e prodotto. Infine, se una reazione è dell'ordine zero, non c'è dipendenza dalla concentrazione dei reagenti. Per determinare l'ordine di reazione, si sommano le dipendenze di ciascun reagente. Chiaramente, questo approccio è valido fino al passo determinante della velocità (rate-determining step).

La velocità di reazione è rappresentata dalla tangente alla curva nel grafico prodotto/tempo. Nel grafico prodotto/reagente possiamo osservare diversi andamenti: - Ordine 0: linea piatta - Ordine 1: linea obliqua - Ordine 2: curva esponenziale.

Initial Rate Kinetic

Consideriamo una reazione:



La velocità di reazione è data da:

$$\text{Rate} = \frac{d[P]}{dt} = -\frac{d[A]}{dt} = k[A]$$

Per reazioni del primo ordine, possiamo utilizzare:

$$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$$

L'approssimazione della *initial rate kinetic* è molto utilizzata in laboratorio. In questa tecnica ci concentriamo sulla fase iniziale della reazione, con una conversione del 5-10%, richiedendo quindi uno strumento analitico molto sensibile, poiché la quantità di prodotto è bassa. Si utilizza questa conversione poiché la curva di conversione è quasi lineare. Possiamo assumere che $[A]$ sia costante e uguale a $[A]_0$, semplificando così i calcoli. È un'approssimazione valida. Si esegue l'analisi 3-4 volte, assumendo che la velocità sia uguale a $k_{obs} = k[A]_0$ quando plottiamo nel grafico $\text{rate}/[A]$.

Se consideriamo una reazione:



è possibile usare un grande eccesso (almeno 10 equivalenti) di B . In questo modo, la reazione procede in funzione di $[A]$, mentre $[B]$ rimane sostanzialmente costante, ottenendo così una reazione di pseudo primo ordine.

1.6 Linear Free Energy Relationship (LFER)

1.6.1 Diagramma di Hammett

Questo diagramma ci aiuta a comprendere la relazione tra reagenti e velocità di reazione. Hammett definì la scala sulla base della deprotonazione dell'acido benzoico in acqua, posizionando i sostituenti in meta e para per evitare effetti sterici dell'orto. Ponendo l'idrogeno come sostituyente standard ($\sigma = 0$), definiamo un parametro di sostituzione σ :

$$\log \left(\frac{K_x}{K_H} \right) = \rho \sigma_x$$

ρ : sensibilità della reazione (pari a 1 in questa reazione)
 σ : effetto del sostituyente

$$\sigma = pK_a^H - pK_a^X$$

Si osserva che:

- I gruppi elettron-attrattori hanno valori di σ positivi.
- I gruppi elettron-donatori hanno valori di σ negativi.


Il parametro σ^+ misura l'effetto mesomerico, che stabilizza il carbocatione (più è negativo, maggiore è la stabilizzazione). Un aspetto sorprendente è che il modello di Hammett è molto più generale di quanto ci si aspettasse. Il valore di ρ indica quanto i sostituenti siano rilevanti nella reazione: se il sostituito è molto lontano dal gruppo funzionale, ρ sarà 0 poiché l'effetto sarà nullo. Se si utilizza un solvente meno stabilizzante dell'acqua (ad esempio, etanolo), l'effetto dei sostituenti aumenta e quindi ρ aumenta.

Come possiamo determinare se una reazione è S_N1 o S_N2 tramite l'equazione di Hammett? Si effettuano vari esperimenti con sostituenti diversi e si costruisce un diagramma $\log(K_x/K_{sub})/\sigma$. Si ottiene una retta la cui inclinazione rappresenta ρ . A seconda del valore di ρ , possiamo interpretare i risultati come segue:

- $\rho > 1$: si forma una carica negativa durante la reazione.
- $0 < \rho < 1$: la reazione è meno sensibile, ma si forma comunque una carica negativa.
- $\rho < 0$: si forma una carica positiva.
- $\rho = 0$: nessun cambiamento significativo, o non c'è un rate-determining step.

1.7 Isotopic Labelling


Si utilizza un isotopo di un atomo coinvolto nella reazione per comprendere il meccanismo di reazione. Gli isotopi più utilizzati sono il deuterio e ^{18}O , introdotti tramite D_2O e H_2^{16}O . Questa tecnica è impiegata per confermare o confutare il meccanismo ipotizzato.



1.8 Crossover Experiments


Esperimenti di crossover sono utili quando si deve determinare se una reazione è intra- o intermolecolare. Si utilizzano due reagenti simili ma distinti e si osservano i prodotti ottenuti. Le possibili osservazioni sono:

- Reazione intramolecolare: si formano solo prodotti derivati da molecole uguali.
- Reazione intermolecolare: si formano sia prodotti tra molecole identiche che prodotti *crossover* tra molecole diverse.



1.9 Kinetic Isotope Effect (KIE)

Il *kinetic isotope effect* (KIE) è usato per determinare se la rottura del legame $C-H$ è parte del *rate-determining step*. Poiché l'idrogeno è l'unico elemento con un isotopo avente il doppio della massa, questa tecnica è utilizzata per legami $C-H$. Il legame carbonio-deuterio ha un'energia di punto zero inferiore rispetto al legame carbonio-idrogeno, poiché l'energia di punto zero dipende dalla massa degli atomi legati (atomi più pesanti hanno un'energia di punto zero più bassa). Di conseguenza, l'energia richiesta per rompere un legame $C-H$ è minore rispetto a quella necessaria per un legame deuterato.




Le reazioni che coinvolgono la rottura del legame $C-H$ sono più veloci di quelle deuterate se fanno parte del *rate-determining step*. Il KIE si calcola come:

$$\text{KIE} = \frac{k_H}{k_D}$$


k_H : velocità di reazione con idrogeno
 k_D : velocità di reazione con deuterio

Se il rapporto è elevato, abbiamo una reazione di tipo E2. Se il rapporto è pari a 1, si tratta di una reazione E1.




1.10 Intrappolamento degli Intermedi

Si ingegnerizza un reagente per bloccare l'intermedio impedendogli di reagire ulteriormente.



1.11 Stereochimica

La stereochimica può fornire indicazioni sul meccanismo di reazione. La S_N2 è stereospecifica e provoca un'inversione del centro chirale. La S_N1 non è stereospecifica, per cui si può comprendere il tipo di reazione dallo studio ottico dei prodotti partendo da reagenti otticamente puri (non è necessario il 99% di purezza, basta il 90%)



2 Sintesi asimmetrica

Una molecola si definisce **chirale** quando non possiede piani di simmetria, esistendo come due molecole speculari non sovrapponibili. Questa proprietà emerge quando un atomo di carbonio è legato a quattro gruppi diversi, rendendo impossibile l'esistenza di un piano di simmetria. L'atomo che lega i gruppi funzionali è chiamato **centro stereogenico** o **centro chirale**. Due stereoisomeri speculari non sovrapponibili vengono detti **enantiomeri**.

Gli enantiomeri condividono le stesse proprietà in ambienti achirali (ad esempio, analisi IR o NMR), ma differiscono in ambienti chirali, come la luce polarizzata o la cromatografia su fase stazionaria chirale.

2.1 Terminologia fondamentale

- **Chirale**: qualsiasi oggetto non sovrapponibile alla propria immagine speculare.
- **Achirale**: oggetto sovrapponibile alla propria immagine speculare.
- **Stereoisomeri**: isomeri che differiscono nell'orientazione tridimensionale degli atomi, mostrando quindi una differente stereochimica assoluta.

- **Enantiomeri:** coppia di stereoisomeri risultanti dalla presenza di un centro stereogenico.
- **Diastereoisomeri:** stereoisomeri che non sono enantiomeri, con una differente stereochimica relativa; possono essere chirali o achirali.

Caratteristiche dei diastereoisomeri

I diastereoisomeri, avendo una diversa stereochimica relativa, rappresentano molecole distinte. Possono essere chirali o achirali. Il numero di stereoisomeri di una molecola dipende dal numero di centri stereogenici secondo la relazione:

$$\text{Numero di stereoisomeri} = 2^n$$

Dove n è il numero di centri stereogenici. Il numero di diastereoisomeri risulta essere:


$$\text{Numero di diastereoisomeri} = \frac{2^n}{2}$$

Note aggiuntive

- **Epimeri:** diastereoisomeri che differiscono per un solo centro stereogenico.
- **Enantiomericamente arricchito:** descrive una miscela di enantiomeri in cui la composizione è sbilanciata a favore di uno dei due.
- **Rateo diastereomerico:** rapporto fra diastereoisomeri (es. *cis/trans*).
- **Miscela scalemica:** coppia di enantiomeri presente in un rapporto diverso da 1:1.
- **Enantiopura:** sostanza chirale composta da un solo enantiomero.
- **Centro stereogenico:** atomo che genera stereoisomeri variando la posizione di due dei suoi sostituenti. È preferibile usare sempre il termine "centro stereogenico" per evitare ambiguità.


2.2 Chiralità senza centro stereogenico

Alcuni composti chirali non possiedono centri stereogenici. Quando la rotazione di un legame forma due enantiomeri diversi, si parla di **atropisomeri**. Si usa la notazione **P** (plus) per la configurazione oraria e **M** (minus) per quella antioraria.




Stereochimica delle reazioni

- **Stereospecificità:** una reazione che produce uno specifico stereoisomero, determinato dal meccanismo di reazione.



- **Stereoselettività:** una reazione che privilegia un determinato percorso, senza che ciò sia imposto dal meccanismo.



Eccesso enantiomerico

L'**eccesso enantiomerico** (% ee) è definito come la differenza percentuale tra le frazioni molari dei due enantiomeri, normalizzata alla loro somma:

$$\%ee = \frac{|R - S|}{R + S} \times 100\%$$


È preferibile riportare il **rapporto enantiomerico**, indicando il rapporto diretto tra i due enantiomeri (ad esempio, 9:1 o 1:1).

2.3 Relazioni topiche


2.3.1 Relazioni tra i gruppi

La **topicità** descrive le relazioni tra regioni molecolari, considerando la posizione relativa dei sostituenti rispetto a un punto di riferimento o a un centro stereogenico. Dal punto di vista della stereoselettività, è fondamentale analizzare le relazioni di simmetria di specifiche subunità della molecola, come i gruppi funzionali e le facce. Gruppi identici all'interno di una molecola possono avere relazioni differenti tra loro.


Se è presente un asse di simmetria (C_2) tra due protoni, questi sono considerati equivalenti e si definiscono **omotopici**. Gruppi interscambiabili lungo un asse di simmetria sono dunque **omotopici**. Qualsiasi molecola, chirale o achirale, con un asse di simmetria contiene almeno una coppia di gruppi omotopici.




Se invece è presente un piano di simmetria che divide due idrogeni, ma non consente lo scambio libero di questi, si definiscono **enantiotopici**.



Quando due gruppi identici si trovano in ambienti non equivalenti, ovvero non sono presenti elementi di simmetria, vengono definiti **eterotopici**, e più precisamente **diastereotopici**.




I termini **Dia-**, **Enantio-** e **Omotopici** descrivono le relazioni tra due gruppi e non si applicano a gruppi singoli. Lo stesso gruppo può essere enantiotopico rispetto a uno e omotopico rispetto a un altro.



Test stereochimico


Un test stereochimico consiste nel sostituire uno dei due gruppi e confrontare la relazione stereochimica tra le strutture risultanti. Se le strutture ottenute sono diastereoisomeri, i gruppi della molecola originale sono **diastereotopici**.




2.3.2 Relazioni tra le facce

La topicità delle facce molecolari è cruciale nelle reazioni asimmetriche. Le relazioni tra le facce seguono regole analoghe a quelle per i gruppi:


- Presenza di un asse C_2 → facce **omotopiche**.



- Presenza di un piano di simmetria → facce **enantiotopiche**.




- Assenza di elementi di simmetria → facce **diastereotopiche**.



2.4 Prochiralità

Una molecola si definisce **prochirale** quando la sostituzione di un gruppo di una coppia eterotopica genera un centro stereogenico. La stereoselezione descrive il controllo sulla formazione di uno specifico stereoisomero durante la reazione di un gruppo o di una faccia prochirale.



Descrittori stereochimici per gruppi e facce prochirali

- Un gruppo stereoeterotopico è **Pro-R** se, assegnando arbitrariamente ad uno dei due gruppi la priorità maggiore e numerando gli altri gruppi secondo le regole di Cahn-Ingold-Prelog (CIP), si ottiene un centro stereogenico con descrittore **R**. L'altro gruppo è chiamato **Pro-S**.






Figura 2: In questo esempio, la priorità maggiore è stata assegnata ad H_A

- Una faccia stereoeterotopica è definita **Re** se, osservando i leganti di un atomo trigonale dal lato della faccia, questi appaiono in senso orario secondo le regole CIP. L'altro arrangiamento è chiamato **Si**.



L'angolo di Bürgi-Dunitz

La traiettoria di attacco durante una reazione nucleofila su un carbonio sp^2 è descritta dall'**angolo di Bürgi-Dunitz**, che è di circa 105° .



3 Cicloaddizioni

Le cicloaddizioni sono una classe di **reazioni concertate**, in cui tutti i passaggi avvengono simultaneamente. Queste reazioni fanno parte delle **reazioni pericicliche**, così chiamate perché durante tali processi gli elettroni si muovono in modo circolare. Le reazioni pericicliche possono essere suddivise in tre categorie principali:

- **cicloaddizioni**
- **riarrangiamenti sigmatropici**
- **reazioni elettrocicliche**

Nelle reazioni di cicloaddizione, avviene la rottura di due legami π a favore della formazione di nuovi legami σ . Queste reazioni sono **reversibili** (*cicloaddizione e retrocicloaddizione*). A differenza delle cicloaddizioni, i **riarrangiamenti sigmatropici** non alterano il numero di legami σ , mentre le **reazioni elettrocicliche** comportano la formazione o la rottura di un legame σ .

L'esempio di cicloaddizione che studiamo è la **reazione di Diels-Alder**, una cicloaddizione promossa termicamente. Quando i reagenti sono liquidi, questa reazione può avvenire senza solvente. Nel meccanismo della reazione di Diels-Alder, ciascun legame π si orienta in modo concorde (sia in senso orario che antiorario), sebbene ciò sia solo un modello per visualizzare il processo; in realtà, gli elettroni non si spostano dalla loro posizione originaria nella molecola.




Figura 3: Esempio di reazione di Diels-Alder, notare il movimento a ruota degli elettroni

Sia il **diene** che il **dienofilo** sono saturi e utilizzano il proprio sistema π per formare i legami σ . Queste molecole si dispongono in configurazione *sovrapposti testa-testa*, anziché affiancate. Lo *stato di transizione* che si forma presenta un anello a sei termini con una delocalizzazione elettronica π , conferendogli un **carattere aromatico** che lo stabilizza, come mostrato in **Figura 4**. Questa reazione è **esotermica** poiché la formazione di due nuovi legami σ a partire da due legami π contribuisce a una maggiore stabilizzazione del sistema.




Figura 4: Reazione di Diels-Alder con TS mostrato

3.1 Gli Attori della Reazione

Il Diene

Il **diene** coinvolto nella reazione di Diels-Alder è un sistema coniugato, che per poter reagire deve orientare i suoi carboni in modo da trovarsi in configurazione *s-cis* rispetto al dienofilo. Sebbene la conformazione *s-cis* sia spesso sfavorita, è comunque necessaria per la reazione. Non tutti i dieni in configurazione *s-cis* sono sfavoriti; esistono molecole come il ciclopentadiene e il furano, che sono intrappolate in questa configurazione e risultano quindi particolarmente reattive nella reazione di Diels-Alder.

Il Dienofilo

Per il **dienofilo** è importante la presenza di un *gruppo elettron-attrattore* (ad esempio, SO_2 , NO_2 , CN) che sia preferibilmente coniugato con il doppio legame. Questa configurazione favorisce l'interazione con il diene. Un esempio è il ciclopentadiene, che può dimerizzare con una molecola che agisce da diene e un'altra che funge da dienofilo.

Il Prodotto

Il **prodotto** della reazione di Diels-Alder è un ciclo a sei termini contenente un doppio legame e deve avere un gruppo elettron-attrattore direttamente legato a uno degli atomi del ciclo. Per identificare i reagenti necessari a ottenere un determinato prodotto, si può "smontare" il prodotto e tracciare le frecce di reazione in senso inverso, come avviene comunemente nella retrosintesi. È spesso necessario sigillare il reattore per evitare la perdita dei reagenti, spesso volatili, data l'esotermicità della reazione e la necessità di riscaldare il sistema per superare la barriera energetica: in questi casi, bisogna prestare attenzione alla pressione interna del sistema.

3.2 Stereochimica

Stereochimica del Prodotto

La reazione di **Diels-Alder** è **stereospecifica**. Un dienofilo in conformazione *cis* genera un prodotto con conformazione *cis*, mentre un dienofilo in conformazione *trans* produce un prodotto *trans*, come riportato in **Figura 5**. Questo avviene perché i reagenti si avvicinano da due piani differenti, uno sopra l'altro, e la reazione è talmente veloce che i legami non hanno il tempo di ruotare, preservando la stereochimica originale.




Figura 5: Esempi di reazioni la cui stereochimica è dominata dal dienofilo

Stereochimica del Diene

I sostituenti del **diene** si trovano tutti sullo stesso piano, sia quelli interni (all'interno dell'anello del diene) che quelli esterni (all'esterno dell'anello). Di conseguenza, la posizione finale dei sostituenti è determinata dalla stereochimica dei doppi legami nel diene. Se entrambi i sostituenti si trovano nella stessa posizione (*inside* o *outside*), si otterrà un prodotto con configurazione *cis*. Se uno è *outside* e l'altro *inside*, si otterrà un prodotto con configurazione *trans*. Degli esempi sono riportati in **Figura 6**.




Figura 6: Esempi di reazioni: nella prima reazione, entrambi i fenili sono "outside" e difatto si osserva solo il prodotto *cis*. Nella seconda reazione l'acetato di metile è "outside" mentre l'etere è "inside" e si osserva una quasi completa resa del prodotto *trans* (non completa in quanto il DEAD tende ad equilibrarsi rapidamente tra E e Z, con predominanza dell'E)

3.3 La Regola Endo

La disposizione relativa dei prodotti nella reazione di Diels-Alder può essere prevista usando la **regola endo**. Essendo una reazione cinetica, tende a formare il prodotto meno stabile termodinamicamente, ossia il prodotto *endo*, poiché presenta una barriera energetica inferiore. Questa preferenza è dovuta all'interazione tra i due legami π dei carboni vicini nel prodotto *endo*, un'interazione stericamente sfavorevole ma elettronicamente favorita, che avvantaggia la cinetica.




Figura 7: Confronto tra le forme endo/esò e il grafico di energie

3.4 Descrizione degli Orbitali di Frontiera

Il meccanismo della reazione di Diels-Alder è reso possibile dalle giuste simmetrie orbitali. Si verifica un'interazione costruttiva tra l'**HOMO** del diene e il **LUMO** del dienofilo. Questo processo, noto come *domanda elettronica normale*, si ha quando il diene è ricco di elettroni e il dienofilo è elettron-deficiente. In caso di un dienofilo ricco di elettroni e un diene elettron-deficiente, si ha una *domanda elettronica inversa*. Quest'ultima è tuttavia rara per ragioni sintetiche, poiché è difficile ottenere un diene elettron-deficiente. Il diagramma è riportato in **Figura 8**




Figura 8: Diagramma HOMO LUMO per processi di domanda elettronica normale e inversa

3.5 Il Solvente

La reazione di Diels-Alder non **richiede** un solvente, ma, in presenza di acqua (considerata un non-solvente in chimica organica), la reazione risulta **più veloce** e **più stereospecifica**. Si ipotizza che questo effetto sia dovuto alla formazione di gabbie d'acqua che favoriscono l'avvicinamento dei reagenti e promuovono la reazione.

3.6 Regioselettività

La regioselettività si manifesta solo se entrambi i reagenti non sono simmetrici rispetto al piano di reazione. È possibile prevederla, ma bisogna fare delle considerazioni sulla reazione.

Il gruppo elettron attrattore ha due effetti sul dienofilo: il primo, già discusso, è quello di abbassare l'energia del LUMO; il secondo è quello di distorcere questo orbitale, rendendolo difatto più *piccolo* rispetto agli orbitali presenti in β . Questo implica il fatto che il nucleofilo si avvicinerà all'alchene coniugato sull'asse del più grande lobo orbitalico del carbonio β .

Dato che i lobi più grandi reagiscono prima, si potrebbe pensare che la reazione non sia concertata, ma ciò sarebbe un errore. La reazione di Diels-Alder è una reazione concertata nonostante non sia perfettamente sincrona. Per comprendere la regioselettività dobbiamo comprendere quale carbonio è più stabile: disegniamo quindi le forme di risonanza di ciascun reagente e selezioniamo di conseguenza il carbonio più stabilizzato.


Possiamo quindi allineare i reagenti nella corretta orientazione e disegnare le frecce che portano al prodotto.

Ci si accorge che la posizione del gruppo elettron donatore è importante:

- in posizione **terminale**: prodotto **ORTO**
- in posizione **interna alla catena**: prodotto **PARA**

3.7 Catalizzatori


I **catalizzatori**, sebbene non indispensabili, possono **orientare la reazione** nella sintesi. Gli **acidi di Lewis** sono spesso usati poiché abbassano il **LUMO del dienofilo**, aumentandone la **elettrofilia**. Ciò permette di ottenere reazioni più **veloci**, con **regioselettività** maggiore, e a **temperature inferiori**, riducendo rischi



di **evaporazione dei reagenti** e di **aumento di pressione**. In caso di utilizzo di **tetracloruro di stagno**, è fondamentale limitarne la quantità per via della sua **tossicità** e della difficoltà di rimozione.


3.8 Reazioni di Diels-Alder asimmetriche: ausiliari chirali

Poiché i reagenti nella **reazione di Diels-Alder** sono **achirali**, il prodotto risulta in una **miscela racemica**. Per ottenere un **diastereoisomero enantiomericamente puro**, si introduce un **ausiliario chirale** che, occupando uno dei piani di reazione, indirizza la formazione del prodotto preferito.




3.9 Modi suprafacciali e antarafacciali

Quando i legami σ formati si trovano sullo **stesso lato del piano nodale**, la reazione è detta **suprafacciale**. La reazione di **Diels-Alder** è **sempre suprafacciale**, di tipo $[\pi 4_s + \pi 2_s]$.




Le cicloaddizioni [2 + 2]

Le cicloaddizioni [2 + 2] sono **processi fotochimici** supra-antarafacciali, che richiedono l'**assorbimento di radiazione UV o visibile**, per una **transizione elettronica**. Un processo si definisce anatarafacciale quando i legami σ formati si trovano sul **lato opposto del proprio piano nodale**




Le **cicloaddizioni [2 + 2]** sono invece sempre processi di natura **fotochimica**, che avvengono tramite l'assorbimento di **radiazione elettromagnetica** con frequenze nell'**ultravioletto (UV)** o nel **visibile**, e cioè a seguito di una **transizione elettronica**. Una regola generale che si osserva è la **mutua esclusività** di questi due tipi di processi: **tutte le reazioni pericicliche non permesse termicamente** sono invece **possibili per via fotochimica**. La ragione di ciò è da ricercare nel processo per cui **gli orbitali molecolari** dei reagenti vengono convertiti gradualmente in quelli del prodotto. A questo processo si applica la **legge di conservazione della simmetria orbitalica**, che deve essere conservata per tutte le operazioni di simmetria della molecola nell'intero percorso di reazione.

Nel caso delle reazioni [2+2] la sovrapposizione degli orbitali di legame π e σ di reagente e prodotto è proibita per motivi di simmetria. Portando l'**alchene** al suo **stato elettronicamente eccitato S_1** , con un elettrone nell'**orbitale π^* di antilegame**, si rende possibile la correlazione con il primo stato eccitato del prodotto. Grazie all'**eccitazione elettronica**, la combinazione **stato eccitato-stato fondamentale** dei due alcheni è possibile e la conseguente formazione del legame avviene per **sovrapposizione orbitalica**. La sovrapposizione di due **orbitali π** comporta la formazione di **nuovi orbitali molecolari**, con stabilizzazione di energia per **due elettroni** e destabilizzazione di un terzo. La sovrapposizione dei due **orbitali π^*** ha come effetto la stabilizzazione di un **elettrone**. Dato che il **bilancio di energie totale è positivo** il legame può formarsi.




Cicloaddizioni [2 + 2] termiche


Esistono anche **cicloaddizioni [2 + 2] termiche**, ma avvengono solo in presenza di **gruppi chetene e isocianato**.




I cheteni si ottengono partendo da un **cloruro acilico**, tramite una reazione **E1cB** (Elimination Unimolecular conjugate Base).



Nella sintesi di β lattami le reazioni tra **imina e chetene** o **isocianato e alchene** sono possibili, ma **imina + chetene** risulta **più regioselettiva**. Se entrambi i composti hanno solo un sostituito, l'anello a quattro termini li disporrà in forma trans in modo da limitare le interazioni steriche.



Gli isocianati, per essere sufficientemente elettrofili, devono essere funzionalizzati con un **gruppo elettron-attrattore**, come il **clorosulfonilisocianato**.



Esempio di svolgimento di un esercizio

1. Regiochimica

2. Reazione

3. Regola Del Dienofilo

4. Regola Del Diene

Non applicabile in quanto non abbiamo un diene disostituito

5. Regola endo

Modello dello stato di transizione eclissato

Parte II

NMR

1 Introduzione alla Spettroscopia a Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)

L'origine teorica della spettroscopia a risonanza magnetica nucleare (NMR) risale all'esperimento di Stern-Gerlach (**Figura 9**), in cui un fascio di atomi di argento veniva fatto passare attraverso un campo magnetico disomogeneo. Secondo la fisica classica, ci si aspettava di osservare una singola fascia sul rivelatore. Tuttavia, gli atomi si concentravano in due punti distinti, suggerendo che ogni atomo possiede un momento angolare quantizzato.




Figura 9: Rappresentazione schematica dell'esperimento di Stern-Gerlach

1.1 Spin Nucleare o Momento Angolare Quantizzato

I nuclei degli atomi possono possedere due tipi di spin nucleari (I): 0 o multipli di $1/2$, fino a un massimo sperimentale di $7/2$. I nuclei con $I = 0$ sono invisibili all'NMR e quindi non sono di interesse. Se lo spin nucleare è diverso da 0, i nuclei, quando posti in un campo magnetico **STATICO**, assumeranno $2I + 1$ orientazioni differenti all'interno del campo. Per $I = \frac{1}{2}$, è possibile considerare i nuclei con un approccio semplificato, che sarà trattato in dettaglio.




Figura 10: Stati possibili per un nucleo di spin $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2} = \alpha$, $-\frac{1}{2} = \beta$

2 Approccio Classico

2.1 Il Campo Magnetico

Quando un campo magnetico viene applicato agli atomi, essi si orientano in modo tale da avere tutti la stessa direzione ma verso opposto, come illustrato nella **Figura 11**.




Figura 11: Disposizione dei nuclei degli atomi in presenza e assenza di un campo magnetico

A seconda dell'orientazione dello spin, gli stati dei nuclei vengono classificati in:

- α : stato a energia più bassa (convenzionalmente positivo), chiamato anche **Parallelo**.
- β : stato a energia più alta (convenzionalmente negativo), chiamato anche **Antiparallelo**.

La differenza di energia tra α e β è data dalla seguente formula:

$$\Delta E = \frac{\gamma \cdot h \cdot B_0}{2\pi}$$

dove:

- γ è il rapporto giromagnetico (tipico di ogni nucleo; isotopi diversi hanno valori di γ differenti) e si misura in $\text{rad}/(\text{s} \cdot \text{T})$.
- B_0 è il campo magnetico (misurato in Tesla, T).
- h è la costante di Planck.

Fissato il campo magnetico B_0 (determinato dal magnete dell'NMR), e considerando che $h/(2\pi)$ è una costante derivante dalla trattazione quantomeccanica, la differenza di energia ΔE dipende principalmente da γ . I calcoli mostrano che ΔE è molto piccola (ordine di J/mol). Utilizzando la legge di Boltzmann:

$$\frac{N_\beta}{N_\alpha} = e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}}$$

si comprende che la distribuzione degli spin è approssimativamente 50-50, con una popolazione leggermente superiore nello stato a energia più bassa α

3 Regole di Selezione per l'NMR

3.1 Previsione del Momento Angolare Nucleare

È possibile predire lo spin nucleare (I) per ogni atomo considerando il numero di massa, protoni e neutroni.

- **Nuclei con massa pari:**
 - Numero di protoni e neutroni pari: $I = 0$ e sono invisibili all'NMR (es. ^{12}C).
 - Numero di protoni dispari e neutroni pari: I intero positivo maggiore di 0, utili per gli spettri in trasformata di Fourier (es. ^2H).
- **Nuclei con massa dispari:**
 - Numero di protoni dispari e neutroni pari: $I = \frac{1}{2}$ e multipli (es. ^1H).
 - Numero di protoni pari e neutroni dispari: $I = \frac{1}{2}$ e multipli (es. ^{13}C).

Per gli atomi più comuni in chimica organica:

- Idrogeno:
 - ^1H : si manifesta ad alte frequenze con linee ben definite.
 - Deuterio (^2H): presenta linee larghe a causa del momento di quadrupolo.
- Carbonio:
 - ^{12}C : invisibile ($I = 0$).
 - ^{13}C : $I = \frac{1}{2}$, linee ben visibili con frequenza circa un quarto di quella dell' ^1H .
- Azoto:
 - ^{14}N : difficoltoso da analizzare a meno che non presenti alta simmetria.
 - ^{15}N : utilizzabile.
- Ossigeno:
 - ^{16}O e ^{17}O : non utilizzabili.
- Fluoro (^{19}F): $I = \frac{1}{2}$, linee strette, frequenza alta e crescente utilizzo in ambito farmaceutico.

3.2 Sensibilità dell'NMR

L'intensità del segnale NMR è proporzionale a:

$$N \cdot \gamma^{1.5} \cdot B_0^{1.5} \sqrt{NS}$$

dove N è il numero di nuclei.

3.2.1 Tecniche NMR

Esistono due principali tecniche NMR:

- **Tecnica ad Onda Continua:** La tecnica NMR a onda continua prevede l'applicazione di un campo magnetico costante mentre si scansionano progressivamente tutte le frequenze radio una per una. Man mano che la frequenza dell'onda radio viene fatta variare, si rileva l'assorbimento di energia da parte dei nuclei (Il termine "risonanza" si riferisce al fatto che i nuclei oscillano tra questi due stati quando l'energia assorbita è esattamente uguale alla differenza tra i livelli di energia (ΔE)). Questo metodo richiede molto tempo poiché è necessario passare attraverso l'intero spettro di frequenze per ottenere il segnale completo. L'intensità del segnale è proporzionale al numero di nuclei coinvolti e alla potenza del campo magnetico. Sebbene accurata, questa tecnica è meno efficiente rispetto alla NMR in trasformata di Fourier, poiché la raccolta dei dati è più lenta.
- **Tecnica in Trasformata di Fourier (FT-NMR):** I nuclei vengono eccitati simultaneamente tramite un impulso di radiofrequenza a banda larga. Dopo l'eccitazione, i nuclei tornano allo stato di equilibrio emettendo radiofrequenze pari a ΔE . Questo decadimento del segnale, chiamato rilassamento, viene rilevato e successivamente trasformato tramite una trasformata di Fourier per ottenere lo spettro NMR. Questa operazione rapida può essere ripetuta numerose volte, e gli spettri sommati per ridurre il rumore. In questo caso, NS rappresenta il numero di scansioni (o spettri). È inoltre possibile programmare gli impulsi radio (RF) sequenziandoli, ma ciò è gestito dall'elettronica tramite software specializzato come l'*NMR Sequence*.

Una volta ottenuto il segnale elettrico dal decadimento dei nuclei (FID) in funzione del tempo, la trasformata di Fourier lo trasforma in un grafico in funzione della frequenza (s^{-1}), come mostrato nella **Figura 13**.




Figura 12: Rappresentazione di una Pulse Sequence in NMR




Figura 13: Algoritmo di gestione di uno FT-NMR

3.3 Fattori Importanti nello Studio di uno Spettro NMR

3.3.1 Chemical Shift

Il chemical shift deriva dalla presenza degli elettroni attorno al nucleo. Gli elettroni, essendo carichi negativamente, generano un campo magnetico attorno al nucleo che contrasta il campo magnetico generato dal magnete dell'NMR. Questo fenomeno è noto come **schermatura nucleare** (maggiore è la nuvola elettronica, maggiore è l'effetto di schermatura, e quindi minore è la frequenza di rilevazione). Sebbene la variazione di energia sia relativamente piccola (massime poche decine di kHz) come mostrato in **Figura 14**, grazie all'elevata sensibilità dell'NMR, questo fattore risulta **essenziale** per distinguere i segnali. Pertanto, si introduce il parametro del chemical shift δ nell'equazione di ΔE :

$$\Delta E = \frac{\gamma \cdot h \cdot B_0 \cdot (1 - \delta)}{2\pi}$$

il chemical shift, essendo una frazione di frequenze, risulta essere adimensionale

$$\delta = \frac{400.000.200 - 400.000.000}{400.000.000} \cdot 10^6 = 0.5 \text{ ppm}$$




Figura 14: Effetto della schermatura degli elettroni

Ci sono due problemi principali: primo, non è possibile realizzare un magnete con una precisione di una parte per miliardo (la precisione del campo magnetico di un magnete per NMR arriva al massimo a pochi decimali). Secondo, è impossibile creare due magneti identici, poiché anche se possiedono lo stesso campo magnetico nominale, non avranno esattamente le stesse frequenze. Addirittura, se spegniamo e riaccendiamo un magnete, potrebbero verificarsi **piccole variazioni** nel campo. Per risolvere questi problemi, si utilizza uno **standard interno**: il **tetrametilsilano (TMS)**. Il TMS è scelto perché è un composto *inerte, volatile* e fornisce un **segnale molto intenso** grazie ai suoi 12 **protoni equivalenti** e 4 **atomi di carbonio equivalenti**. Inoltre, il suo segnale è definito a **0 ppm**, che si trova (*schermato*) sia negli spettri ^1H che ^{13}C NMR, grazie alla **bassa elettronegatività** del silicio.

Per capire a che distanza il picco si trova rispetto al riferimento si prende il picco, lo si paragona rispetto al segnale del TMS e si divide per i MHz dello strumento impiegato. Nell'esempio riportato in **Figura 15** le scritte nere utilizzano uno NMR a 100MHz, mentre quelle rosse uno a 400MHz. Bisogna tenere a mente che maggiore il campo magnetico applicato e maggiore è la distanza dei picchi tra loro in maniera relativa ma non quella assoluta (nell'esempio in **Figura 15**, la distanza è sempre 7.22ppm indipendentemente dal campo magnetico applicato)






Figura 15: Esempio di calcolo della distanza riferimento-campione

I segnali dell’NMR si definiscono schermati o non schermati: gli schermati sono riportati a destra e sono legati ad atomi a bassa elettronegatività (come appunto il TMS). I segnali NON schermati stanno a sinistra e troviamo protoni legati ad atomi elettronegativi come aldeidi (il carbonile ha un carattere fortemente elettronegativo).




3.3.2 Il range del chemical shift




Si può notare come nonostante la maggiore elettronegatività degli alchini rispetto agli alcheni, i primi si ritrovano in una stretta fascia insieme agli alcani in quanto il doppio sistema π greco impone agli elettroni di muoversi molto e di conseguenza il carattere elettronegativo non basta, difatto bisogna tenere in considerazione più parametri della sola elettronegatività come

- **Elettronegatività:** se un idrogeno è legato ad un carbonio con nucleo elettronegativo, l'idrogeno risulterà descherato.
- **Ibridizzazione dei carboni:** un carbonio sp^2 è più elettronegativo di un carbonio sp^3 e quindi idrogeni vinilici e aromatici sono descherati
- **Effetti coniugati:** bisogna identificare le diverse forme di risonanza e capire quale è la più stabile per capire la posizione più comune assunta dagli idrogeni
- **Effetti conformazionali:** senza una struttura 3D ottimizzata non è possibile fare una assunzione corretta
- **Solvente utilizzato:** dato che i nuclei di idrogeno solo facilmente attaccabile dal solvente bisogna tenere in conto quale solvente si sta utilizzando.




3.3.3 Integrazione

Lo spettrometro misura l'area dei segnali tramite integrazione numerica, rappresentando il numero relativo di atomi di idrogeno nella molecola. Per ottenere il numero di protoni per ogni segnale, è necessario confrontare gli integrali con un segnale di riferimento scelto. Tuttavia, la precisione degli integrali dipende dal tempo di rilassamento T_1 : se i valori di T_1 differiscono troppo tra i segnali, gli integrali risultano inaffidabili. La regione da integrare deve essere scelta dall'utente, così come la scelta del segnale di riferimento. Tutti gli integrali forniti dallo spettrometro sono relativi al segnale di riferimento.



3.3.4 Costanti di accoppiamento

Le costanti di accoppiamento nascono dalla sovrapposizione degli orbitali di legame molecolari. La loro forza dipende dalla distanza, **in termini di numero di legami**, tra i nuclei.



Quando due nuclei sono accoppiati, i loro stati di spin influenzano l'energia complessiva del sistema. Ogni nucleo può trovarsi in uno dei due stati di spin (α o β) e l'interazione tra i due crea più livelli energetici distinti.

Questo accoppiamento porta alla separazione dei livelli energetici che, nel caso di due nuclei accoppiati, dà origine a 4 diverse possibili transizioni di spin. Queste transizioni si osservano come picchi distinti nello spettro NMR, la cui distanza dipende dalla forza dell'accoppiamento (costante J). Si dice allora che i nuclei sono accoppiati. La costante di accoppiamento è uguale per entrambi i segnali poichè tutte le combinazioni di spin sono circa equamente popolate. Le costanti di accoppiamento si misurano in Hz. La scrittura convenzionale delle costanti di accoppiamento è la seguente:

$$^x J_{y-z}$$

x = distanza tra i nuclei (in termini di legami)
 y = primo nucleo attivo (in genere il più pesante)
 z = secondo nucleo attivo

La J senza nulla vuol dire costante di accoppiamento H-H a distanza di 3 legami:

$$^3 J_{H-H} = J$$

Le costanti di accoppiamento nello spettro 1H sono **SEMPRE** minori o uguali a 20. Se troviamo valori superiori abbiamo la **CERTEZZA** di un errore strumentale. Le 3J dipendono dall'angolo diedro (angolo su uno spazio tridimensionale) secondo l'equazione di Karplus:

$$^3J = A + B\cos\phi + C\cos2\phi$$

Di conseguenza, J distanti meno di 0,5 Hz vengono raggruppati in un unico picco. Grazie alla loro dipendenza dall'angolo diedro e alla proporzionalità inversa alla distanza, le costanti di accoppiamento sono particolarmente utili per distinguere gli isomeri E e Z degli alcheni e capire in che disposizione sono i sostituenti in un anello fenilico. Le frequenze sono riportate in **Figura ??**. **ATTENZIONE:** la dipendenza dall'angolo diedro comporta importanti considerazioni: se l'angolo diedro è 0 o 180 la J sarà massima; se l'angolo diedro è 90 allora $J = 0$ e dare la falsa impressione che i nuclei non siano accoppiati quando invece lo sono.




Figura 16: Data la dipendenza dalla distanza, la disposizione orto è quella a frequenza più alta e quella para più bassa

3.4 Notazione di Pople


Ogni Chemical Shift viene marcato con una lettera tenendo in considerazione $\Delta\nu$ (differenza di chemical shift in Hz) e J (in Hz).

- Se il rapporto $\Delta\nu/J$ è grande ($>8-10$) si ottiene uno spettro del primo ordine. Le lettere assegnate sono molto separate tra loro (AX, AMX, AM).
- Se il rapporto $\Delta\nu/J$ è piccolo (<8) si ottiene uno spettro del secondo ordine. Le lettere assegnate sono più vicine (AB, ABC). Spettro difficile da interpretare senza una simulazione teorica.

Considerando che mentre i CS non cambiano al cambiare del campo magnetico B_0 le J vengono distanziate di conseguenza avere un campo magnetico elevato rende le operazioni più semplici perchè si ottengono più spettri del primo ordine, più facili da leggere di quelli del secondo ordine.

3.4.1 Sistema AX2

Sistema con due idrogeni equivalenti su un carbonio accoppiati con un idrogeno equivalente su un altro. Partiamo dalla linea a destra: il segnale nasce dai due idrogeni equivalenti che "vedono" l'idrogeno



accoppiato. Il segnale di un singolo idrogeno corrisponde a **2 picchi**, ovvero il picco dove il nucleo è in α e quello dove è in β . La distanza tra questi due picchi sarà un certa J . I tre picchi corrispondono al


segnale generato dall'idrogeno singolo, che "vede" i due idrogeni equivalente a lui associati. Il segnale di due idrogeni equivalenti corrisponde a **3 picchi**, ovvero

- $\alpha - \alpha$
- $\alpha - \beta$ e $\beta - \alpha$
- $\beta - \beta$

Tra questi picchi ci sarà una certa J. Questa J è uguale alla J presente tra i picchi del CH₂ in quanto questi sono accoppiati. Difatto è possibile capire che questi due picchi siano di carboni vicinali andando a misurare la distanza tra i picchi: se le J corrispondono allora gli idrogeni appartengono a carboni vicinali.

3.4.2 Sistema AX3

Sistema con tre idrogeni equivalenti su un carbonio accoppiati con un idrogeno equivalente su un altro.



Partendo da destra, osserviamo il segnale generato dal CH₃ che "vede" il singolo idrogeno. Come già visto, il segnale di un singolo idrogeno corrisponde a due picchi. Il segnale generato dall'idrogeno singolo, che "vede" i tre nuclei equivalenti, è composto da quattro picchi:


- $\alpha - \alpha - \alpha$
- $\alpha - \alpha - \beta$ e rispettive combinazioni
- $\alpha - \beta - \beta$ e rispettive combinazioni
- $\beta - \beta - \beta$

Come prima, la distanza tra i picchi dei segnali sarà uguale se essi sono accoppiati, e sarà uguale alla costante di accoppiamento J.


3.5 Regole di accoppiamento

Per nuclei con $I = 1/2$ possiamo affermare che un segnale che si accoppia con N idrogeni equivalenti ci fornirà $N+1$ picchi. Più in dettaglio, un segnale che accoppia $N+M$ idrogeni ci fornirà $(N+1) \times (M+1)$ picchi. Le intensità relative sono calcolate come la somma degli accoppiamenti individuali.

E' chiaro che il sistema inizia ad essere difficile da controllare quando abbiamo diversi carboni con idrogeni equivalenti. L'isobutano, ad esempio, possiede 9 idrogeni equivalenti a cui corrispondono 10 picchi. Ricordare sempre che se misuriamo la J in ppm bisogna moltiplicarla per il campo magnetico dello strumento.




Quando il sistema di spin si complica, bisogna applicare le regole di accoppiamento in maniera sequenziale considerando ogni gruppo di idrogeni equivalenti.



In questo esempio,

- il CH azzurro è accoppiato con l'idrogeno rosso (avremo un doppietto)
- il CH₃ è accoppiato con l'idrogeno rosso (doppietto)
- il CH rosso è accoppiato con entrambi: 3 idrogeni equivalenti del metile e idrogeno azzurro: avremo quindi un quartetto (del metile) splittato in un doppietto dalla costante J con l'H azzurro: otteniamo quindi un doppio quartetto, 8 picchi in tutto



In questo esempio,

- il CH_2 azzurro è accoppiato con 2 idrogeni rossi (avremo un tripletto)
- il CH_3 è accoppiato con 2 idrogeni rossi (avremo un tripletto)
- il CH_2 rosso è accoppiato con entrambi: 3 idrogeni equivalenti del metile e 2 idrogeni azzurri: avremo quindi un quartetto (del metile) splittato in un tripletto dalla costante J con gli H azzurri: otteniamo quindi un triplo quartetto, 12 picchi in tutto

3.6 Disaccoppiamento omonucleare

Il disaccoppiamento omonucleare viene applicato su uno spettro del protone per disaccoppiare altri protoni. Si utilizza un disaccoppiatore, ovvero un trasmettitore che rimuove la costante di accoppiamento. Inviando un impulso a una frequenza precisa, si mantiene in risonanza continua i nuclei associati, annullando la media della risonanza, così che il picco si azzerà. Inoltre, i segnali di accoppiamento negli altri picchi risultano ridotti.

3.7 Sistemi aromatici

Per identificare la posizione degli atomi di idrogeno (H) nei sistemi aromatici si utilizzano le costanti di accoppiamento J .

- Accoppiamento orto: $J = 7 - 9 \text{ Hz}$
- Accoppiamento meta: $J = 0 - 3 \text{ Hz}$
- Accoppiamento para: $J = 0 - 2 \text{ Hz}$

Dividiamo quindi tra accoppiamenti orto, e accoppiamenti meta e para.

Per distinguere sistemi aromatici meta e para, ricordiamo che:

- **Anelli sostituiti in posizione meta:** un solo segnale presenta esclusivamente accoppiamenti **meta**, mentre gli altri segnali hanno almeno un accoppiamento orto. Attribuendo alle J orto l'aggettivo "grandi" e a quelle meta e para "piccole" la distribuzione è:

G	P
0	3
2	1
1	2

con l'ultima fila che vale per due carboni

- **Anelli sostituiti in posizione orto:** ciascun segnale presenta **almeno un** accoppiamento orto. Inoltre, risulta generalmente difficile osservare l'accoppiamento para. Utilizzando la stessa classificazione di prima, la distribuzione è:


G	P
1	2
1	2
2	1
2	1

4 Spettri Carbonio 13

Si può sommare i FID degli spettri prima di eseguire la trasformata di Fourier, poiché non è possibile farlo successivamente. Il rapporto segnale-rumore è proporzionale alla radice quadrata del numero di spettri acquisiti. Teoricamente, si potrebbero acquisire 3600 spettri, dato che il FID del carbonio impiega 1 secondo per ricavare le energie, ma esiste un limite: il tempo di rilassamento. È necessario attendere che i nuclei si rilassino completamente; se si acquisiscono i FID troppo velocemente, non si permette il rilassamento e si eccitano meno nuclei. La fretta risulta controproducente, poiché non si ottiene alcun guadagno nel rapporto segnale-rumore e si spreca tempo. Questo rilassamento è chiamato T_1 . Il tempo di acquisizione ottimale è calcolato automaticamente dallo strumento. Esiste anche il rilassamento trasversale T_2 , che provoca l'allargamento delle bande.

Non si osserva accoppiamento omonucleare negli spettri ^{13}C , poiché l'abbondanza relativa di questo isotopo è molto bassa, rendendo improbabile tale fenomeno. Il range del *chemical shift* è più ampio e suddivisibile in tre zone principali:

- Da 0 a 80 ppm: carboni alifatici, sp^3 ; a 77 ppm cade il cloroformio deuterato.
- Tra 80 e 100 ppm: acetali, rari ma non rarissimi.
- Da 100 a 160 ppm: carboni aromatici e alcheni, sp^2 .
- Da 165 a 220 ppm: carboni carbonilici.




La zona degli aromatici e alcheni non è affidabile, poiché i segnali cadono tutti in aree troppo simili; viceversa, la zona dei carbonili è molto utile:

- 165-185 ppm: derivati degli acidi carbossilici.
- 190-220 ppm: chetoni e aldeidi.

4.1 Distorsionless Enhancement by Polarization Transfer (DEPT)

Il metodo DEPT consente di distinguere i carboni in base al numero di idrogeni ad essi legati, funzionando come un filtro:


- DEPT 1.0: visualizza solo i CH.
- DEPT 1.5: visualizza CH e CH₃ con segnali positivi, CH₂ con segnale negativo.
- **Nota:** i carboni quaternari non sono visibili nel DEPT. Ma possono essere dedotti per esclusione analizzando i dept 1 e 1.5



4.2 Nuclear Overhauser Effect (NOE)

Il NOE è un effetto di tipo spaziale: l'intensità del segnale varia in funzione della distanza spaziale tra due nuclei. Il NOE comporta una modifica dell'intensità dei segnali quando nuclei vicini a livello spaziale vengono selettivamente disaccoppiati. È paragonabile all'accensione di una lampadina: le pareti vicine si illuminano in funzione della distanza dalla sorgente di luce. In un esperimento NOE tra protoni, l'effetto può raggiungere solo il 50%. Tuttavia, l'accoppiamento tra ¹³C e ¹H può arrivare fino al 200%.

L'intensità dell'effetto NOE è inversamente proporzionale alla distanza (r^{-6}), con una massima distanza di 5 Å. Quindi, più idrogeni sono legati al carbonio, maggiore sarà l'intensità del segnale (i carboni quaternari, infatti, non vengono potenziati). Il NOE è molto utile per capire la posizione dei sostituenti andando ad analizzare il loro intorno chimico.



In chimica organica, il NOE è sempre positivo; in biorganica, è negativo. Nei polimeri a basso peso molecolare può risultare vicino allo zero, mentre nei polimeri in generale tende a essere negativo.

Come acquisire il NOE?

Durante l'acquisizione di uno spettro NOE, lo spettrometro applica una sequenza di impulsi specifica per indurre la saturazione di uno o più nuclei selezionati, disaccoppiando i nuclei accoppiati. Questa saturazione viene mantenuta per un intervallo di tempo sufficiente a trasferire parzialmente la polarizzazione ai nuclei vicini attraverso l'effetto NOE. Terminato questo periodo, viene acquisito lo spettro NMR del campione, rilevando le variazioni di intensità dei segnali dei nuclei vicini a quelli saturati. Queste variazioni indicano l'interazione spaziale tra i nuclei, fornendo informazioni strutturali utili sulla vicinanza tra gli atomi all'interno della molecola. I protoni vicini vedono aumentare il loro segnale, mentre quelli distanti non subiscono variazioni. Si acquisiscono sia lo spettro normale (A) sia quello con NOE (B), e sottraendo $B - A$ si ottiene lo spettro leggibile.





Figura 17: **Nota:** i segnali di questo spettro sono riportati come singoletti per chiarezza.

Nei primi tempi del NOE era difficile interpretare gli spettri a causa di diversi problemi, tra cui la difficoltà nel rimuovere i segnali dei picchi non colpiti. Per superare queste limitazioni, è stato sviluppato il **Double Pulsed Field Gradient Spin Echo Nuclear Overhauser Effect (DPFGSE-NOE)**, ovvero il NOE che abbiamo visto finora.


5 NMR 2D

Gli spettri 2D sono stati introdotti per semplificare l'interpretazione di spettri molto affollati e per fornire informazioni non ottenibili dagli spettri 1D. Tuttavia, questa tecnica presenta una risoluzione inferiore rispetto agli spettri 1D. Gli spettri 2D sono così definiti perché utilizzano due dimensioni di chemical shift.

Il principio è paragonabile a una mappa topografica: linee di contorno ravvicinate indicano una variazione rapida (picco ripido), mentre linee distanti indicano una variazione più graduale (picco poco ripido). Questa rappresentazione è nota come **contour plot** o mappa topografica.



La metodologia si basa sull'utilizzo di due tempi, uno fisso e uno incrementale linearmente, per acquisire progressivamente una serie di spettri sovrapposti, generando infine una rappresentazione tridimensionale.



5.1 COrrrelation SpectroscopY (COSY)

Il **COSY** è una sequenza **omonucleare**, in cui entrambe le dimensioni dello spettro sono riferite allo stesso nucleo. Dal punto di vista grafico, il COSY è rappresentato da un **quadrato**, in cui i chemical shift dei protoni sono riportati sia sull'asse delle ascisse che su quello delle ordinate. Operativamente, i picchi ottenuti nello spettro corrispondono ai segnali del protone della molecola.

