


# **La statistica descrittiva**

## **(Parte II: Le variabili numeriche)**


# Obiettivi di apprendimento

- Saper calcolare e interpretare misure di centralità, dispersione e correlazione
- Saper visualizzare dati numerici
- Saper interpretare tabelle e figure in articoli scientifici

# Le fasi della ricerca



# Misure di centralità e dispersione



# Misure di centralità: la moda



L'elemento più frequente



$x = \{1, 1, 1, 3, 4, 4, 7, 8, 8, 9, 9\}$   
 $\text{moda}(x) = 1$

# Esercizio #1

? Qual è la moda dei seguenti insiemi?

$$y = \{1, 1, 1, 3, 4, 4, 4, 7, 8, 8, 9, 9\}$$

$$\text{moda}(y) = ?$$

$$z = \{1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 17, 21, 42\}$$

$$\text{moda}(z) = ?$$

# Esercizio #1 -- Soluzione

? Qual è la moda dei seguenti insiemi?

$$y = \{1, 1, 1, 3, 4, 4, 4, 7, 8, 8, 9, 9\}$$

$$\text{moda}(y) = 1 \wedge 4$$


$$z = \{1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 17, 21, 42\}$$

$$\text{moda}(z) = \text{Non esiste}$$

# Misure di centralità: la mediana



Il valore "in mezzo"



⚠ I dati devono essere ordinati!



## Esercizio #2

? Quali sono le mediane di questi insiemi?

$$y = \{6, 34, 40, 55, 75\}$$

$$\text{mediana}(y) = ?$$

$$z = \{6, 34, 40, 55, 175\}$$

$$\text{mediana}(z) = ?$$

## Esercizio #2 -- Soluzione

? Quali sono le mediane di questi insiemi?

$$y = \{6, 34, 40, 55, 75\}$$
$$\text{mediana}(y) = y_3 = 40$$

$$z = \{6, 34, 40, 55, 175\}$$
$$\text{mediana}(z) = ?$$

! I dati devono essere ordinati!

## Esercizio #2 -- Soluzione


? Quali sono le mediane di questi insiemi?

$$y = \{6, 34, 40, 55, 75\}$$
$$\text{mediana}(y) = y_3 = 40$$


$$z = \{6, 34, 40, 55, 175\}$$
$$\text{mediana}(z) = z_3 = 40$$

! I dati devono essere ordinati!

# Mediana e valori anomali



# Quartili



⚠ I dati devono essere ordinati!

# Misure di centralità: la media



Media aritmetica

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i \right) = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$



$$x = \{4, 36, 45, 50, 75\}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i \right) = \frac{4+36+45+50+75}{5} = 42$$

## Esercizio #3

? Quali sono le medie di questi insiemi?

$$y = \{6, 34, 40, 55, 75\}$$

$$\bar{y} = ?$$

$$z = \{6, 34, 40, 55, 175\}$$

$$\bar{z} = ?$$

## Esercizio #3 -- Soluzione

? Quali sono le medie di questi insiemi?

$$y = \{6, 34, 40, 55, 75\}$$


$$\bar{y} = \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n y_i \right) = \frac{6+34+40+55+75}{5} = 42$$

$$z = \{6, 34, 40, 55, 175\}$$


$$\bar{z} = \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n z_i \right) = \frac{4+36+45+50+175}{5} = 62$$




# Media e valori anomali



# La forma delle distribuzioni



# La forma delle distribuzioni



## Esercizio 4

? Nei risultati di uno studio è riportata la seguente frase:

*The mean length of stay was 22.4 days (median: 14 days).*

La distribuzione empirica ha una forma...


- a) simmetrica
- b) asimmetrica a destra
- c) asimmetrica a sinistra
- d) nessuna delle precedenti

## Esercizio 4 -- Soluzione


? Nei risultati di uno studio è riportata la seguente frase:

*The mean length of stay was 22.4 days (median: 14 days).*


La distribuzione empirica ha una forma...

- a) simmetrica
- b) asimmetrica a destra 
- c) asimmetrica a sinistra
- d) nessuna delle precedenti

# Misure di dispersione




# Misure di dispersione



# Misure di dispersione: range



$$\text{range}(x) = \max(x) - \min(x)$$




$$\text{range}(x) = 9754 - 2830 = 6924$$




# Misure di dispersione: range interquantile

🎯 
$$\text{IQR}(x) = Q3(x) - Q1(x)$$




# Misure di dispersione: varianza

Low Variance



High Variance



# Misure di dispersione: varianza



$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

dove  $\bar{x} = \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)$



$$x = \{1, 2, 3\} \quad \bar{x} = \frac{1+2+3}{3} = 2$$

$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{3-1} \times [(1-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2] = \\ &= \frac{1}{2} \times [1^2 + 0^2 + 1^2] = \frac{1}{2} \times 2 = 1 \end{aligned}$$

# Misure di dispersione: deviazione standard



$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

dove  $\bar{x} = \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)$



$$x = \{1, 2, 3\} \quad \bar{x} = \frac{1+2+3}{3} = 2$$

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{\frac{1}{3-1} \times [(1-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2]} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} \times [1^2 + 0^2 + 1^2]} = \sqrt{\frac{1}{2} \times 2} = \sqrt{1} = 1 \end{aligned}$$

# Esercizio #5

- ? Il range è sensibile alla posizione centrale della distribuzione empirica  
a) Vero      b) Falso
- ? La mediana si calcola sommando i valori e dividendoli per il loro numero  
a) Vero      b) Falso
- ? La mediana è il valore che ha metà dei dati inferiori e metà superiori a esso  
a) Vero      b) Falso
- ? La mediana, rispetto alla media, è più sensibile ai valori estremi  
a) Vero      b) Falso
- ? Due distribuzioni con la stessa media hanno la stessa deviazione standard  
a) Vero      b) Falso

# Esercizio #5 -- Soluzione

- ? Il range è sensibile alla posizione centrale della distribuzione empirica  
a) Vero      b) Falso ☒
- ? La mediana si calcola sommando i valori e dividendoli per il loro numero  
a) Vero      b) Falso
- ? La mediana è il valore che ha metà dei dati inferiori e metà superiori a esso  
a) Vero      b) Falso
- ? La mediana, rispetto alla media, è più sensibile ai valori estremi  
a) Vero      b) Falso
- ? Due distribuzioni con la stessa media hanno la stessa deviazione standard  
a) Vero      b) Falso

# Esercizio #5 -- Soluzione

- ? Il range è sensibile alla posizione centrale della distribuzione empirica  
a) Vero      b) Falso      ☒
- ? La mediana si calcola sommando i valori e dividendoli per il loro numero  
a) Vero      b) Falso      ☒
- ? La mediana è il valore che ha metà dei dati inferiori e metà superiori a esso  
a) Vero      b) Falso
- ? La mediana, rispetto alla media, è più sensibile ai valori estremi  
a) Vero      b) Falso
- ? Due distribuzioni con la stessa media hanno la stessa deviazione standard  
a) Vero      b) Falso

# Esercizio #5 -- Soluzione

- ? Il range è sensibile alla posizione centrale della distribuzione empirica  
a) Vero      b) Falso ☒
- ? La mediana si calcola sommando i valori e dividendoli per il loro numero  
a) Vero      b) Falso ☒
- ? La mediana è il valore che ha metà dei dati inferiori e metà superiori a esso  
a) Vero ☒      b) Falso
- ? La mediana, rispetto alla media, è più sensibile ai valori estremi  
a) Vero      b) Falso
- ? Due distribuzioni con la stessa media hanno la stessa deviazione standard  
a) Vero      b) Falso



# Esercizio #5 -- Soluzione

- ? Il range è sensibile alla posizione centrale della distribuzione empirica  
a) Vero      b) Falso      ☒
- ? La mediana si calcola sommando i valori e dividendoli per il loro numero  
a) Vero      b) Falso      ☒
- ? La mediana è il valore che ha metà dei dati inferiori e metà superiori a esso  
a) Vero      ☒      b) Falso
- ? La mediana, rispetto alla media, è più sensibile ai valori estremi  
a) Vero      b) Falso      ☒
- ? Due distribuzioni con la stessa media hanno la stessa deviazione standard  
a) Vero      b) Falso

# Esercizio #5 -- Soluzione

- ? Il range è sensibile alla posizione centrale della distribuzione empirica  
a) Vero      b) Falso      ☒
- ? La mediana si calcola sommando i valori e dividendoli per il loro numero  
a) Vero      b) Falso      ☒
- ? La mediana è il valore che ha metà dei dati inferiori e metà superiori a esso  
a) Vero      ☒      b) Falso
- ? La mediana, rispetto alla media, è più sensibile ai valori estremi  
a) Vero      b) Falso      ☒
- ? Due distribuzioni con la stessa media hanno la stessa deviazione standard  
a) Vero      b) Falso      ☒

# I valori estremi

TABLE 3. Length of In-Patient Stay, by Surgical Procedure			
Procedure	No. of procedures	Length of stay, d	
		Mean $\pm$ SD	Median (IQR)
Breast surgery	1,338	3.3 $\pm$ 4.4	3 (0-5)
Coronary artery bypass graft	570	9.6 $\pm$ 15.2	8 (7-9)
Cesarean section	4,831	4.9 $\pm$ 6.4	4 (3-5)
Repair of fractured neck of femur	2,303	13.8 $\pm$ 12.2	10 (7-17)
Hip replacement	6,432	8.7 $\pm$ 5.9	7 (6-9)
Abdominal hysterectomy	1,484	5.4 $\pm$ 4.0	5 (4-6)
Knee replacement	4,483	8.2 $\pm$ 5.0	7 (6-9)
Major vascular surgery	269	22.4 $\pm$ 23.1	14 (8-30)
Overall	21,710	7.8 $\pm$ 8.0	6 (4- 9)

The mean length of stay was 7.8 days but was greatly influenced by 2 patients with lengths of stay of almost 1 year. The median length of stay was 6 days, with 90% of patients discharged within 14 days after the procedure. Table 3 displays measures of central tendency (mean and median values) and dispersion (SDs and interquartile ranges) for the length of stay for each type of surgical procedure. .

# Esercizio #6

? Nei risultati di uno studio è riportata la seguente frase:

*Coronary-artery calcium scores averaged  $68.9 \pm 244.2$  (range 0 to 1526) in patients and  $8.8 \pm 41.8$  (range 0 to 243.4) in controls.*

Come descrivereste in Table 1 questa variabile?


- a) con media e deviazione standard
- b) con mediana e interquantile range
- c) con mediana e deviazione standard
- d) non ho abbastanza elementi per decidere

## Esercizio #6 -- Soluzione

? Nei risultati di uno studio è riportata la seguente frase:

*Coronary-artery calcium scores averaged  $68.9 \pm 244.2$  (range 0 to 1526) in patients and  $8.8 \pm 41.8$  (range 0 to 243.4) in controls.*

Come descrivereste in Table 1 questa variabile?

- a) con media e deviazione standard
- b) con mediana e interquantile range 
- c) con mediana e deviazione standard
- d) non ho abbastanza elementi per decidere

# Esercizio #7

Table 1. Demographic Characteristics of the Participants		
Characteristic	All Participants (N = 277)	
	Oxytocin (N = 139)	Placebo (N = 138)
Age		
Mean — yr	10.4±4.1	10.4±4.0
Distribution — no. (%)		
3–6 yr	34 (24)	35 (25)
7–11 yr	54 (39)	53 (38)
12–17 yr	51 (37)	50 (36)
Sex — no. (%)		
Male	122 (88)	120 (87)
Female	17 (12)	18 (13)



Qual è la percentuale di bambine e ragazze nel gruppo di intervento?


- a) 13%
- b) 12%
- c) 18%
- d) 17%
- e) Non è possibile capirlo dalla tabella

# Esercizio #7 -- Soluzione

Table 1. Demographic Characteristics of the Participants		
Characteristic	All Participants (N = 277)	
	Oxytocin (N = 139)	Placebo (N = 138)
Age		
Mean — yr	10.4±4.1	10.4±4.0
Distribution — no. (%)		
3–6 yr	34 (24)	35 (25)
7–11 yr	54 (39)	53 (38)
12–17 yr	51 (37)	50 (36)
Sex — no. (%)		
Male	122 (88)	120 (87)
Female	17 (12)	18 (13)



Qual è la percentuale di bambine e ragazze nel gruppo di intervento?

- a) 13%
- b) 12% 
- c) 18%
- d) 17%
- e) Non è possibile capirlo dalla tabella

Sikich, L. et al., *Intranasal Oxytocin in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder*, NEJM, 2021

# Esercizio #8

Table 1. Demographic Characteristics of the Participants		
Characteristic	All Participants (N = 277)	
	Oxytocin (N = 139)	Placebo (N = 138)
Age		
Mean — yr	10.4±4.1	10.4±4.0
Distribution — no. (%)		
3–6 yr	34 (24)	35 (25)
7–11 yr	54 (39)	53 (38)
12–17 yr	51 (37)	50 (36)
Sex — no. (%)		
Male	122 (88)	120 (87)
Female	17 (12)	18 (13)



In questo studio, l'età è stata raccolta come una variabile...

- a) categorica
- b) ordinale
- c) numerica
- d) non è possibile dirlo

Sikich, L. et al., *Intranasal Oxytocin in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder*, NEJM, 2021

02:00




# Esercizio #8 -- Soluzione

Table 1. Demographic Characteristics of the Participants		
Characteristic	All Participants (N = 277)	
	Oxytocin (N = 139)	Placebo (N = 138)
Age		
Mean — yr	10.4±4.1	10.4±4.0
Distribution — no. (%)		
3–6 yr	34 (24)	35 (25)
7–11 yr	54 (39)	53 (38)
12–17 yr	51 (37)	50 (36)
Sex — no. (%)		
Male	122 (88)	120 (87)
Female	17 (12)	18 (13)



In questo studio, l'età è stata raccolta come una variabile...

- a) categorica
- b) ordinale
- c) numerica 
- d) non è possibile dirlo

Sikich, L. et al., *Intranasal Oxytocin in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder*, NEJM, 2021

# Esercizio #9

Table 1. Demographic Characteristics of the Participants		
Characteristic	All Participants (N = 277)	
	Oxytocin (N = 139)	Placebo (N = 138)
Age		
Mean — yr	10.4±4.1	10.4±4.0
Distribution — no. (%)		
3–6 yr	34 (24)	35 (25)
7–11 yr	54 (39)	53 (38)
12–17 yr	51 (37)	50 (36)
Sex — no. (%)		
Male	122 (88)	120 (87)
Female	17 (12)	18 (13)



Qual è l'età media dei pazienti nel gruppo di controllo?

- a) 10.4
- b) 4.1
- c) 4.0
- d) Non è possibile capirlo dalla tabella

Sikich, L. et al., *Intranasal Oxytocin in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder*, NEJM, 2021

02:00

# Esercizio #9 -- Soluzione

Table 1. Demographic Characteristics of the Participants		
Characteristic	All Participants (N=277)	
	Oxytocin (N=139)	Placebo (N=138)
Age		
Mean — yr	10.4±4.1	10.4±4.0
Distribution — no. (%)		
3–6 yr	34 (24)	35 (25)
7–11 yr	54 (39)	53 (38)
12–17 yr	51 (37)	50 (36)
Sex — no. (%)		
Male	122 (88)	120 (87)
Female	17 (12)	18 (13)



Qual è l'età media dei pazienti nel gruppo di controllo?

a) 10.4



b) 4.1

c) 4.0


d) Non è possibile capirlo dalla tabella

Sikich, L. et al., *Intranasal Oxytocin in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder*, NEJM, 2021

# **La visualizzazione dei dati numerici**


# Istogramma

Visconti A., et al., *Total serum N-glycans associate with response to immune checkpoint inhibition therapy and survival in patients with advanced melanoma*, BMC Cancer, 2023 doi:10.1186/s12885-023-10511-3




# Istogramma

Visconti A., et al., *Total serum N-glycans associate with response to immune checkpoint inhibition therapy and survival in patients with advanced melanoma*, BMC Cancer, 2023 doi:10.1186/s12885-023-10511-3




# Istogramma

Visconti A., et al., *Total serum N-glycans associate with response to immune checkpoint inhibition therapy and survival in patients with advanced melanoma*, BMC Cancer, 2023 doi:10.1186/s12885-023-10511-3




# Miami plot/Mirror histogram

Visconti A., et al., *Total serum N-glycans associate with response to immune checkpoint inhibition therapy and survival in patients with advanced melanoma*, BMC Cancer, 2023 doi:10.1186/s12885-023-10511-3






# Boxplot




# Boxplot

Visconti A., *et al.*, Total serum *N*-glycans associate with response to immune checkpoint inhibition therapy and survival in patients with advanced melanoma, BMC Cancer, 2023 doi:10.1186/s12885-023-10511-3




# Boxplot



# Boxplot

Visconti A., et al., *Total serum N-glycans associate with response to immune checkpoint inhibition therapy and survival in patients with advanced melanoma*, BMC Cancer, 2023 doi:10.1186/s12885-023-10511-3



## **Esercizio #10**

Quanti partner (etero)sessuali le persone in Gran Bretagna riferiscono di aver avuto nella loro vita?

# Esercizio #10

Quanti partner (etero)sessuali le persone in Gran Bretagna riferiscono di aver avuto nella loro vita?

? Cosa ci dicono  
queste statistiche?

	Uomini 35-44	Donne 35-44
Moda	1	1
Range	0-500	0-550
Media	14.3	8.5
SD	24.2	19.7
Mediana	8	5
IQR	4-18	3-10

Think

02:00

# Esercizio #10

Quanti partner (etero)sessuali le persone in Gran Bretagna riferiscono di aver avuto nella loro vita?

? Cosa ci dicono  
queste statistiche?

	Uomini 35-44	Donne 35-44
Moda	1	1
Range	0-500	0-550
Media	14.3	8.5
SD	24.2	19.7
Mediana	8	5
IQR	4-18	3-10

Pair

03:00

# Esercizio #10

Quanti partner (etero)sessuali le persone in Gran Bretagna riferiscono di aver avuto nella loro vita?

? Cosa ci dicono queste statistiche?

	Uomini 35-44	Donne 35-44
Moda	1	1
Range	0-500	0-550
Media	14.3	8.5
SD	24.2	19.7
Mediana	8	5
IQR	4-18	3-10


Share

05:00




# Esercizio #10 (bis)

? Il grafico della distribuzione conferma quello che abbiamo detto?  
Aggiunge informazione?



# Esercizio #11




? Questi dati sono stati raccolti intervistando 41 genitori in un parco giochi.

Qual è il modo migliore per descriverli?

- a) Gli intervistati spendono tra le 0 e le 9 ore in palestra, con una media di  $3.4 \pm 3.4$  ore (mediana: 5 ore; moda: 0 ore).
- b) Circa la metà degli intervistati ha riportato di non essere andata in palestra. I rimanenti spendono in palestra tra le 5 e le 9 ore, con una media di  $6.6 \pm 1.1$  ore (mediana: 7 ore)

# Esercizio #11 -- Soluzione



? Questi dati sono stati raccolti intervistando 41 genitori in un parco giochi.

Qual è il modo migliore per descriverli?

a) Gli intervistati spendono tra le 0 e le 9 ore in palestra, con una media di  $3.4 \pm 3.4$  ore (mediana: 5 ore; moda: 0 ore).

b) Circa la metà degli intervistati ha riportato di non essere andata in palestra. I rimanenti spendono in palestra tra le 5 e le 9 ore, con una media di  $6.6 \pm 1.1$  ore (mediana: 7 ore) ✓


# La relazione tra due variabili numeriche

Cosa è successo ai bambini sottoposti a interventi cardiocirurgici in alcuni ospedali britannici tra il 1984 e il 1995?



Hospital	Operations	Survivors	Deaths	30-day Survival (%)	Dying (%)
Bristol	143	102	41	71.3	28.7
Leicester	187	162	25	86.6	13.4
Leeds	323	299	24	92.6	7.4
Oxford	122	99	23	81.1	18.9
Guys	164	139	25	84.8	15.2
Liverpool	405	363	42	89.6	10.4
Southampton	239	215	24	90.0	10.0
Great Ormond St	482	429	53	89.0	11.0
Newcastle	195	169	26	86.7	13.3
Harefield	177	152	25	85.9	14.1
Birmingham	581	523	58	90.0	10.0
Brompton	301	270	31	89.7	10.3

D.J. Spiegelhalter *et al.*, *Commissioned Analysis of Surgical Performance Using Routine Data: Lessons from the Bristol Inquiry*, 2002, Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society

# Visualizziamo di dati




# Visualizziamo di dati



# La relazione tra due variabili numeriche

Pearson's correlation coefficient


- $\rho = 0.82$
- $\rho_{\text{no Bristol}} = 0.93$



# Correlazione & valori estremi

Pearson's correlation coefficient

- $\rho = 0.72$







# Correlazione & valori estremi

Pearson's correlation coefficient

- $\rho = 0.72$
- $\rho_{\text{no outliers}} = 0.07$



# Perché visualizzare i dati?



**Datasaurus Dozen**, Matejka, J & Fitzmaurice, G. *Same Stats, Different Graphs: Generating Datasets with Varied Appearance and Identical Statistics through Simulated Annealing*, Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, doi:10.1145/3025453.3025912

# Parametri vs statistiche

	Parametro	Statistica
Numerosità	$N$	$n$
Media	$\mu$	$\bar{x}$
Deviazione Standard	$\sigma$	$s$
Proporzione	$\pi$	$p$

# Esercizio #12

? La media nella popolazione viene indicata con...

- a)  $M$
- b)  $m$
- c)  $\mu$
- d)  $\bar{x}$

# Esercizio #12 -- Soluzione

? La media nella popolazione viene indicata con...

a)  $M$


b)  $m$

c)  $\mu$  

d)  $\bar{x}$

# Perché c'è variabilità nelle osservazioni?


- 🎯 In uno studio sull'età neonatale, 18 pediatri misurano la circonferenza cranica di un bambolotto che simula un bambino di un anno



A cosa è dovuta questa variabilità?

# Perché c'è variabilità nelle osservazioni?

- 🎯 In uno studio sull'età neonatale, 18 pediatri misurano la circonferenza cranica di un bambolotto che simula un bambino di un anno




A cosa è dovuta questa variabilità?

Errori di misurazione

# Perché c'è variabilità nelle osservazioni?



Nello stesso studio, un pediatra misura la circonferenza cranica di 35 bambini di un anno




A cosa è dovuta questa variabilità?



# Perché c'è variabilità nelle osservazioni?



Nello stesso studio, un pediatra misura la circonferenza cranica di 35 bambini di un anno




A cosa è dovuta questa variabilità?

Differenze individuali

# Perché c'è variabilità nelle osservazioni?


- 🎯 Nello stesso studio, lo stesso pediatra misura altri 35 bambini di un anno che vivono in famiglie di stato socioeconomico molto basso



A cosa è dovuta questa variabilità?

# Perché c'è variabilità nelle osservazioni?

- 🎯 Nello stesso studio, lo stesso pediatra misura altri 35 bambini di un anno che vivono in famiglie di stato socioeconomico molto basso






A cosa è dovuta questa variabilità?

Diversa condizione sperimentale?

# Perché dobbiamo conoscere la differenza?



Vedremo come determinare se la variabilità è generata dalle condizioni sperimentali o se è generata da differenze individuali e/o da errori di misurazione



# Cosa abbiamo imparato in questa lezione?

- Le variabili numeriche possono essere rappresentate con misure di centralità, dispersione e correlazione (statistiche)
- Alcune statistiche sono "falsate" se le distribuzioni empiriche sono asimmetriche e/o includono valori estremi e possono nascondere dettagli importanti dei dati
- Le variabili numeriche possono essere rappresentate graficamente in diversi modi, ma alcune possono nascondere dettagli importanti delle distribuzioni empiriche
- Visualizzare i dati è importante per interpretarli
- Il campione viene rappresentato con le statistiche, la popolazione con i parametri
- La variabilità che osserviamo può essere causata da errori di misurazione, differenze individuali e/o di condizione sperimentale